

صفحه	عنوان
۲	مجموعه، الگو و دنباله
۵۹	مثلثات
۸۵	توان‌های گویا و عبارت‌های جبری
۱۱۱	معادلات و نامعادلات
۱۶۱	تابع
۱۸۲	ترکیبیات
۲۰۲	آمار و احتمال

فصل 1

مجموعه، الگو و دنباله

مجموعه، الگو و دنباله

بخش اول: مجموعه

در باره مفهوم مجموعه، صورت‌های مختلف نمایش مجموعه و اعمال روی مجموعه در کتاب نهم به تفصیل سخن گفته‌ایم. در این بخش ضمن یادآوری اجمالی مطالب فوق به تکمیل این مبحث می‌پردازیم.

مجموعه: دسته‌ای از اشیاء کاملاً مشخص را مجموعه می‌نامند. مانند اعداد طبیعی کوچکتر از ۲۰، مقسوم‌علیه‌های عدد ۱۲، اعداد اول دورقمی.

مثال ۱: کدام یک از موارد زیر مجموعه نیست؟

- (الف) اعداد طبیعی بزرگتر از 10^{100}
 (ب) اعداد اول بزرگتر از ۱۰۰۰
 (ج) چهار عدد طبیعی متوالی
 (د) مضارب طبیعی عدد ۱۰
 (ه) اعداد خیلی بزرگ

حل: موارد (الف)، (ب) و (د) یک مجموعه را مشخص می‌کنند. اما موارد (ج) و (ه) مجموعه نیستند. **مجموعه تهی:** مجموعه‌ای که عضو نداشته باشد مجموعه تهی نامیده می‌شود که آن را به صورت \emptyset یا $\{\}$ نشان می‌دهند. مانند مجموعه اعداد طبیعی بین ۸ و ۹ یا مجموعه اعداد اول دورقمی زوج.

مثال ۲: مجموعه اعداد صحیح زوج بین ۱۷- و ۲۵ را با اعضا و علائم ریاضی مشخص کنید.

$$A = \{-16, -14, -12, \dots, 24\} = \{2x \mid x \in \mathbb{Z}, -8 \leq x \leq 12\}$$

مثال ۳: مجموعه مضارب صحیح عدد ۵ را با اعضا و علائم ریاضی مشخص کنید.

$$B = \{\dots, -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15, \dots\} = \{5x \mid x \in \mathbb{Z}\}$$

مثال ۴: مجموعه اعداد طبیعی که باقی‌مانده تقسیم آن‌ها بر ۷ برابر ۲ می‌باشد را با اعضا و علائم ریاضی مشخص کنید.

$$C = \{2, 9, 16, 23, \dots\} = \{7x + 2 \mid x \in \mathbb{W}\} \\ = \{7x - 5 \mid x \in \mathbb{N}\}$$

مثال ۵: مجموعه مقسوم‌علیه‌های صحیح عدد ۸ را با اعضا و علائم ریاضی بنویسید.

$$D = \{-8, -4, -2, -1, 1, 2, 4, 8\} = \left\{x \mid x \in \mathbb{Z}, \frac{\Lambda}{x} \in \mathbb{Z}\right\}$$

زیرمجموعه: مجموعه A را زیرمجموعه B گویند در صورتیکه تمام عضوهای A در B نیز باشد.

مثال ۶: اگر A مجموعه مقسوم علیه‌های ۱۸ و B مجموعه مقسوم علیه‌های ۵۴ باشد کدام یک از این دو مجموعه زیرمجموعه دیگری است؟


حل: با توجه به اینکه ۵۴ بر ۱۸ بخش پذیر است، می توان گفت هر مقسوم علیه ۱۸ مقسوم علیه ۵۴ نیز می باشد. پس $A \subseteq B$.

مثال ۷: اگر C مجموعه مضارب عدد ۶ و D مجموعه مضارب عدد ۲۴ باشد کدام یک از این دو مجموعه زیرمجموعه دیگری است؟

حل: با توجه به اینکه ۲۴ بر ۶ بخش پذیر می باشد می توان گفت هر مضرب ۲۴ مضرب ۶ نیز می باشد. پس $D \subseteq C$.
نکته: مجموعه تهی زیرمجموعه همه مجموعه ها است.

نکته: هر مجموعه ای زیرمجموعه خودش است.

تعداد زیرمجموعه های یک مجموعه: مجموعه $A = \{1, 2, 3\}$ را در نظر بگیرید. فرض می کنیم B زیرمجموعه ای از A باشد، حالت های زیر را می توان برای عضوهای B در نظر گرفت.



عدد ۱ در B باشد یا نباشد ۲ حالت دارد، عدد ۲ در B باشد یا نباشد هم دو حالت دارد، عدد ۳ در B باشد یا نباشد نیز دو حالت دارد. لذا تعداد کل حالتها برابر است با:

$$2 \times 2 \times 2 = 2^3 = 8$$

اگر A یک مجموعه n عضوی باشد تعداد زیرمجموعه های A برابر است با:

$$\underbrace{2 \times 2 \times 2 \times \dots \times 2}_n = 2^n$$

مثال ۸: همه زیرمجموعه های مجموعه $A = \{5, \{5\}, \{6\}\}$ را بنویسید.

$$\emptyset, \{5\}, \{\{5\}\}, \{\{6\}\}, \{5, \{5\}\}, \{5, \{6\}\}, \{\{5\}, \{6\}\}, A$$



مثال ۹: تعداد زیرمجموعه‌های یک مجموعه $2^n - 4$ عضوی هشت برابر تعداد زیرمجموعه‌های یک مجموعه $n - 1$ عضوی است. مقدار n چقدر است؟

$$2^{2^n - 4} = 8 \times 2^{n-1} \Rightarrow 2^{2^n - 4} = 2^3 \times 2^{n-1} \Rightarrow 2^{2^n - 4} = 2^{n+2}$$

$$2^n - 4 = n + 2 \Rightarrow n = 6$$



مثال ۱۰: تعداد زیرمجموعه‌های یک مجموعه $n + 3$ عضوی از تعداد زیرمجموعه‌های یک مجموعه $n + 1$ عضوی 192 واحد بیشتر است. مقدار n چقدر است؟

$$2^{n+3} = 2^{n+1} + 192 \Rightarrow 2^{n+3} - 2^{n+1} = 192 \Rightarrow 2^n (2^3 - 2^1) = 192$$

$$2^n \times 6 = 192 \Rightarrow 2^n = 32 \Rightarrow n = 5$$



زیرمجموعه محض: همه زیرمجموعه‌های یک مجموعه به جز خود مجموعه را زیرمجموعه‌های محض آن مجموعه می‌نامند. تعداد زیرمجموعه‌های محض یک مجموعه n عضوی برابر است با $2^n - 1$.

قضیه: اگر $A \subseteq B$ و $B \subseteq C$ ، آنگاه $A \subseteq C$.

پرهان: فرض می‌کنیم x عضو دلخواهی از A باشد. با توجه به اینکه $A \subseteq B$ می‌توان گفت x عضوی از B نیز هست و چون $B \subseteq C$ پس x عضو C نیز می‌باشد. بنابراین هر عضو مجموعه A در مجموعه C نیز وجود دارد پس $A \subseteq C$.
مجموعه توان یک مجموعه: مجموعه متشکل از همه زیرمجموعه‌های یک مجموعه را مجموعه توان آن مجموعه می‌نامند. مجموعه توان A را با $P(A)$ نشان می‌دهند.

مثال ۱۱: اگر $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ باشد، $P(A)$ را مشخص کنید.

$$P(A) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$$



تساوی دو مجموعه: دو مجموعه A و B را مساوی گویند در صورتیکه $A \subseteq B$ و $B \subseteq A$.

به عنوان مثال دو مجموعه $A = \{6, 7, 8\}$ و $B = \{8, 7, 7, 6, 6, 6\}$ مساویند.

مثال ۱۲: اگر $A = \{\{5\}, \{5, 5\}, \{5, 5, 5\}\}$ باشد، $P(P(A))$ را مشخص کنید.


$$A = \{\{5\}, \{5, 5\}, \{5, 5, 5\}\} \quad P(A) = \{\emptyset, \{\{5\}\}\}$$



$$P(P(A)) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\{5\}\}\}, \{\emptyset, \{\{5\}\}\}\}$$

مجموعه مرجع (مجموعه جهانی): مجموعه‌ای که حاوی تمام مجموعه‌های دیگر باشد، به عبارت دیگر همه مجموعه‌های مورد بحث زیرمجموعه آن باشند، مجموعه مرجع (جهانی) نامیده می‌شود که آن را با M یا U نشان می‌دهند.

متمم یک مجموعه: متمم مجموعه A که آن را با A' نشان می‌دهیم، مجموعه‌ای است که عضوهای آن در مجموعه مرجع باشد ولی در A نباشد.



$$A' = \{x \mid x \in U, x \notin A\}$$

مثال ۱۳: اگر $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ و $A = \{2, 3, 4\}$ باشند، A' را مشخص کنید.

$$A' = \{1, 5, 6\}$$



مثال ۱۴: اگر $U = \mathbb{Z}$ و $B = \{2x \mid x \in \mathbb{Z}\}$ باشند B' را مشخص کنید.

$$B' = \{2x + 1 \mid x \in \mathbb{Z}\}$$



مثال ۱۵: اگر $U = \{3x \mid x \in \mathbb{Z}\}$ و $A = \{6x \mid x \in \mathbb{Z}\}$ باشند A' را مشخص کنید.

$$A' = \{\dots, -15, -9, -3, 3, 9, 15, \dots\} = \{6x - 3 \mid x \in \mathbb{Z}\}$$



مثال ۱۶: اگر $U = \{x \mid -17 < x < 9\}$ و $B = \{x \mid -4 < x < 9\}$ باشند B' را مشخص کنید.

$$B' = \{x \mid -17 < x \leq -4\}$$



مثال ۱۷: اگر $U = \{x \mid x \geq -12\}$ و $C = \{x \mid x \geq 35\}$ باشند C' را مشخص کنید.

$$C' = \{x \mid -12 \leq x < 35\}$$



قضیه: اگر $A \subseteq B$ باشد، ثابت کنید $B' \subseteq A'$.

پرهان: فرض می‌کنیم x عضو دلخواهی از B' باشد. بنابراین می‌توان گفت x عضو مجموعه B نیست. با توجه به فرض نتیجه می‌شود x عضو A هم نیست پس عضو A' است. در واقع نشان دادیم هر عضو B' عضو A' نیز هست پس $B' \subseteq A'$.

$$x \in B' \Rightarrow x \notin B \Rightarrow x \notin A \Rightarrow x \in A'$$

قضیه: ثابت کنید اگر دو مجموعه مساوی باشند متمم‌های آن دو مجموعه نیز مساویند.

پرهان: فرض می‌کنیم $A = B$ و نشان می‌دهیم $A' = B'$.

$$A = B \Rightarrow (A \subseteq B, B \subseteq A) \Rightarrow (B' \subseteq A', A' \subseteq B') \Rightarrow A' = B'$$

قضیه: ثابت کنید متمم متمم هر مجموعه با خودش مساوی است.

$$(A')' = \{x \mid x \in U, x \notin A'\} = \{x \mid x \in U, x \in A\} = A$$

پرهان:

$$x \in (A')' \Leftrightarrow x \notin A' \Leftrightarrow x \in A$$

روش دوم:

در این روش نشان دادیم هر عضو $(A')'$ عضو A هست و بالعکس پس $(A')' = A$.

قضیه: ثابت کنید متمم مجموعه مرجع مجموعه تهی است.

$$U' = \{x | x \in U, x \notin U\} = \emptyset$$

برهان:

قضیه: ثابت کنید $\emptyset' = U$.


$$U' = \emptyset \Rightarrow (U')' = \emptyset' \Rightarrow U = \emptyset'$$

برهان:

اعمال بر مجموعه‌ها


اجتماع:

$$A \cup B = \{x | x \in A \text{ یا } x \in B\}$$




اشتراک:

$$A \cap B = \{x | x \in A \text{ و } x \in B\}$$



تفاضل:

$$A - B = \{x | x \in A \text{ و } x \notin B\}$$



مثال ۱۸: اگر $A = \{10, 11, 12, 13, 14\}$ و $B = \{12, 13, 14, 15, 16\}$ باشند مجموعه‌های $A \cup B$ ، $A \cap B$ و $A - B$ را

مشخص کنید.

$$A \cup B = \{10, 11, 12, 13, 14, 15, 16\}$$

$$A \cap B = \{12, 13, 14\} \quad A - B = \{10, 11\}$$



مثال ۱۹: اگر $A = \{x | x \in \mathbb{Z}, -20 < x < 15\}$ و $B = \{x | x \in \mathbb{Z}, -14 \leq x < 25\}$ باشند، $A \cup B$ ، $A \cap B$ و $A - B$ را

مشخص کنید.

$$A \cup B = \{x | x \in \mathbb{Z}, -20 < x < 25\}$$

$$A \cap B = \{x | x \in \mathbb{Z}, -14 \leq x < 15\}$$

$$A - B = \{x | x \in \mathbb{Z}, -20 < x < -14\}$$

$$A \subseteq A \cup B \quad B \subseteq A \cup B$$

$$A \cap B \subseteq A \quad A \cap B \subseteq B$$

نکته:

قضیه: اگر $A \subseteq B$ آنگاه $A \cap B = A$ و $A \cup B = B$.



$$\begin{aligned} A \cup A &= A & A \cap A &= A \\ A \cup \emptyset &= A & A \cap \emptyset &= \emptyset \\ A \cup U &= U & A \cap U &= A \end{aligned}$$

نکته:

مثال ۱۰: اگر $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ و $A = \{5, 6, 7\}$ باشد، نشان دهید $A \cup A' = U$ و $A \cap A' = \emptyset$.

$$\begin{aligned} A' &= \{1, 2, 3, 4\} \\ A \cup A' &= \{5, 6, 7\} \cup \{1, 2, 3, 4\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} \\ A \cap A' &= \{5, 6, 7\} \cap \{1, 2, 3, 4\} = \emptyset \end{aligned}$$



به طور کلی $A \cup A' = U$ و $A \cap A' = \emptyset$ می‌باشد.

مثال ۱۱: حاصل عبارات زیر را به دست آورید.

$$\text{الف) } (A \cap U')' \cap (\emptyset' \cup A)' \qquad \text{ب) } (A \cup A')' \cup (A \cap A')$$

$$\text{الف) } (A \cap U')' \cap (\emptyset' \cup A)' = (A \cap \emptyset)' \cap (U \cup A)' = \emptyset' \cap U' = U \cap \emptyset = \emptyset$$

$$\text{ب) } (A \cup A')' \cup (A \cap A)' = U' \cup \emptyset' = \emptyset \cup U = U$$



دو مجموعه جدا از هم: دو مجموعه که هیچ عضو مشترکی نداشته باشد، دو مجموعه جدا از هم نامیده می‌شود. مانند مجموعه اعداد فرد و مجموعه اعداد زوج.

خواص اجتماع و اشتراک

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

۱- **فاصیت جابجایی:**

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

۲- **فاصیت شرکت پذیری:**

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

۳- **فاصیت پفشی (توزیع پذیری):**

$$(A \cup B)' = A' \cap B'$$

$$(A \cap B)' = A' \cup B'$$

۴- **قوانین دمرگان:**

$$A \cup (A \cap B) = A$$

$$A \cap (A \cup B) = A$$

۵- **قوانین جذب:**

اثبات:

$$A \cup (A \cap B) = (A \cap U) \cup (A \cap B) = A \cap (U \cup B) = A \cap U = A$$

مثال ۱۲: اگر $U = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ و $A = \{a, b, c\}$ و $B = \{b, c, d, e\}$ باشد، درستی قوانین دمرگان را نشان دهید.

$$A' = \{d, e, f, g\} \qquad B' = \{a, f, g\}$$

$$A \cup B = \{a, b, c, d, e\} \Rightarrow (A \cup B)' = \{f, g\}$$

$$A' \cap B' = \{f, g\}$$



ملاحظه می‌شود $(A \cup B)' = A' \cap B'$.

$$A \cap B = \{b, c\} \Rightarrow (A \cap B)' = \{a, d, e, f, g\}$$

$$A' \cup B' = \{a, d, e, f, g\}$$

ملاحظه می‌شود $(A \cap B)' = A' \cup B'$.

مثال ۱۱: اگر $U = \{x | x > -9\}$ و $A' \cup B = \{x | x > 13\}$ باشند، مجموعه $A \cap B'$ را مشخص کنید.

$$A \cap B' = (A' \cup B)' = \{x | -9 < x \leq 13\}$$



مثال ۱۲: ثابت کنید $(A' \cap B) \cap (A \cap B') = \emptyset$.

$$(A' \cap B) \cap (A \cap B') = (A' \cap A) \cap (B \cap B') = \emptyset \cap \emptyset = \emptyset$$



مثال ۱۳: ثابت کنید $B \cup (A \cup B)' = B$.

$$B \cup (A \cup B)' = B \cup (A' \cap B) = B$$



نکته: اگر $A = B$ آنگاه $A \cup C = B \cup C$ و $A \cap C = B \cap C$.

مثال ۱۴: اگر $A \cap C = B \cap C$ باشد آیا می‌توان گفت $A = B$ ؟ چرا؟

$$A = \{a, b, c, d\}$$

$$B = \{c, d, e\}$$

$$C = \{c, d, f\}$$

حل: خیر.

$$A \cap C = \{c, d\}$$

$$B \cap C = \{c, d\}$$

ملاحظه می‌شود $A \cap C = B \cap C$ ولی $A \neq B$.

مثال ۱۵: اگر A و B دو مجموعه جدا از هم باشند، ثابت کنید $A \subset B'$.

$$A \cap B = \emptyset \Rightarrow (A \cap B) \cup B' = \emptyset \cup B' \Rightarrow (A \cup B') \cap (B \cup B') = B'$$

$$(A \cup B') \cap U = B' \Rightarrow A \cup B' = B' \Rightarrow A \subset B'$$



نکته: $A - B \subseteq A$ و $B - A \subseteq B$.

قضیه: ثابت کنید $A - B = A \cap B'$.

$$A - B = \{x | x \in A, x \notin B\} = \{x | x \in A, x \in B'\} = A \cap B'$$

برهان:

مثال ۱۶: درستی تساوی‌های زیر را ثابت کنید.

الف) $A - A = \emptyset$

ب) $A - \emptyset = A$

ج) $\emptyset - A = \emptyset$

د) $U - A = A'$

هـ) $A - U = \emptyset$

و) $A - A' = A$

الف) $A - A = A \cap A' = \emptyset$

ج) $\emptyset - A = \emptyset \cap A' = \emptyset$

ه) $A - U = A \cap U' = A \cap \emptyset = \emptyset$

ب) $A - \emptyset = A \cap \emptyset' = A \cap U = A$

د) $U - A = U \cap A' = A'$

و) $A - A' = A \cap (A')' = A \cap A = A$



مثال ۹۹: درستی تساوی‌های زیر را ثابت کنید.

الف) $A - (A \cap B) = A - B$

ب) $A - (B - A) = A$

الف) $A - (A \cap B) = A \cap (A \cap B)' = A \cap (A' \cup B') = (A \cap A') \cup (A \cap B') = \emptyset \cup (A \cap B') = A \cap B' = A - B$

ب) $A - (B - A) = A - (B \cap A') = A \cap (B \cap A')' = A \cap (B' \cup A) = A$



مثال ۱۰۰: ثابت کنید اگر $A \subseteq B$ آنگاه $A - B = \emptyset$ و بالعکس.

$$A \subseteq B \Rightarrow A \cap B = A \Rightarrow (A \cap B) \cap B' = A \cap B' \Rightarrow A \cap (B \cap B') = A - B$$

$$A \cap \emptyset = A - B \Rightarrow \emptyset = A - B$$



بالعکس:

$$A - B = \emptyset \Rightarrow A \cap B' = \emptyset \Rightarrow B \cup (A \cap B') = B \cup \emptyset \Rightarrow (B \cup A) \cap (B \cup B') = B$$

$$(A \cup B) \cap U = B \Rightarrow A \cup B = B \Rightarrow A \subseteq B$$

مثال ۱۰۱: ثابت کنید اگر A و B دو مجموعه جدا از هم باشند آنگاه $A - B = A$ و بالعکس.

حل: فرض می‌کنیم $A \cap B = \emptyset$.

$$A - B = (A - B) \cup \emptyset = (A \cap B') \cup (A \cap B) = A \cap (B \cup B') = A \cap U = A$$

بالعکس:

$$A - B = A \Rightarrow B \cap (A - B) = B \cap A \Rightarrow B \cap (A \cap B') = A \cap B \Rightarrow (B \cap B') \cap A = A \cap B$$

$$\emptyset \cap A = A \cap B \Rightarrow \emptyset = A \cap B$$

مجموعه‌های متناهی و نامتناهی: مجموعه‌ای که تعداد عضوهای آن یک عدد حسابی باشد مجموعه متناهی نامیده می‌شود.

مجموعه‌ای که بی‌شمار عضو داشته باشد مجموعه‌ای نامتناهی نامیده می‌شود.

مجموعه مقسوم‌علیه‌های عدد ۲۴، مجموعه اعداد زوج سه‌رقمی و مجموعه درختان روی زمین مثال‌هایی از مجموعه متناهی

می‌باشند. همچنین مجموعه اعداد طبیعی زوج، مجموعه اعداد حقیقی بین $\frac{1}{۳}$ و $\frac{1}{۴}$ و مجموعه مضارب عدد ۷ مثال‌هایی از

مجموعه نامتناهی می‌باشند.

مثال ۱۰۲: کدام یک از مجموعه‌های زیر متناهی است؟

$$A = \{1, 2, 3, \dots, 10^{1000}\}$$

$$B = \left\{1, \frac{1}{۲}, \frac{1}{۳}, \frac{1}{۴}, \dots\right\}$$


$$C = (-\infty, 8]$$

$$D = \left(\frac{1}{۶}, \frac{1}{۵}\right)$$

حل: مجموعه A متناهی و سه مجموعه دیگر نامتناهی است.

تفاضل متقارن: تفاضل متقارن دو مجموعه A و B را که به صورت $A \Delta B$ نشان می‌دهیم به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$$



مثال ۱۱۱: درستی تساوی‌های زیر را ثابت کنید.

الف) $A \Delta A = \emptyset$

ب) $A \Delta \emptyset = A$

ج) $A \Delta U = A'$

د) $A \Delta A' = U$

الف) $A \Delta A = (A - A) \cup (A - A) = \emptyset \cup \emptyset = \emptyset$

ب) $A \Delta \emptyset = (A - \emptyset) \cup (\emptyset - A) = A \cup \emptyset = A$

ج) $A \Delta U = (A - U) \cup (U - A) = \emptyset \cup A' = A'$

د) $A \Delta A' = (A - A') \cup (A' - A) = A \cup A' = U$

مجموعه‌های اعداد: با مجموعه‌های اعداد در سال‌های گذشته آشنا شده‌اید که در این بخش به معرفی آن‌ها اکتفا می‌کنیم.

$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$ مجموعه اعداد طبیعی


$\mathbb{W} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ مجموعه اعداد حسابی

$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ مجموعه اعداد صحیح

$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}$ مجموعه اعداد گویا

$\mathbb{Q}' = \mathbb{R} - \mathbb{Q} = \{x \mid x \in \mathbb{R}, x \notin \mathbb{Q}\}$ مجموعه اعداد گنگ

$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}'$ مجموعه اعداد حقیقی



$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{W} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$


$$\mathbb{Q}' \subseteq \mathbb{R}$$

$$\mathbb{Q} \cap \mathbb{Q}' = \emptyset$$

مجموعه اعداد حقیقی را می‌توان با نقاط واقع بر روی یک محور متناظر دانست یعنی هر نقطه واقع بر محور اعداد حقیقی متناظر یک عدد حقیقی است و هر عدد حقیقی نیز جایگاهی روی محور دارد.



مثال ۱۱۲: نقطه نظیر عدد $1 - \sqrt{5}$ را روی محور اعداد حقیقی مشخص کنید.




$$AB = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{4+1} = \sqrt{5}$$



نقطه C نمایش عدد $1 - \sqrt{5}$ است.

مثال ۳۵: در شکل زیر نقطه C نمایش کدام عدد حقیقی است؟



$$AB = \sqrt{4^2 + 1^2} = \sqrt{16+1} = \sqrt{17} \Rightarrow AC = \sqrt{17}$$



نقطه C جایگاه عدد $-2 + \sqrt{17}$ یا $\sqrt{17} - 2$ روی محور است.

مثال ۳۶: اگر a عددی گویا و b عددی گنگ باشد ثابت کنید $a + b$ گنگ است.

حل: فرض می‌کنیم $a + b = c$ و $c \in \mathbb{Q}$.

$$a + b = c \Rightarrow b = c - a$$

در این تساوی c و a گویا می‌باشند پس $c - a$ گویا، در نتیجه b هم گویا است که خلاف فرض است. پس فرض $a + b$ گویاست نادرست است لذا $a + b$ گنگ است.

مثال ۳۷: اگر $a \neq 0$ و a عددی گویا و b عددی گنگ باشد ثابت کنید ab گنگ است.

حل: فرض می‌کنیم $ab = c$ عددی گویا باشد.

$$ab = c \Rightarrow b = \frac{c}{a}$$

با توجه به اینکه $a \neq 0$ است پس $\frac{c}{a}$ گویا در نتیجه b نیز گویا است. بنابراین فرض اینکه ab گویاست باطل و ab گنگ است. به همین ترتیب می‌توان ثابت کرد قرینه هر عدد گنگ، گنگ است. همچنین معکوس هر عدد گنگ، گنگ است.

مثال ۳۸: به ازای چه مقداری از k عدد $\frac{\sqrt{5} + 3}{3\sqrt{5} + k}$ عددی گویا است؟

حل: در صورتی عبارت فوق گویا می‌شود که عبارت‌های رادیکالی حذف شوند. اگر به جای k عدد ۹ را قرار دهیم مخرج سه برابر صورت می‌شود.

$$\frac{\sqrt{5} + 3}{3\sqrt{5} + 9} = \frac{\sqrt{5} + 3}{3(\sqrt{5} + 3)} = \frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$$

مثال ۳۹: اعداد $\sqrt{3}$ و $\sqrt{\sqrt{10}}$ و $\sqrt{\sqrt{\sqrt{80}}}$ را به صورت صعودی مرتب کنید.

$$(\sqrt{3})^4 = 3^2 = 9 \quad (\sqrt{\sqrt{10}})^4 = (\sqrt{10})^2 = 10 \quad (\sqrt{\sqrt{\sqrt{80}}})^4 = (\sqrt{\sqrt{80}})^2 = \sqrt{80}$$



$$\sqrt{80} < 9 < 10 \Rightarrow \sqrt{\sqrt{\sqrt{80}}} < \sqrt{3} < \sqrt{\sqrt{10}}$$

مثال ۴۰: به ازای چند مقدار صحیح x عبارت $\sqrt{125 - \sqrt{x}}$ عددی صحیح می‌شود؟



$$125 - \sqrt{x} = k^2 \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$125 - k^2 = \sqrt{x} \Rightarrow 125 - k^2 \geq 0 \Rightarrow 125 \geq k^2$$

به جای k اعداد 0 تا 11 را می‌توان قرار داد که تعداد آن‌ها 12 تا می‌شود.

بازه: زیرمجموعه‌ای از \mathbb{R} که شامل تمام اعداد حقیقی بین دو عدد مشخص باشد یا فاصله می‌نامند. مانند اعداد

حقیقی بین -5 و 3 . $A = \{x \mid x \in \mathbb{R}, -5 < x < 3\}$

اگر بازه شامل اعداد ابتدا و انتهایش باشد، بازه را بازه بسته می‌نامند و اگر شامل اعداد ابتدا و انتهایش نباشد، بازه باز نامیده می‌شود.

$$A = \{x \mid x \in \mathbb{R}, -4 \leq x \leq 3\} = [-4, 3]$$



بازه بسته

$$B = \{x \mid x \in \mathbb{R}, -4 < x < 3\} = (-4, 3)$$



بازه باز

$$C = \{x \mid x \in \mathbb{R}, -4 \leq x < 3\} = [-4, 3)$$



بازه نیم‌باز

$$D = \{x \mid x \in \mathbb{R}, x > -2\} = (-2, +\infty)$$



بازه باز

$$E = \{x \mid x \in \mathbb{R}, x \leq -2\} = (-\infty, -2]$$



بازه نیم‌باز

مثال ۱۳: بازه $[-\sqrt{18}, \sqrt{18}]$ چند عضو صحیح دارد؟



اعداد صحیح از -4 تا $+4$ عضو بازه می‌باشند که تعداد آن‌ها برابر 9 می‌باشد.

مثال ۱۴: اگر $A = [-9, 7]$ و $B = [-5, 12]$ باشد، $A \cup B$ و $A \cap B$ و $A - B$ را مشخص کنید.



$$A \cup B = [-9, 12]$$

$$A \cap B = [-5, 7]$$

$$A - B = [-9, -5)$$



مثال ۱۵: اگر $A = [-13, 19]$ و $B = (-8, 12)$ باشد، مجموعه‌های $A \cup B$ ، $A \cap B$ ، $A - B$ و $B - A$ را مشخص کنید.



$$A \cup B = [-13, 19] = A$$

$$A \cap B = (-8, 12) = B$$

$$A - B = [-13, -8] \cup [12, 19]$$

$$B - A = \emptyset$$



مثال ۱۶: مجموعه همه اعداد حقیقی به جز عدد 5 را به صورت بازه بنویسید.



$$(-\infty, 5) \cup (5, +\infty)$$

مثال ۱۷: مجموعه همه اعداد حقیقی به جز اعداد -7 و 2 را به صورت بازه بنویسید.



$$(-\infty, -7) \cup (-7, 2) \cup (2, +\infty)$$

مثال ۴۶: اگر $A = [-15, +\infty)$ و $B = (-\infty, 8)$ باشد مجموعه‌های $A \cup B$ ، $A \cap B$ ، $A - B$ و $B - A$ را مشخص کنید.

$$A \cup B = (-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$$

$$A \cap B = [-15, 8)$$

$$A - B = [8, +\infty)$$

$$B - A = (-\infty, -15)$$



مثال ۴۷: اگر $A_1 = (1, +\infty)$ و $A_p = (p, +\infty)$ و \dots و $A_n = (n, +\infty)$ ، مجموعه‌های زیر را مشخص کنید.

الف) $A_1 \cup A_p \cup \dots \cup A_{p_0}$

ب) $A_1 \cap A_p \cap \dots \cap A_{p_0}$

$$A_n \subset \dots \subset A_p \subset A_1$$

الف) $A_1 \cup A_p \cup \dots \cup A_{p_0} = A_1$

ب) $A_1 \cap A_p \cap \dots \cap A_{p_0} = A_{p_0}$




مثال ۴۸: اگر $A_n = \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)$ و n عددی طبیعی باشد، حاصل $\bigcap_{k=1}^{p_0} A_k$ را به دست آورید.

$$A_1 = (-1, 1) \quad , \quad A_p = \left(-\frac{1}{p}, \frac{1}{p}\right)$$

$$A_p = \left(-\frac{1}{p}, \frac{1}{p}\right) \quad , \quad A_{p_0} = \left(-\frac{1}{p_0}, \frac{1}{p_0}\right)$$

$$\bigcap_{k=1}^{p_0} A_k = A_1 \cap A_p \cap A_p \cap \dots \cap A_{p_0} = (-1, 1) = A_1$$



عدد اصلی یک مجموعه: در یک مجموعه متناهی تعداد عضوهای مجموعه را عدد اصلی مجموعه می‌نامند. عدد اصلی مجموعه A را با $n(A)$ نشان می‌دهیم.

عدد اصلی اجتماع دو مجموعه

دو مجموعه $A = \{1, 2, 3, 4\}$ و $B = \{5, 6, 7\}$ را در نظر بگیرید.

$$n(A) = 4$$

$$n(B) = 3$$

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} \Rightarrow n(A \cup B) = 7$$

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B)$$

آیا این تساوی همواره درست است؟ برای پاسخ به سؤال دو مجموعه C و D را در نظر بگیرید.

$$C = \{5, 6, 7, 8\}$$

$$D = \{7, 8, 9\}$$

$$n(C) = 4$$

$$n(D) = 3$$

$$C \cup D = \{5, 6, 7, 8, 9\} \Rightarrow n(C \cup D) = 5$$

$$n(C \cup D) = 5 \neq 4 + 3$$

بنابراین جواب پرسش قبلی منفی است اما با توجه به اینکه دو مجموعه C و D، ۲ عضو مشترک دارند می‌توان گفت:

$$n(C \cup D) = n(C) + n(D) - n(C \cap D)$$

$$۵ = ۴ + ۳ - ۲$$

مثال ۴۹: در یک کلاس ۳۰ نفره ۲۴ نفر به فوتبال و ۱۶ نفر به والیبال علاقه‌مندند. در صورتی که هر دانش‌آموز کلاس لااقل به

یکی از این دو ورزش علاقه‌مند باشد، چند نفر به هر دو ورزش علاقه‌مندند؟ چند نفر فقط به فوتبال علاقه دارند؟

$$n(F \cup V) = ۳۰ \quad n(F) = ۲۴ \quad n(V) = ۱۶$$

$$n(F \cup V) = n(F) + n(V) - n(F \cap V)$$

$$۳۰ = ۲۴ + ۱۶ - n(F \cap V) \Rightarrow n(F \cap V) = ۲۴ + ۱۶ - ۳۰ = ۱۰$$

فقط به فوتبال علاقه‌مندند $۲۴ - ۱۰ = ۱۴$



مثال ۵۰: در میان اعداد ۱ تا ۲۰۰ چند عدد بر ۲ یا بر ۳ بخش پذیرند؟

مجموعه اعدادی را که بر ۲ بخش پذیرند را A و مجموعه اعدادی که بر ۳ بخش پذیرند را B می‌نامیم.

$$\begin{array}{r|l} ۲۰۰ & ۳ \\ \hline ۱۸ & ۶۶ \\ \hline ۲۰ & \\ \hline ۱۸ & \\ \hline ۲ & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} ۲۰۰ & ۲ \\ \hline ۲۰۰ & ۱۰۰ \\ \hline ۰ & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} ۲۰۰ & ۶ \\ \hline ۱۸ & ۳۳ \\ \hline ۲۰ & \\ \hline ۱۸ & \\ \hline ۲ & \end{array}$$

$$n(A) = ۱۰۰ \quad n(B) = ۶۶ \quad n(A \cap B) = ۳۳$$

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$= ۱۰۰ + ۶۶ - ۳۳ = ۱۳۳$$



مثال ۵۱: اگر A و B و C سه مجموعه دلخواه باشند ثابت کنید:

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

$$n(A \cup B \cup C) = n[A \cup (B \cup C)] = n(A) + n(B \cup C) - n[A \cap (B \cup C)]$$

$$= n(A) + n(B) + n(C) - n(B \cap C) - n[(A \cap B) \cup (A \cap C)]$$

$$= n(A) + n(B) + n(C) - n(B \cap C) - [n(A \cap B) + n(A \cap C) - n(A \cap B \cap C)]$$

$$= n(A) + n(B) + n(C) - n(B \cap C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$



مثال ۵۲: در یک کلاس ۳۵ نفره همه دانش‌آموزان به یکی از دروس ریاضی، فیزیک یا شیمی علاقه‌مندند. برای مسابقات علمی

۱۶ نفر ریاضی، ۱۵ نفر فیزیک و ۱۲ نفر شیمی را انتخاب کردند. اگر ۶ نفر ریاضی و فیزیک، ۷ نفر ریاضی و شیمی و ۴ نفر

فیزیک و شیمی را انتخاب کرده باشند چند نفر هر سه رشته را انتخاب کرده‌اند؟ چند نفر فقط ریاضی را انتخاب کرده‌اند؟



$A \rightarrow$ ریاضی

$B \rightarrow$ فیزیک

$C \rightarrow$ شیمی

$$n(A \cup B \cup C) = ۳۵$$

$$n(A) = ۱۶$$

$$n(B) = ۱۵$$

$$n(C) = ۱۲$$

$$n(A \cap B) = ۶$$

$$n(A \cap C) = ۷$$

$$n(B \cap C) = ۴$$

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

$$۳۵ = ۱۶ + ۱۵ + ۱۲ - ۶ - ۷ - ۴ + n(A \cap B \cap C)$$

$$۳۵ = ۲۶ + n(A \cap B \cap C) \Rightarrow n(A \cap B \cap C) = ۹$$

$$n(A) - n(A \cap B) - n(A \cap C) + n(A \cap B \cap C) = ۱۶ - ۶ - ۷ + ۹ = ۱۲ \text{ فقط ریاضی } ۱۲$$

مثال ۱۵: ثابت کنید $n(A - B) = n(A) - n(A \cap B)$

حل: به سادگی می‌توان نشان داد $A = (A - B) \cup (A \cap B)$.

همچنین $(A - B)$ و $(A \cap B)$ دو مجموعه جدا از هم هستند زیرا:


$$(A - B) \cap (A \cap B) = (A \cap B') \cap (A \cap B) = (A \cap A) \cap (B \cap B') = A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$n(A) = n[(A - B) \cup (A \cap B)] = n(A - B) + n(A \cap B)$$

$$n(A - B) = n(A) - n(A \cap B)$$

بخش دوم: الگو و دنباله

شکل‌های زیر و تعداد چوب کبریت‌های هر شکل را در نظر بگیرید.



می‌خواهیم ببینیم شکل دهم از چند چوب کبریت تشکیل می‌شود؟ شکل n ام چطور؟

با کمی دقت ملاحظه می‌کنیم تعداد چوب کبریت‌های هر شکل ۳ واحد بیشتر از تعداد چوب کبریت‌های شکل قبلی است.

شکل اول	شکل دوم	شکل سوم	شکل چهارم
۱	$1 + 3 = 4$	$1 + 3 + 3$	$1 + 3 + 3 + 3$

تعداد چوب کبریت‌های شکل اول را با t_1 ، تعداد چوب کبریت‌های شکل دوم را با t_2 و ... و تعداد چوب کبریت‌های شکل n ام را با t_n نشان می‌دهیم.

$$t_1 = 1$$

$$t_2 = 1 + 3 = 1 + 1 \times 3 = 4$$

$$t_3 = 1 + 3 + 3 = 1 + 2 \times 3 = 7$$

$$t_4 = 1 + 3 + 3 + 3 = 1 + 3 \times 3 = 10$$

⋮

$$t_{10} = 1 + \underbrace{3 + 3 + \dots + 3}_{9 \text{ تا}} = 1 + 9 \times 3 = 28$$

⋮

$$t_n = 1 + (n-1) \times 3 = 1 + 3n - 3 = 3n - 2$$

مثال ۵۴: در دنباله شکل‌هایی که بیان کردیم شکل بیستم از چند چوب کبریت تشکیل شده است؟ معین کنید چندمین شکل دنباله

از ۹۴ چوب کبریت تشکیل شده است؟

$$t_{20} = 3 \times 20 - 2 = 58$$

$$t_n = 94 \Rightarrow 3n - 2 = 94 \Rightarrow 3n = 96 \Rightarrow n = 32$$

رابطه $t_n = 3n - 2$ را جمله عمومی دنباله می‌نامند. با توجه به اینکه توان n و t_n یک می‌باشد معادله جمله عمومی شبیه معادله خط می‌باشد. چنین الگویی را الگوی خطی می‌نامند.

مثال ۵۵: در دنباله شکل‌های زیر معین کنید شکل n ام از چند مربع سفید تشکیل شده است؟ شکل بیستم چند مربع سفید دارد؟

چندمین شکل دارای ۳۴۰ مربع سفید است؟

