

# مقدمه

یکی از مشکلات داوطلبان کنکور نظام جدید، حذف یا اضافه شدن برخی از مباحث کتاب درسی است. حتماً برای تان پیش آمد که با اعتماد به نفس حاصل از شرکت در کلاس استاد مورد اعتماد تان یا مطالعه دقیق کتاب و جزو سراغ تست های یک کتاب بروید و یکی در میان به تست هایی برخورد کنید که به هیچ عنوان نشانه ای از آن هادر کتاب درسی وجود ندارد اما بعد از کلی بالا و پایین پریدن و پرس و جو متوجه شوید که موضوع مربوط به این تست از کتاب درسی حذف شده و شما بایخود و بجهت کلی لزوقت تان راهبرد داده ایدنا ما ارزش لحظه لحظه از عمر شما را می دانیم و به همین دلیل، از تست ها و درسنامه های قدیمی و معمولی استفاده نکرده ایم. بلکه ماهها وقت گذاشتیم و از صفر تا صد کتاب را از نو نوشتم.

## روش استفاده از این کتاب

اولین قدم برای موفقیت در زیست‌شناسی کنکور، تهیه کتاب جامع مهر ماه است که شما انجام داده اید و حالا باید روش استفاده درست از این کتاب را یاد بگیرید. کارهایی که بهتر است انجام دهید:

۱ بعده از شرکت در کلاس درس و مطالعه جزو دیر محترم تان، حتماً سراغ کتاب درسی بروید. چون بهترین منبع مطالعاتی است. هر بار که به مطالعه کتاب درسی می پردازید، نکات جدیدی به چشم تان می خورد این زمان کافی برای مطالعه کتاب درسی در نظر بگیرید. ضمن خواندن، های لایت و یادداشت برداری کنید. منظور ما از یادداشت برداری، خلاصه نویسی کتاب نیست؛ بلکه باید مطالب را بنویسید که به دقت بیشتری نیاز دارند. یادتان باشد که هیچ خلاصه و یا جزو های نمی تواند جایگزین کتاب درسی باشد.

۲ حالا وقت آن است که کتاب مهر ماه را باز کنید و نمودار ابتدای گفتارها را مطالعه کنید. این نمودار یک سازمان دهنده ذهنی فوق العاده است و در ایجاد دید کل نگری به شما کمک می کند.

۳ برای مطالعه درسنامه، حسابی وقت بگذارید. درسنامه هر گفتار حاوی تمام مطالب و مفاهیم اساسی، نکات کنکوری است که به آنها نیاز دارید.

۴ به صورت مجموعه ای تست بزنید. بهتر است تست های یک زیر موضوع را به دنبال هم بزنید. به عنوان مثال در فصل اول این کتاب، تست های مربوط به مولکول های زیستی را به دنبال هم پاسخ دهید. اگر تعداد تست ها به نظرتان زیاد آمد، می توانید ده تا ده تا تست بزنید. سپس با یک فلش بک از ابتداء، هر تست و پاسخ نامه آن را به طور دقیق بررسی کنید. یادتان باشد که باید پاسخ نامه همه تست ها به طور کامل مطالعه شوند.

۵ با استفاده از اطلاعاتی که از خواندن پاسخ نامه به دست آوردید، تست ها را آنالیز کنید. این کار می تواند همراه با یادداشت هایی در کنار سوالات یا گزینه های آنها باشد که نشان می دهد به نکات سؤال و دلایل درستی یا نادرستی گزینه ها پی برده اید.

۶ در آخر توصیه می کنیم کتاب های جامع پایه های یازدهم و دوازدهم را تهیه کنید. این سه کتاب در مجموع سهم مهمی در موفقیت شما خواهند داشت.

## برخی از ویژگی‌های این کتاب

- ۱ مطالب اساسی در ابتدای هر گفتار به صورت یک خلاصه نموداری فوق العاده نوشته شده‌اند.
- ۲ برای هر فصل تعداد مناسبی تست تالیفی و انتخابی از کنکور سراسری و آزمون‌های قلمچی طبقه‌بندی شده‌اند. به طوری که تعداد تست‌ها نه آنقدر کم است که پوشش مطالب ناقص باشد و نه آنقدر زیاد که وقت تان را هدر بدهد.
- ۳ از هر تیپ استاندارد (مانند سوالات شمارشی، عبارت‌های درست و نادرست، مقایسه‌ای و شکل) سوال طراحی کرده‌ایم. در ضمن شیوه طراحی تست‌ها با کنکور سال‌های اخیر (و حتی سال‌های بعد) انطباق دارد.
- ۴ بسیاری از سوالات این کتاب مفهومی و ترکیبی هستند. در ابتداممکن است این ویژگی کمی شما را عصبی کند. اما اولاً به زودی عادت می‌کنید دوماً چه بخواهید و چه نخواهید بیشتر سوالات کنکور نیز به همین صورت هستند. پس مطمئن و پرانرژی ادامه دهید!
- ۵ علاوه بر سوالات کنکور ۱۴۰۰، از بین سوالات کنکورهای گذشته، فقط آن‌هایی را آورده‌ایم که به دردتان می‌خورند و در صورت لزوم تغییراتی در آن‌ها ایجاد کرده‌ایم تا با کتاب شما انطباق داشته باشند.
- ۶ در پاسخ‌نامه تشریحی، همه گزینه‌ها و عبارت‌ها را به طور کامل شرح داده‌ایم و شما با خواندن پاسخ‌ها، همواره ما را کنار خودتان حس خواهید کرد.
- ۷ برای هر موضوع اصلی، یک یا چند «اصل مطلب» نوشته‌ایم که می‌توانید با خواندن آن‌ها خودتان را شارژ کنید! اصل مطلب‌ها در واقع درسنامه‌های مفید و کاربردی به روش مهروماه هستند.
- ۸ برای هر «اصل مطلب» موجود در درسنامه‌ها، یک ویدئوی آموزشی آماده کرده‌ایم که دیدن آن به یادگیری بهتر مطلب کمک می‌کند. برای دیدن ویدئوهای آموزشی کافی است رمزینه موجود در اولین صفحه هر فصل کتاب را اسکن کنید.

## معنی علایم به کار رفته در این کتاب

- ۹ مشاوره: این باکس‌ها در ابتدای مجموعه‌های تستی قرار داده شده‌اند و همانند یک دبیر با تجربه، شما را در طول مسیر راهنمایی و از اهمیت موضوعات آگاه می‌کنند.
- ۱۰ اصل مطلب یک درسنامه فشرده برای تسلط بر مفاهیم اساسی هر موضوع درسی نوشته‌ایم که شما با خواندن آن، خودتان را به اندازه چندین تست شارژ می‌کنید! در طول مسیر آماده‌سازی برای کنکور، هر وقت احساس کردید که شارژتان افتاده است، به این اصل مطلب‌ها سر بزنید!
- ۱۱ نکته: موضوعات کلیدی که شناس بالایی برای مطرح شدن در کنکور دارند، به صورت متمایز با عنوان نکته نوشته شده‌اند.
- ۱۲ دقیقت کنیدا مطالبی که با این علامت مشخص شده‌اند نیز در واقع نکته محسوب می‌شوند. با این تفاوت که احتمال دارد شما آن را با موضوع دیگری اشتباه بگیرید. با مشخص کردن این مطالب، به شما کمک می‌کنیم که در دام نیافتید!
- ۱۳ تذکر مهم: این علامت نشان می‌دهد که مقصود داریم در مورد یک مطلب به شما اخطار بدھیم و می‌خواهیم حواس‌تان را در مورد آن مطلب جمع کنید!
- ۱۴ بررسی سایر گزینه‌ها در پاسخنامه سوالات، علاوه بر توضیح گزینه درست، گزینه‌های نادرست را نیز به طور مفصل، با این عنوان توضیح داده‌ایم.
- ۱۵ بررسی تک تک موارد یکی از تیپ‌های سوالاتی که ممکن است شما با دیدن آن‌ها عصبی شوید، سوالات شمارشی هستند! برای این‌که بین شما و این سوالات دوستی برقرار کنیم، تک تک موارد درست و نادرست را تحت این عنوان شرح داده‌ایم.
- ۱۶ نزوم: بارسیدن به این نشانه، اگر آپ دست‌تان بود زمین بگذارید و دو دستی بچسبید به کتاب مهروماد! مطالبی که با این نشانه مشخص شده‌اند، در واقع آنالیز نکات حرفه‌ای موجود در متن یا شکل کتاب درسی هستند که به دلیل ماهیتی که دارند، به احتمال زیاد مورد توجه طراحان کنکور سراسری قرار خواهند گرفت.
- ۱۷ نقد کتاب درسی: این نشانه زمانی به کار رفته است که نحوه بیان مطلبی در کتاب درسی به شکل نامطلوب بوده و امکان دارد برداشت اشتباهی صورت گیرد. خواندن این قسمت‌ها، باعث می‌شود درگ بهتری از کتاب درسی داشته باشید.

جناب آقای اختیاری مدیریت محترم انتشارات مهرماه به دلیل حمایت‌ها و ایده‌های خلاقانه‌شان.  
خانم مریم رضایی و آقای علی صادقی پناه که بخش قابل توجهی از وقت خود را به ویرایش این کتاب اختصاص دادند.  
همکاران واحد تولید، خانم مریم تاجداری، آقای میلاد صفایی و خانم‌ها پریسا حسینی و مرجان سپهریان که با نهایت دقت امور  
تولید، فنی و صفحه‌آرایی کتاب را انجام دادند و ذوق و هنرشنان، چهره زیبایی به کتاب بخشید.  
خانم‌ها مریم صابری و مریم مقدم سليمی که ساعت‌ها چشم به مانیتور دوختند تا چشمان شما تصاویر بهتری ببینند.  
آقایان محسن فرهادی و تایماز کاویانی که امور هنری این کتاب را به بهترین شکل انجام دادند.  
جناب آقای عباس گودرزی مدیر فروش محترم انتشارات که رسیدن کتاب‌های ما به دست شما در اقصی نقاط کشور مدیون  
زحمات ایشان است.  
همکاران واحد روابط عمومی آقایان امیرانوشه، عmad ولدی و سایر عزیزانی که نظرات دبیران و دانش‌آموزان سراسر کشور را به ما  
انتقال می‌دهند تا بتوانیم کتابی متناسب با نیاز شما تولید کنیم.

علی پناهی شایق

تیرماه ۱۴۰۰

# فهرست


|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>۱</b><br>۸<br>۱۷<br>۳۴<br>۵۹               | <b>فصل ۱: دنیای زندگی</b><br>کفتار ۱، زیست‌شناسی چیست؟<br>کفتار ۲، گستره حیات<br>کفتار ۳، باخته و بافت در بدن انسان<br>آزمون فصل ۱ پاسخنامه  |    |
| <b>۸۷</b><br>۸۸<br>۱۱۰<br>۱۲۲<br>۱۳۸          | <b>فصل ۲: گوارش و جذب مواد</b><br>کفتار ۱، ساختار و عملکرد لوله گوارش<br>کفتار ۲، جذب مواد و تنظیم فعالیت‌های دستگاه گوارش<br>کفتار ۳، نوع گوارش در حیوانات<br>آزمون فصل ۲ پاسخنامه      |    |
| <b>۱۷۱</b><br>۱۷۲<br>۱۸۷<br>۱۹۹<br>۲۱۴        | <b>فصل ۳: تبادلات گازی</b><br>کفتار ۱، سازوکار دستگاه تنفس در انسان<br>کفتار ۲، تهوية شناسی<br>کفتار ۳، نوع تبادلات گازی<br>آزمون فصل ۳ پاسخنامه   |  |
| <b>۲۴۱</b><br>۲۴۲<br>۲۶۲<br>۳۷۶<br>۳۸۹<br>۳۹۳ | <b>فصل ۴: گردش مواد در بدن</b><br>کفتار ۱، قلب<br>کفتار ۲، رگ‌ها<br>کفتار ۳، خون<br>کفتار ۴، نوع گردش مولکولی و جمجمه‌ای<br>آزمون فصل ۴ پاسخنامه   |  |
| <b>۳۴۳</b><br>۳۴۴<br>۳۵۳<br>۳۶۰<br>۳۷۹        | <b>فصل ۵: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد</b><br>کفتار ۱، همایستایی و کلیه‌ها<br>کفتار ۲، فرایند تشکیل ادرار و تخلیه آن<br>کفتار ۳، نوع دفع و تنظیم اسمزی در حیوانات<br>آزمون فصل ۵ پاسخنامه |  |
| <b>۴۰۱</b><br>۴۰۲<br>۴۱۳<br>۴۲۴<br>۴۴۱        | <b>فصل ۶: ازیاخته تا گیاه</b><br>کفتار ۱، ویژگی‌های بااخته گیاهی<br>کفتار ۲، سلامانه باقی<br>کفتار ۳، ساختار گیاهان<br>آزمون فصل ۶ پاسخنامه  |  |
| <b>۴۶۵</b><br>۴۶۶<br>۴۷۵<br>۴۸۳<br>۵۰۵        | <b>فصل ۷: جذب و انتقال مواد در گیاهان</b><br>کفتار ۱، تغذیه گیاهی<br>کفتار ۲، حیوانات مؤثر در تغذیه گیاهی<br>کفتار ۳، انتقال مواد در گیاهان<br>آزمون فصل ۷ پاسخنامه                      |  |



برای مشاهده  
ویدیوهای آموزشی  
رمزینه مقابل را  
اسکن کنیدا

۱

## فصل



# دنیای زندگانی

زیست‌شناسی، شاخه‌ای از علوم تجربی است. دانشمندان و پژوهشگران این رشته، کارشان بررسی جانداران و فرایندهای زیستی و به عبارت دیگر «دنیای زندگانی» است. برخی از زیست‌شناسان قدیمی عمرشان را صرف گروه‌بندی جانداران کردند و عده‌ای دیگر رؤیایشان مشاهده جانداران ذره‌بینی بود که تلاش کردند با ساختن میکروسکوپ‌های ابتدایی به آن جامه عمل بپوشانند. زیست‌شناسان امروزی بیشتر کارشان با مولکول‌های درون یاخته‌ها، به ویژه ماده و راثتی است. بعد از شناخت ساختار مولکول دنادر سال ۱۹۵۳، این رشته (زیست‌شناسی) حسابی مت حول شد. امروزه پژوهشگران زیست‌شناسی تلاش می‌کنند با شناخت ژن‌ها و تغییراتی که در آن‌ها ایجاد می‌کنند، در ابعاد مختلف زندگی انسان از درمان بیماری‌ها گرفته تا اصلاح محصولات کشاورزی، تأثیر بگذارند. کسی چه می‌داند؛ شاید در آینده به لطف پژوهش‌های زیست‌شناسی بتوانیم به کلینیک‌های ویژه‌ای مراجعه کرده و هر یک از صفات رابه شکل دلخواه‌مان تغییر دهیم! اندام‌های قطع شده را در زمان کوتاهی بازسازی کرده و جایگزین کنیم و قبل از این که یک اندام (مثل قلب) از کار بیفتد، بتوانیم با استفاده از یاخته‌های بدن خودمان، یک قلب یدکی بسازیم!

# گفتار اول

## زیست‌شناسی چیست؟

- الف** شاخه‌ای از علوم تجربی است که به بررسی علمی جانداران و فرایندهای زیستی می‌پردازد.  
**ب** فقط ساختارها و فرایندهایی بررسی می‌شوند که بطور مستقیم با غیرمستقیم قبل مشاهده و اندازه‌گیری هستند.  
**پ** نمونه‌ای از آثار زیست‌شناسی — مهار بسیاری لزبعلی‌ها — مثال: بیماری قند (دیابت)  
**پ** افزایش فشار خون

حدوده علم زیست‌شناسی

زیست‌شناسی توین

- برای بررسی سلماههای بزرگ به کار می‌رود.  
**الف** کل‌نگری  
**۱** اجزای سامانه با هم ارتباط دارند. — کل سامانه چیزی بیشتر از مجموع اجزای آن است.  
**۲** در کل‌نگری، ارتباط بین اجزا همانند خود اجزا در تشکیل جاندار مؤثرند.  
**ب** استفاده از اطلاعات رشته‌های دیگر برای شناخت هرچه بیشتر سلماههای زنده  
**نگرش بین رشته‌ای** مثال: استفاده از فنون و مفاهیم مهندسی، علوم رایانه و آمار برای بررسی زن‌های جانداران  
**۱** فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی — جمع‌آوری، بایگانی و تحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش‌ها  
**۲** فناوری‌های نوین — انتقال زن‌های یک جاندار به بدن جاندار دیگر (انتقال صفت)  
**پ** محیمانه بودن اطلاعات زنی و پژوهشکی افراد  
**۱** موضوعات مهم — حقوق جانوران  
**۲** عامل بیماری‌زای مقاوم نسبت به داروهای رایج — بکی از سو واستفاده‌ها — تولید سلاح زیستی  
**ت** اخلاقی زیستی  
**۱** فراوردهای غذایی و دارویی با عواقب زیانبار

شناخت روابط گیاهان و محیط‌زیست

- یکی از راه‌های افزایش کیفیت و کمیت عذای انسان است.  
**الف** زنده: باکتری‌ها، قارچ‌ها و حشرات  
**ب** غیرزنده: دما، نور و رطوبت  
**ت** گیاهان و عوامل محیطی

زیست‌شناسی در خدمت انسان

- خدمات بوم‌سازگان: منابع و سودهایی که هر بوم‌سازگان دارد.  
**الف** میزان خدمات بوم‌سازگان — به میزان تولید‌کنندگان آن بستگی دارد  
**۱** زنده: باکتری‌ها، قارچ‌ها و حشرات  
**۲** غیرزنده: دما، نور و رطوبت  
**ب** حفاظت از بوم‌سازگان  
**۱** پایدار کردن بوم‌سازگان — ارتقای کیفیت زندگی انسان  
**۲** بوم‌سازگان‌های آسیبدیده ایران — مثال: خشک شدن دریاچه ارومیه  
**ت** تأمین انرژی‌های تجدیدناپذیر  
**الف** انرژی‌های تجدیدناپذیر — معايیه افزایش الودگی هوا، گرمابش زمین و افزایش  $CO_2$  جو  
**ب** پایدارتر، مؤثرتر و پاکتر از سوخت‌های فسیلی  
**۱** انرژی‌های تجدیدناپذیر — یکی از مزایه الودگی کمتر هوا  
**ت** پژوهشگر شخصی  
**۱** تشخیص و درمان بیماری‌ها با بررسی وضع بیمار و اطلاعات دنای او  
**۲** طراحی روش‌های درمانی و دارویی خاص هر فرد

## آموزش تصویری ویدئوی شماره ۱

## اصل مطلب



• پروانه مومنارک، یکی از شگفتانگیزترین رفتارها را به نمایش می‌گذارد. جمعیت این پروانه‌ها هر سال هزاران کیلومتر را از مکزیک تا جنوب کانادا و بالعکس می‌پیماید.

• زیست‌تناسان به تازگی در بدن پروانه مومنارک، یاخته‌های عصبی (نورون‌هایی) یافته‌اند که پروانه‌ها با استفاده از آن‌ها، جایگاه خورشید در آسمان و جهت مقصد را تشخیص می‌دهند و به سوی آن پرواز می‌کنند.

۱ پروانه مومنارک برای جهت‌یابی مسیر مهاجرت خود از جایگاه خورشید در آسمان استفاده می‌کند: بنابراین مهاجرت این جانور، فقط در روز انجام می‌شود.

۲ **نکته** جایه‌جایی طولانی و رفت و برگشتی جانوران، مهاجرت نام دارد.

۳ **نکته** رفتار مهاجرت پروانه مومنارک، نوعی رفتار غریزی است. بنابراین هر پروانه هنگام تولد، اطلاعات و راستی مربوط به انجام این رفتار را در مولکول‌های دنای خود دارد و پس از بالغ شدن، می‌تواند این رفتار را بروز دهد.

**روزوم**: در اولین صفحه از کتاب درسی می‌خوانیم: «جمعیت پروانه‌های مومنارک هر سال هزاران کیلومتر را از مکزیک تا جنوب کانادا و بالعکس می‌پیماید» پس این مسیر توسط جمعیت پروانه‌های مومنارک طی می‌شود (نه یک پروانه). در واقع یک پروانه به دلایل مختلف نمی‌تواند مسافت به این زیادی را ببرود و برگرداد! یکی از این دلایل، عمر کوتاه این جانوران است. به عبارت دیگر، مهاجرت پروانه‌های مومنارک طی چندین نسل صورت می‌گیرد.

۴ **نکته** جانوران مختلف برای جهت‌یابی تعیین مسیر خود از نشانه‌های محیطی (مثل موقعیت خورشید و ستاره‌ها) و همچنین میدان مغناطیسی زمین استفاده می‌کنند. مانند پرنده‌گان مهاجر که با استفاده از موقعیت خورشید (در روز)، موقعیت ستاره‌ها (در شب) و میدان مغناطیسی زمین جهت‌یابی انجام می‌دهند.

۵ **نکته** لاکپشتها با استفاده از میدان مغناطیسی زمین جهت‌یابی انجام می‌دهند.

۶ **نکته** در آزمون‌های مختلف، به بهانه این که پروانه مومنارک نوعی حشره است، از دستگاه مختلف بدن آن سؤال طرح می‌شود. پس لازم است در اینجا یک مرور سریع در مورد دستگاه‌های بدن حشرات داشته باشیم:

▪ **سامانه تنفسی**: حشرات، تنفس نایدیسی دارند. هر نایدیس از لوله‌های منشعب و مرتبط به هم تشکیل شده است که از طریق منفذی با محیط خارج ارتباط دارند.

▪ **سامانه گردش خون**: حشرات، سامانه گردشی باز دارند. این جانوران مویرگ ندارند و به جای خون، مابعی به نام همولف را به گردش در می‌آورند. همولف توسط قلب به درون رگ‌ها پمپ می‌شود و از انتهای باز رگ‌ها وارد حفره‌های بدن و فضای بین یاخته‌ها می‌شود.

▪ **سامانه دفعی**: حشرات، سامانه‌های دفعی متصل به روده، به نام لوله‌های مالپیگی دارند. این لوله‌ها مواد دفعی را جمع‌آوری می‌کنند و آن‌ها را به روده می‌بریزند تا دفع شوند.

▪ **سامانه عصبی**: بخش مرکزی دستگاه عصبی حشرات شامل یک مغز (چند گره جوش خورده) و یک طناب عصبی شکمی است که در هر بند از بدن، یک گره دارد.

▪ **بینایی**: حشرات، جسم مركب دارند که از تعداد زیادی واحد بینایی تشکیل شده است. این واحدها، در مجموع باعث ایجاد یک تصویر موزائیکی می‌شود.

▪ **اسکلت**: حشرات اسکلت بیرونی دارند که علاوه بر حرکت جانور، در حفاظت از آن‌ها نیز نقش دارد.

## ◀ محدوده علم زیست‌شناسی

## آموزش تصویری ویدئوی شماره ۲

## اصل مطلب



• زیست‌شناسی، تاخهای از علوم تجربی است که به بررسی علمی جانداران و فرایندهای زیستی می‌پردازد. اما این علم به اندازه‌ای توانا و گستره نیست که بتواند به همه پرسش‌های انسان پاسخ دهد و همه مشکلات زندگی ما را حل کند!

• به طور کلی علم تجربی، محدودیت‌هایی دارد و نمی‌تواند به همه پرسش‌های ما پاسخ دهد و از حل برخی مسائل بشری ناتوان است.

▪ **دانشمندان و پژوهشگران** علوم تجربی فقط در جستجوی علل‌های پدیده‌های طبیعی و قبل مشاهده‌اند.

▪ **مشاهده**، اساس علوم تجربی است: بنابراین در زیست‌شناسی، فقط ساختارها و با فرایندهایی بررسی می‌شوند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم قابل مشاهده و اندازه‌گیری هستند.



۷ مشاهده باخته، بلقت و با جانداران ریز با میکروسکوپ، مشاهده مستقیم محسوب می‌شود اما به عنوان مثال پی بردن به ساختار مولکول‌ها از طریق تصویربرداری با کمک اشعه ایکس، مشاهده غیرمستقیم محسوب می‌شود.

۸ امروزه بسیاری از بیماری‌ها مانند بیماری قند (دیابت) و لغزش فشارخون که حدود صد سال پیش به مرگ منجر می‌شدند، مهار شده‌اند و به علت روش‌های درمانی جدید، دیگر مرگ آور نیستند.

**دقت کنید:** نمی‌توان گفت تیر مایعی خوتصره است؛ چون خوتصره بودن تیر قبل مشاهده با اندازه‌گیری نیست.

۹ زیست‌شناسان و پژوهشگران سایر علوم تجربی، نمی‌توانند درباره زشتی و زیبایی، خوبی و بدی، ارزش‌های هنری و ادبی نظر بدهند.

۱۰ زیست‌شناسان علاوه بر تلاش برای پی بردن به رازهای آفرینش، سعی می‌کنند باقتهای خود را در بعده زندگی انسان به کار بزنند.

۱۱ نمونه‌هایی از پرسش‌هایی که زیست‌شناسان تلاش می‌کنند پاسخ‌های آن‌ها را بیانند تا علاوه بر پی بردن به رازهای آفرینش، به حل مسائل و مشکلات زندگی انسان امروزی نیز کمک کنند:

۱ چگونه می‌توان گیاهانی پرورش داد که در مدتی کوتاه‌تر، مواد غذایی بیشتری تولید کنند؟

۲ چرا باید تنوع زیستی حفظ شود؟ چرا باید حیات وحش حفظ شود؟

۳ چرا بعضی از باخته‌های بدن انسان سرطانی می‌شوند؟ چگونه می‌توان باخته‌های سرطانی را در مراحل لوله سرطانی تبدیل، شناسایی و تبلود کرد؟

۴ چگونه می‌توان سوختهای زیستی مانند الکل را جانشین سوختهای فسیلی، مانند مواد نفتی کرد؟

۵ چگونه می‌توان از بیماری‌های ارثی، پیشگیری و یا آن‌ها را درمان کرد؟

## ﴿ زیست‌شناسی توین ﴾

### آموزش تصویری ویدئوی شماره ۳

### اصل مطلب



امروزه زیست‌شناسی ویژگی‌هایی دارد آن را به رشته‌ای مترقی، توانا، پویا و امیدبخش تبدیل کرده است:

۱ **کل‌نگری:** پیکر هر جاندار از اجزای بسیاری تشکیل شده است. هر یک از این اجزاء، بخشی از یک سامانه بزرگ را تشکیل می‌دهد که در نمای کلی برای ما معنی پیدا می‌کند. بنابراین جانداران را نوعی سامانه می‌دانند که اجزای آن با هم ارتباط دارند؛ به همین علت، ویژگی‌های سامانه را نمی‌توان فقط از طریق مطالعه اجزای سازنده آن توضیح داد و ارتباط بین اجزا نیز مانند خود اجزا در تشکیل جاندار، مؤثر و کل سامانه، چیزی بیشتر از مجموع اجزای آن است.

۲ **نگرش بیش‌رشته‌ای:** زیست‌شناسان امروزی برای تناخت هر چه بیشتر سامانه‌های زنده، از اطلاعات رشته‌های دیگر نیز کمک می‌گیرند؛ مثلاً برای بررسی ژن‌های جانداران، علاوه بر اطلاعات زیست‌شناسی، از قانون و مفاهیم مهندسی، علوم رایانه، آمار و بسیاری رشته‌های دیگر هم استفاده می‌کنند.

۳ **فناوری‌های توین:** این فناوری‌ها نقش مهمی در پیشرفت علم زیست‌شناسی داشته و دارند. نمونه‌هایی از این فناوری‌ها عبارت‌اند از:  
 الف) فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی: امروزه بیشتر از هر زمان دیگری به جمع‌آوری، بایگانی و تحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش‌های زیست‌شناسی نیاز داریم؛ دستاوردها و تحولات بیست ساله اخیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در پیشرفت زیست‌شناسی، تأثیر بسیاری داشته است. این فناوری‌ها امکان انجام محاسبات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم کرده‌اند.

ب) مهندسی ژنتیک: مدت‌هایی که زیست‌شناسان می‌توانند ژن‌های یک جاندار را به بدن جانداران دیگر وارد کنند به گونه‌ای که ژن‌های منتقل شده بتوانند اثرهای خود را ظاهر کنند. این روش که باعث انتقال صفت با صفاتی از یک جاندار به جانداران دیگر می‌شود، مهندسی ژنتیک نام دارد.  
 ۴ **اخلاق زیستی:** پیشرفت‌های سریع علم زیست‌شناسی، به ویژه در مهندسی ژنتیک، زمینه سوءاستفاده‌هایی را در جامعه فراهم کرده است. محرومانه بودن اطلاعات ژنی و نیز اطلاعات پژوهشی افراد و حقوق جانوران از موضوع‌های اخلاق زیستی هستند.

### ﴿ گل‌نگری ﴾

۱۲ هر یک از اجزای پیکر هر جاندار، بخشی از یک سامانه بزرگ است و این اجزا با هم ارتباط دارند و برهم‌کنش این اجزا باعث می‌شود تا در هر سطح جدید از حیات، ویژگی‌های جدیدی ظاهر شوند.

۱۳ ارتباط بین اجزاء مانند خود اجزاء در تشکیل جاندار مؤثر است: بنابراین کل سامانه، چیزی بیشتر از اجتماع اجزای آن است. هر سامانه از اجزایی تشکیل شده است که هر کدام به تنها یک خواص ویژه خود را دارد، اما وقتی کنار هم قرار می‌گیرند، ارتباط بین آن‌ها ایجاد می‌شود و «کل» به وجود می‌آید. کل، ویژگی‌هایی دارد که در هیچ یک از اجزاء به تنها یک دیده نمی‌شود.

### ﴿ نگرش بین‌رشته‌ای ﴾

۱۴ زیست‌شناسان امروزی برای تناخت بیشتر سامانه‌های زنده، از اطلاعات رشته‌های دیگر کمک می‌گیرند. مثلاً برای بررسی ژن‌های جانداران، علاوه بر اطلاعات زیست‌شناسی، از قانون و مفاهیم مهندسی، علوم رایانه، آمار و بسیاری رشته‌های دیگر هم استفاده می‌کنند.

۹. کدام گزینه درباره محدوده فعالیت‌های دانشمندان و پژوهشگران علم زیست‌شناسی صحیح است؟

- (۱) فقط فرایندهای مربوط به بدن موجودات زنده و علتهای آن‌ها را بررسی می‌کنند.
- (۲) بدون اظهار نظر درباره رشتی، زیبایی، خوبی و بدی، درباره لرزش‌های هنری و ادبی نظر می‌دهند.
- (۳) راهکارهای علمی لازم برای جلوگیری از نابودی بوم‌سازگان‌های آسیبدیده و احیای آن‌ها را ارائه می‌کنند.
- (۴) برای بررسی فرایندهایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم قابل مشاهده با اندازه‌گیری نیستند، از اطلاعات رشته‌های دیگر کمک می‌گیرند.

۱۰. کدام گزینه، برای تکمیل جمله زیر مناسب نیست؟

- |   |  |
|---|--|
| ۱) تلاضعهای زیست‌شناسان برای یو بردن به چگونگی        | ۲) تبدیل سوختهای فسیلی به سوختهای زیستی مانند الکل |
| ۳) شناسایی باخته‌های سرطانی در مراحل اولیه سرطانی شدن |  |

### زیست‌شناسی نوین

۱۱. با توجه به این که کل سامانه، چیزی بیشتر از مجموع اجزای آن است، می‌توان گفت که

- (۱) ارتباط بین اجزا نیز مانند خود اجزا در تشکیل جاندار مؤثر است.
- (۲) علاوه بر اجزای درونی، اجزای بیرونی سامانه نیز در عملکرد آن مؤثرند.

۱۲. چند مورد از موارد زیر، از موضوعات مرتبط با اخلاق زیستی به شمار می‌روند؟

- |  |   |
|--|---|
| الف) محرومانه بودن اطلاعات زن درمانی افراد     | ب) ایجاد تغییرات ژنتیک در گیاهان و جانوران        |
| ج) تولید عوامل بیماری‌زا مقاوم به داروهای رایج | د) بررسی ژنی جانوران و بایگانی اطلاعات حاصل از آن |

۴ ۳ ۲ ۱

۱۳. چند مورد، جمله زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

«در زیست‌شناسی، با استفاده از

- الف) نگرش بین‌رشته‌ای، برای بررسی ژن‌های انسان از علوم و فنون مهندسی استفاده شده است.
- ب) فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، برای ساخته هر چه بیشتر سامانه‌های زنده استفاده می‌شود.
- ج) مهندسی ژنتیک، ژن‌های یک گونه از جانداران را فقط به بدن جاندارانی از گونه دیگر وارد می‌کنند.
- د) کل نگری، علاوه بر اطلاعات زیست‌شناسی، از اطلاعات بسیاری از رشته‌های دیگر نیز استفاده می‌شود.

۴ ۳ ۲ ۱

۱۴. کدام گزینه، جمله زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«سامانه زیستی، که کل ویژگی‌های آن

- (۱) می‌تواند یک جاندار باشد - ارتباط بین اجزا را نیز شامل می‌شود.
- (۲) قطعاً یک جاندار است - در نمایی کلی برای ما معنی پیدا می‌کند.
- (۳) می‌تواند یک جاندار باشد - از طریق مطالعه اجزای آن به دست می‌آید.
- (۴) می‌تواند یک جاندار است - بیشتر از مجموع ویژگی‌های اجزای آن است.

۱۵. کدام گزینه در ارتباط با شکل مقابل نادرست است؟



۱) تولید آن بدون استفاده از نگرش بین‌رشته‌ای زیست‌شناسان صورت گرفته است.

۲) از فناوری مربوط به تولید این وسیله، برای بررسی ژن‌های جانداران مختلف استفاده می‌شود.

۳) از این فناوری می‌توان برای جمع‌آوری و بایگانی اطلاعات حاصل از پژوهش‌های زیست‌شناسی استفاده کرد.

۴) مربوط به نوعی فناوری است که تحولات بیست ساله اخیر آن در پیشرفت زیست‌شناسی تأثیر زیادی داشته است.

۱۶. کدام گزینه در ارتباط با دانشمندان و پژوهشگران علم زیست‌شناسی درست است؟

- (۱) توانسته‌اند بیماری افزایش فشار خون را با استفاده از مهندسی ژنتیک مهار کنند.
- (۲) به تازگی توانسته‌اند ژن‌های یک جاندار را به بدن جانداری از گونه دیگر وارد کنند.
- (۳) می‌توانند به بهبود و افزایش تولید سوختهای زیستی از دانه‌های روغنی کمک کنند.
- (۴) بیشتر در جستجوی علتهای پدیده‌های طبیعی و قبل مشاهده و اندازه‌گیری هستند.

۱۷. چند مورد از عبارت‌های زیر نادرست است؟

الف) زیست‌شناسان برای ساخته بیشتر سامانه‌های زنده، از اطلاعات رشته‌های دیگر کمک می‌گیرند.

ب) تولید عوامل بیماری‌زا که نسبت به داروهای موجود مقاوم‌اند، حاصل نگرش بین‌رشته‌ای است.

ج) پیشرفت‌های سریع علم زیست‌شناسی، زمینه محرومانه ماندن اطلاعات ژنی افراد را فراهم کرده است.

د) تولید فرولدهای غذایی با عوایق زیانبار برای افراد، نمونه‌ای از تولید سلاح‌های زیستی محسوب می‌شود.

۴ ۳ ۲ ۱

۱۲۰. در غشای باخته‌های زنده بدن انسان، هر مولکول

- ۱) فسفردار، توسط پوششی دولایه از جنس غشا احاطه شده است.
- ۲) لیپیدی، از گلیسرول، فسفات و اسیدهای چرب تشکیل شده است.
- ۳) دارای عامل اسیدی، در تماس مستقیم با مولکول‌های لیپید قرار دارد.
- ۴) زیستی منشعب در تعاض مستقیم با ماده زمینه سیتوپلاسم قرار دارد.

۱۲۱. مولکول‌های اصلی تشکیل‌دهنده غشای باخته‌ای **لیپیدهایی** که

- ۱) همانند - در بافت چربی ذخیره می‌شوند، در ساختار خود گلیسرول و دو اسید چرب دارند.
- ۲) برخلاف - در ساخت لنواعی از هورمون‌ها شرکت می‌کنند، به ترتیب گلیسریدها نباشت دارند.
- ۳) برخلاف - دو برابر کربوهیدرات‌ها انرژی تولید می‌کنند، در شبکه آندوپلاسمی تولید می‌شوند.
- ۴) همانند - در ذخیره انرژی نقش مهمی دارند، از سه عنصر کربن، هیدروژن و اکسیژن ساخته شده‌اند.

۱۲۲. کدام گزینه در ارتباط با باخته‌های جانوری درست است؟

- ۱) شبکه آندوپلاسمی سازنده لیپیدها، در اتصال مستقیم با پوشش هسته قرار دارد.
- ۲) هر ریزکیسه موجود در سیتوپلاسم، در اثر فعالیت دستگاه گلزی ایجاد شده است.
- ۳) هر رنان، درون ماده زمینه سیتوپلاسم یا چسبیده به شبکه آندوپلاسمی قرار دارد.
- ۴) همه کیسه‌های سازنده دستگاه گلزی می‌توانند ریزکیسه‌هایی را از خود خارج کنند.

۱۲۳. کدام گزینه در ارتباط با اندامک‌های باخته جانوری نادرست است؟

- ۱) وسیع ترین اندامک باخته، در ساختن پروتئین‌ها و لیپیدها نقش دارد.
- ۲) فضای درونی شبکه آندوپلاسمی زبر با منافذ پوشش هسته در ارتباط است.
- ۳) شبکه آندوپلاسمی می‌تواند در مجاورت اندامک‌های مختلفی قرار داشته باشد.
- ۴) هر ریزکیسه‌ای که در جایه‌جایی مواد نقش دارد، از دستگاه گلزی جدا شده است.

۱۲۴. کدام گزینه، جمله زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

اهمه باخته‌های زنده و هستهدار بدن انسان.

- ۱) حلوی شبکه‌ای از کیسه‌ها هستند که در سراسر سیتوپلاسم گسترش بافته‌اند.
- ۲) اطلاعات لازم برای تعیین صفات را در بیش از یک ساختار خود جای داده‌اند.
- ۳) پروتئین‌های مورد نیاز خود را درون سیتوپلاسم و با مصرف انرژی زیستی می‌سازند.
- ۴) توسط ساختاری احاطه شده‌اند که بینتر مولکول‌های سازنده آن، سه بخش طویل دارند.

## ● ورود مواد به باخته و خروج از آن

۱۲۵. کدام گزینه، درباره انتشار ساده مواد از غشای باخته‌های انسان نادرست است؟

- ۱) فرایندی است که انجام آن به شکل ویژه‌ای از انرژی وابسته است.
- ۲) به یکسان شدن غلظت ماده انتقالی در دو سوی غشا منجر می‌شود
- ۳) سرعت انجام آن تحت تأثیر میزان اتحلال مواد در لیپید قرار می‌گیرد.
- ۴) کانال‌های پروتوبنی، مولکول‌های را در جهت شبی غلظت عبور می‌دهند.

۱۲۶. کدام گزینه در ارتباط با روش عبور اکسیژن از غشای باخته عصبی نادرست است؟

- ۱) باخته برای انجام آن هیچ نوع انرژی مصرف نمی‌کند
- ۲) جریان مولکول‌ها از جای پر غلظت به جای کم غلظت است.
- ۳) منجر به کاهش تفاوت غلظت اکسیژن در دو سوی غشا می‌شود
- ۴) فقط با استفاده از انرژی جنبشی از طریق کانال‌های غتسایی انجام می‌شود.

۱۲۷. کدام گزینه درست است؟

- ۱) پروتئین‌های غتسایی نمی‌توانند خروج مولکول‌های کربن‌دی‌اکسید از باخته را تسهیل کنند
- ۲) افزایش غلظت هر ماده انتقالی در یک سمت غشا، منجر به افزایش سرعت انتشار آن می‌شود
- ۳) انواعی از پروتئین‌های غتسایی، انرژی لازم برای انتشار تسهیل شده را فراهم می‌کنند
- ۴) ورود بون‌های پتانسیم به نورون‌ها، توسط کانال‌های پروتوبنی تسهیل می‌شود

۱۲۸. چند مورد، جمله زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

در فرایند...، همواره انتقال مولکول‌ها... صورت می‌گیرد.

- الف) اسوز - بدون دخالت پروتئین‌های غشایی
- ب) انتقال فعال - با مصرف انرژی ATP
- د) انتقال فعال - برخلاف جهت شبی غلظت
- ج) اسوز - در جهت شبی غلظت

## پاسخ‌های تشریحی

**گزینه ۲۱:** زیستشناسان به دنبال یافتن راههایی برای پیشگیری با درمان بیماری‌های ارتباطی انسان هستند. **گزینه ۲۲:** شناسایی یاخته‌های سرطانی در مراحل اولیه سرطانی شدن، می‌تواند به حل مسائل و متكلات انسان کمک کند.

### ۱. گزینه ۱

طبق متن کتاب درسی، دانشمندان علوم تجربی فقط در جستجوی علتهای پدیده‌های طبیعی و قبل متأهده‌اند؛ چون متأهده، اساس علوم تجربی است.

**نقد کتاب درسی:** در صفحه ۲ کتاب درسی می‌خوانیم: «دانشمندان و پژوهشگران علوم تجربی، فقط در جستجوی علتهای پدیده‌های طبیعی و قبل متأهده‌اند، می‌توان این طور برداشت کرد که زیستشناسان فقط به دنبال کشف علت انجام پدیده‌ها هستند در حالی که در این علم، موارد دیگری مثل ساختارهای بدن جانداران، نوع روابط بین جانداران و - نیز بررسی می‌شوند».

**بررسی سایر گزینه‌ها گزینه‌های ۲۱ و ۲۲:** پدیده‌هایی که در زیستشناسی بررسی می‌شوند، باید به طور مستقیم یا غیرمستقیم قبل متأهده و اندازه‌گیری باشند، اما اساس علوم تجربی، متأهده است (نه آزمایش با اندازه‌گیری!).

**گزینه ۲۳:** در زیستشناسی، علاوه بر ساختارها و فرایندها، موارد دیگری مثل علتهای انجام فرایندها و پدیده‌های نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند.

### ۲. گزینه ۲

همه جانداران در محیطی پیچیده زندگی می‌کنند که شامل عوامل زنده و غیرزنده است؛ بنابراین زیستشناسان هنگام بررسی یک موجود زنده، عوامل غیرزنده محیط آن را نیز مورد توجه قرار می‌دهند. **بررسی سایر گزینه‌ها گزینه ۲۴:** در زیستشناسی، پدیده‌هایی بررسی می‌شوند که به طور مستقیم با غیرمستقیم قبل متأهده یا اندازه‌گیری هستند. **گزینه ۲۵:** در زیستشناسی، علاوه بر موجودات زنده، فرایندهای زیستی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند.

**گزینه ۲۶:** هدف نهایی زیستشناسان، بی‌بردن به رازهای آفرینش و حل مسائل و متكلات زندگی انسان امروزی است.

### ۳. گزینه ۳

**بررسی تک تک موارد الف (درست):** پژوهشگران علم زیستشناسی تلاش می‌کنند تا با روش‌های علمی، به رازهای آفرینش بی‌برند.

**ب (نادرست):** زیستشناسان می‌توانند به بهبود و لغزابش تولید سوخت‌های زیستی کمک کنند که از منبع پایدار ارزی محسوب می‌شوند.

**ج (نادرست):** زیستشناسی، یکی از شاخمهای علوم تجربی محسوب می‌شود؛ بنابراین همه پدیده‌های قبل متأهده و اندازه‌گیری به این علم مربوط نمی‌شوند.

**د (نادرست):** معماًی چگونگی جهت‌بلی پژوهه‌های مونارک قبل از حل شده است؛ پس امروزه دانشمندان به دنبال حل آن نیستند!

### ۴. گزینه ۴

ساختار بدن جانداران و فرایندهای زیستی در علم زیستشناسی بررسی می‌شود که شاخه‌ای از علوم تجربی است. خوشمزه بودن شیر قبل بررسی در زیستشناسی نیست؛ بنابراین دانشمندان و پژوهشگران این علم به دنبال یافتن راهی برای

پرسنیت به این سؤال نیستند. **بررسی سایر گزینه‌ها گزینه ۲۷:** یکی از پرسنیت‌هایی که دانشمندان و پژوهشگران زیستشناسی به دنبال یافتن پاسخی برای

آن هستند، این است که چگونه می‌توان از بروز بیماری‌های ارتباطی پیشگیری کرد

**۱. گزینه ۱:** جمعیت پژوهه‌های مونارک، هر سال هزاران کیلومتر را مکریک تا جنوب کانادا و بالعکس می‌پیماید. به عبارت دیگر، مهاجرت این پژوهه‌ها شامل دو مسیر رفت و برگشتی است. **بررسی سایر گزینه‌ها گزینه ۲۸:** اطلاعات و دستورالعمل‌های لازم برای اعمالی از قبیل پرواز، در مولکول‌های دنا قرار دارند و هر جانور، دنای خود را از والدین دریافت کرده است. **گزینه ۲۹:** مسیر مهاجرت به کمک یاخته‌های عصبی تشخیص داده می‌شود. این یاخته‌ها، زوائد رشتہ‌مانندی به نام داریته و آسه دارند. **گزینه ۳۰:** انواع مختلفی از یاخته‌های عصبی در سر پروانه مونارک وجود دارند که برخی از آن‌ها در تشخیص جایگاه خورشید در آسمان نقش دارند.

**۲. گزینه ۲:** **(۲۹)** ممکن نیست این سؤال برای شما پیش بیاید که بر اساس اطلاعات کتاب درسی، یک دانش‌آموز از کجا باید بداند که یاخته‌های عصبی مربوط به تشخیص جایگاه خورشید در آسمان، در سر پروانه مونارک قرار دارند؟ **تشخیص جایگاه خورشید با استفاده از گیرندهای موجود در چشم جانور انجام می‌شود و واضح است که چشم‌های جانور در ناحیه سر قرار دارند.**

**۳. گزینه ۱:** پروانه مونارک، نوعی حشره است؛ بنابراین سلمانه تنفسی نایدیسی دارد نایدیس‌ها لولمهای منشعب و مرتبط به هم هستند که از طریق منافذی به خارج راه دارند. **بررسی سایر گزینه‌ها گزینه ۲۱:** پروانه مونارک با تشخیص جایگاه خورشید در آسمان، به سوی مقصد مهاجرت خود پرواز می‌کند (نه به سوی خورشید). **گزینه ۲۲:** مهاجرت، رفتاری غریزی است و یافتن مسیر مهاجرت با استفاده از اطلاعات و راتنی انجام می‌شود.

**۴. گزینه ۲:** **نکته:** هر جاندار، مواد و راتنی را از والد با والدین خود دریافت کرده است. بنابراین مهاجرت همتاند سایر رفتارهای غریزی، با استفاده از اطلاعات و راتنی انجام می‌شود که جانور از والدین خود دریافت کرده است.

**۵. گزینه ۳:** یاخته‌های عصبی انواع مختلفی دارند و فقط بعضی از آن‌ها پایم انقباض را به ماهیجه‌ها منتقل می‌کنند.

**۶. گزینه ۲:** در زیستشناسی، فقط ساختارها با فرایندهایی بررسی می‌شوند که به طور مستقیم با غیرمستقیم قبل متأهده و اندازه‌گیری‌اند. **بررسی سایر گزینه‌ها گزینه ۱۱:** در زیستشناسی، علت پدیده‌هایی قابل متأهده بررسی می‌شوند، اما نمی‌توان گفت « فقط علت این پدیده‌ها بررسی می‌شوند! چون به عنوان مثال ساختارهای جانداران نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند. **گزینه ۲۲:** به طور کلی علوم تجربی محدودیت‌هایی دارند و نمی‌توانند به همه پرستن‌های انسان پاسخ دهند. **گزینه ۲۳:** کلاً پژوهشگران علوم تجربی نمی‌توانند درباره زشتی و زیبایی، خوبی و بدی، ارزش‌های هنری و ادبی نظر بدهند.

**۷. گزینه ۳:** یکی از مواردی که به حل مسائل و متكلات انسان امروزی کمک می‌کند، حفظ تنوع زیستی (نه افزایش آن!) و حفظ حیات وحش است. **بررسی سایر گزینه‌ها گزینه ۱۰:** الکل، نوعی سوخت زیستی است و جایگزینی آن با سوخت‌های فضلی می‌تواند به حل مسائل و متكلات انسان امروزی کمک کند.

## ۱۴. (گزینه)

سامانه زیستی می‌تواند یک جاندار و با بخشی از آن باشد. مثلاً یک باخته از بدن انسان را نیز می‌توان یک سامانه در نظر گرفت! ویژگی‌های سامانه، مجموع ویژگی‌های اجزای آن و همچنین ارتباط بین آن‌ها را شامل می‌شود به عبارت دیگر، کل ویژگی‌های سامانه، فقط از طریق مطالعه اجزای آن به دست نمی‌آید.

## ۱۵. (گزینه)

شكل سؤال، یک حافظه ۲ ترلباینی امروزی (هارد اکسترنال) را نشان می‌دهد. از این فناوری می‌توان برای ذخیره و انتقال اطلاعات استفاده کرد.

**دقت کنید:** فناوری مربوط به تولید این وسیله، مربوط به علوم رایانه است و نمی‌توان از آن برای بررسی تن‌های جانداران استفاده کرد!

**بررسی سایر گزینه‌ها** **گزینه ۱:** تولید وسایل مربوط رایانه ارتباطی حاصل نگرش بین رشته‌ای علوم رایانه و علوم دیگر فنی و مهندسی است و ارتباطی با زیست‌شناسی ندارد. **گزینه ۲:** از حلقه‌های رایانه‌ای می‌توان برای جمع‌آوری و بایگانی اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات حاصل از پژوهش‌های زیست‌شناسی استفاده کرد. **گزینه ۳:** دستوردها و تحولات بیست ساله اخیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر بسیاری زیادی در پیشرفت زیست‌شناسی داشته است.

## ۱۶. (گزینه)

برای تولید سوختهای زیستی می‌توان از دلنهای روغنی استفاده کرد و زیست‌شناسان می‌توانند به بهبود و افزایش تولید سوختهای زیستی کمک کنند.

**بررسی سایر گزینه‌ها** **گزینه ۱:** دانشمندان توانسته‌اند بیماری افزایش فشار خون را با روش‌های درمانی و داروهای جدید مهار کنند (نه مهندسی زیستیک). **گزینه ۲:** مدت‌هاست که زیست‌شناسان می‌توانند تن‌های یک جاندار را به بدن جانداری از گونه دیگر منتقل کنند. **گزینه ۳:** زیست‌شناسان فقط در جستجوی علت‌های پدیده‌های طبیعی و قبل متاهدمند.

## ۱۷. (گزینه)

**بررسی تک تک موارد** **الف (درست):** زیست‌شناسان امروزی برای شناخت هر چه بیتر سلامت‌های زندگانی علاوه بر اطلاعات زیست‌شناسی، از اطلاعات رشته‌های دیگر نیز کمک می‌گیرند **ب (درست):** تولید سلاح‌های زیستی (مثل عوامل بیماری‌زای مقاوم نسبت به داروهای جدید)، حاصل نگرش بین رشته‌ای است. **ج (نادرست):** پیشرفت‌های سریع علم زیست‌شناسی، به ویژه در زمینه مهندسی زیستیک، سبب نگرانی در مورد محرومانه ماندن اطلاعات زنی افراد شده است (نه محرومانه ماندن این اطلاعات!). **د (نادرست):** یکی از انواع سلاح‌های زیستی، فراورده‌های غذایی با عوایق زبانبار برای افراد است.

## ۱۸. (گزینه)

کل نگری، نگرش بین رشته‌ای، فناوری‌های نوین و اخلاق زیستی از ویژگی‌هایی هستند که زیست‌شناسی را به رشته‌ی منطقی تولید می‌نماید. پویا و لمبده‌ختن تبدیل کرده‌اند **بررسی تک تک موارد** **الف:** وضع قوانین جهانی برای جلوگیری از سوءاستفاده از پیشرفت‌های سریع علم زیست‌شناسی، مربوط به اخلاق زیستی است. **ب:** در کل نگری، ارتباط بین اجزا همانند خود اجزا در تشکیل جاندار مؤثر و کل سلامه‌های چیزی بیتر از مجموع اجزای آن است. **ج:** فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، جزء فناوری‌های نوین محسوب می‌شوند که از آن‌ها برای جمع‌آوری، بایگانی و تحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش‌ها استفاده می‌شود (نه شناخت بیتر سلامت‌های زندگانی!). **د (نادرست):** در مهندسی زیستیک، می‌توان تن‌های یک فرد را به افراد هم‌گونه یا افرادی از گونه دیگر وارد کرد. مثلاً در زن‌درمانی، زن سالم را از یک انسان استخراج و به انسان بیمار منتقل می‌کنند. **ه (نادرست):** کل نگری، ارتباطی با رشته‌های دیگر ندارد و در آن، علاوه بر ویژگی‌های اجزای علوم و مفاهیم مهندسی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

**گزینه‌های ۲ و ۴:** برای پرسش‌هایی از قبیل چگونه می‌توان الكل را جایگزین سوختهای فسیلی کرد و یا این که در مدت کوتاه‌تر، مواد غذایی بیشتری تولید کرد، جزو مواردی هستند که دانشمندان و پژوهشگران علم زیست‌شناسی به دنبال بافنون پاسخی برای آن‌ها هستند.

**دقت کنید:** به طور کلی ساختار بدن جانداران و فرایندهای زیستی در شاخه‌ای از علوم تجربی به نام علم زیست‌شناسی بررسی می‌شوند (نه شاخه‌ای از زیست‌شناسی!).

## ۱. (گزینه)

دانشمندان و پژوهشگران علم زیست‌شناسی می‌توانند با بررسی بوم‌سلزگان‌های آسیب‌دیده‌ها راهکارهای علمی برای احیای آن‌ها را تهیه کنند. **بررسی سایر گزینه‌ها** **گزینه ۱:** علاوه بر فرایندهای زیستی و علت‌های آن‌ها موارد دیگری نیز در زیست‌شناسی بررسی می‌شوند (مثل ساختار بین جانداران). **گزینه ۲:** دانشمندان و پژوهشگران علم زیست‌شناسی نمی‌توانند در برداشتهای هنری و لایه نظر بدeneند **گزینه ۳:** فرایندهایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم قابل متابه‌دهی با تنفسه گیری نبیستند در زیست‌شناسی مورد بررسی قرار نمی‌گیرند.

## ۲. (گزینه)

سوختهای زیستی از جانداران امروزی به وجود می‌آیند (نه از سوختهای فضیلی). سایر موارد از تلاش‌های زیست‌شناسان برای حل مسائل و مشکلات زندگی انسان امروزی محسوب می‌شوند.

## ۱۱. (گزینه)

براساس دیدگاه کل نگری، ارتباط بین اجزا همانند خود اجزا در تشکیل جاندار مؤثر است. **بررسی سایر گزینه‌ها** **گزینه ۱:** تعامل بین اجزای یک سامانه، باعث ایجاد یک سامانه بزرگ‌تر نمی‌شود، بلکه می‌تواند سطح بالاتری از سلامان یابد را ایجاد کند. **گزینه ۲:** گرچه عوامل بیرونی می‌توانند بر سامانه اثر بگذارند، اما این عوامل جزء سامانه نیستند. **گزینه ۳:** برای توضیح ویژگی‌های هر سامانه، علاوه بر مطالعه اجزای آن، ارتباط بین آن‌ها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند.

## ۱۲. (گزینه)


**بررسی تک تک موارد** **الف (درست):** مجرمانه بودن اطلاعات تن‌درمانی افراد، جزء اخلاق زیستی محسوب می‌شود **ب (درست):** در ایجاد تغییرات زنیکی در گیاهان و جانوران از طریق مهندسی زنیک، اخلاق زیستی در نظر گرفته می‌شود به عبارت دیگر محققان هنگام ایجاد تغییرات زنیکی در جانداران، تأثیر این تغییرات بر انسان و محیط زیست را در نظر می‌گیرند. **ج (درست):** عوامل بیماری‌زای مقول در برای داروهای رایج، نوعی سلاح زیستی محسوب می‌شوند و تولید آن‌ها با اخلاق زیستی مغایرت دارد. بنابراین از موضوعات مرتبط با اخلاق زیستی به شمار می‌دود. **د (نادرست):** بررسی تن‌های یک جاندار و بایگانی اطلاعات حلصل از آن، ارتباطی با اخلاق زیستی ندارد.

## ۱۳. (گزینه)

**بررسی تک تک موارد** **الف (درست):** زیست‌شناسی با نگرش بین رشته‌ای، از علوم دیگر نیز استفاده می‌شود به عنوان مثال برای بررسی تن‌های جانداران، علاوه بر علوم زیست‌شناسی، از علوم و فنون مهندسی نیز استفاده می‌شود. **ب (نادرست):** از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی برای جمع‌آوری، بایگانی و تحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش‌ها استفاده می‌شود (نه شناخت بیتر سلامت‌های زندگانی!). **ج (نادرست):** در مهندسی زنیک، می‌توان تن‌های یک فرد را به افراد هم‌گونه یا افرادی از گونه دیگر وارد کرد. مثلاً در زن‌درمانی، زن سالم را از یک انسان استخراج و به انسان بیمار منتقل می‌کنند. **ه (نادرست):** کل نگری، ارتباطی با رشته‌های دیگر ندارد و در آن، علاوه بر ویژگی‌های اجزای علوم و مفاهیم مهندسی نیز مورد استفاده قرار می‌شود.



برای مشاهده  
ویدیوهای آموزشی  
رمزینه مقابله را  
اسکن کنیدا



## گوارش و جذب مواد

اولین کسی که توانست درون معده انسان زنده را مشاهده کند (William Beaumont) جراح ارتش آمریکا بود دکتر بیومونت یک جوان تیر خورده را از مرگ نجات داد و تامد ها از او مراقبت می کرد. با این که فرد جوان زنده ماند، اما در دیواره بدن و معده او سوراخی باقی مانده بود. اصلًا بیومونت به این دلیل مراقبت از جوان را ادامه می داد که از آن سوراخ، درون معده اش را ببیند و به کاوش علمی پردازیدا بعد از مدتی، دکتر بیومونت با بررسی ترشحات معده این جوان، کشف کرد که شیره معده حاوی کلریدریک اسید است و این اسید، کارکرد گوارشی و ضد میکروبی دارد.

در سال ۱۸۹۸ میلادی، پژشک آلمانی به نام ادولت کازمانوئل وسیله‌ای را به منظور مشاهده درون معده یک فرد زنده طراحی کرد. آندوسکوپ ساخته شده توسط کازمانوئل برخلاف انواع امروزی، انعطاف‌پذیر نبود؛ به همین دلیل، نمی‌شد آن را درون مری و معده بیمار فرستاد! تا این که سروکله شعبده بازی پیداشد که در نمایش هایش، شمشیر قورت می داد! این فرد توانست ابزار ساخته شده توسط کازمانوئل به طول ۴۷ سانتی متر را ببلعد. در نمونه های امروزی آندوسکوپ، لوله انعطاف پذیر وجود دارد که با استفاده از آن می توان بدون وارد کردن آسیب، بخش های مختلفی از بدن (مانند معده) را بررسی کرد.

۶۶ مری، لوله‌ای است که در پشت نای قرار دارد. این لوله از زیر حلق شروع می‌شود و تا معده امتداد دارد.

۶۷ مراحل بلع:

**۱ مرحله ارادی:** نوسط ماهیچه زبان (اسکلتی) انجام می‌شود و غذا را به عقب دهان و سپس حلق می‌راند.

**۲ مرحله غیرارادی:** از طریق انقباض غیرارادی دیواره ماهیچه‌ای حلق و در ادامه، انقباض غیرارادی دیواره مری انجام می‌شود.

۶۸ ماهیچه زبان، دیواره حلق و ابتدای مری از نوع اسکلتی است: بنابراین انقباض آنها توسط اعصاب پیکری کنترل می‌شود، اما ماهیچه موجود در دیواره بخش‌های پایینی مری از نوع صاف است و انقباض آن تحت کنترل اعصاب خودمنختار قرار دارد.

۶۹ **تکیب:** انقلاب بلع توسط مرکزی در مغز به نام بصل النخاع تنظیم می‌شود.

۷۰ هنگام بلع، زبان کوچک بالا می‌رود و راه بینی را می‌بندد. راه نای نیز با پایین رفتن اپی‌گلوت بسته می‌شود.

۷۱ حنجره در بخش ابتدایی نای قرار دارد و در پوتی به نام برجاگنای دارد

۷۲ **وینه:** دیواره حلق ماهیچه‌ای اما دیواره حنجره از حنس غضروف (نوعی بافت پیوندی) است.

۷۳ **تکیب:** هنگام بلع و عبور غذا از حلق، مرکز بلع که در بصل النخاع قرار دارد، قدرت مرکز تنفس را که در نزدیکی آن قرار دارد، مهار می‌کند. در نتیجه، نای بسته و تنفس برای مدت کوتاهی متوقف می‌شود.

۷۴ **وینه:** فقط در بخشی از قرایند بلع، تنفس قطع می‌شود: دقیقت کنید که بلع از دهان تا معده ادامه دارد و فقط هنگام عبور غذا از حلق، تنفس قطع می‌شود.

۷۵ **تکیب:** هنگام عطسه، راه بینی با پایین آمدن زبان کوچک و راه نای با بالا رفتن اپی‌گلوت باز می‌شود تا هوا با فشار از بینی خارج شود.

۷۶ انقباض ماهیچه‌ای دیواره حلق و حرکت کرمی آن، غذا را به مری می‌فرستد. غذا در طول مری با حرکات کرمی به پیش می‌رود.

۷۷ حرکات کرمی در ابتدای مری، توسط ماهیچه مخطط و در ادامه آن توسط ماهیچه صاف انجام می‌شود و با شدن بنداره انتهای مری، غذا وارد معده می‌شود.

## « گوارش در معده

### امروز تصویری ویدئوی شماره ۲۱

### اصل مطلب



- معده، بخش کیسه‌ای شکل لوله گوارش است. دیواره معده چین خورده‌هایی دارد که با پرسدن معده باز می‌شوند تا غذای بلعیده شده در آن انبار شود.
- گوارش در معده در اثر شیره معده و حرکات آن انجام می‌شود. در پایان گوارش در معده، مخلوط حاصل از گوارش که کیموس نام دارد باز شدن بنداره پیلور وارد دوازده (ابتدا روذه باریک) می‌شود.
- یاخته‌های پوتشی مخاط معده در بافت پیوندی زیرین فرورفتاند و حفره‌های معده را به وجود می‌آورند. مجرای غده‌های معده به این حفره‌ها راه دارند.
- یاخته‌های پوتشی سطحی مخاط معده و برخی از یاخته‌های غده‌های آن، ماده مخاطی فراوان ترشح می‌کنند که به شکل لایه ژله‌ای چسبناک، مخاط معده را می‌پوشاند.
- یاخته‌های پوتشی سطحی، بیکربنات ( $\text{HCO}_3^-$ ) نیز ترشح می‌کنند که لایه ژله‌ای حفاظتی را قلیایی می‌کند و به این ترتیب سد حفاظتی محکمی در مقابل اسید و آنزیم به وجود می‌آید.
- یاخته‌های اصلی غده‌ها، آنزیم‌های معده را ترشح می‌کنند. یاخته‌های کناری غده‌های معده نیز ترشح کلریدریک اسید و عامل داخلی معده (فاکتور داخلی معده) را برعهده دارند.

۷۸ لوله گوارش دارای یک بخش کیسه‌ای شکل به نام معده است، اما دستگاه گوارش دو بخش کیسه‌ای شکل دارد: **۱** معده **۲** کیسه صفراء

**۱ دقت کنید:** در دستگاه، دفع ادرار نیز کیسه‌ای ماهیچه‌ای به نام مثانه وجود دارد.

۷۹ دیواره معده دارای چین خورده‌هایی است که با پرسدن معده باز می‌شوند، بنابراین میزان چین خورده‌های دیواره معده با حجم غذای درون آن رابطه عکس دارد.



۸۰ دیواره معده سه لایه ماهیچه دارد که از خارج به داخل عبارت‌اند از: **۱** ماهیچه طولی

**۲** ماهیچه حلقی **۳** ماهیچه مورب

**۴ دقت کنید:** در لایه ماهیچه‌ای دیواره معده، ماهیچه مورب داخلی‌ترین ماهیچه است.

۸۱ پپسین خود با اثر بر پپسینوزن، تولید پپسین را بیشتر می‌کند. آنزیم پپسین، پروتئین‌ها را به مولکول‌های کوچک‌تر نجزیه می‌کند.


**۸۱** در صورت تخریب یاخته‌های کناری یا برداشته شدن معده:

۱ به دلیل ساخته نشدن کلریدریکا سید، در تبدیل پپسینوژن به پپسین اختلال ایجاد می‌شود.

۲ به دلیل ساخته نشدن عامل داخلی معده، ویتامین  $B_{12}$  جذب نمی‌شود. این ویتامین برای ساختن گویچه‌های قرمز در مغز استخوان لازم است و به دلیل فقدان آن، قرد به کم خونی خطرناکی دچار می‌شود و زندگی او به خطر می‌افتد.

**۳** دقت کنید: حفره‌های معده، جزء غده‌های معده محسوب نمی‌شوند! در واقع مجرای غده‌های معده به این حفره‌ها وارد می‌شود و ترشحات غده‌های معده به این حفره‌ها میریزد.

**۴** یاخته‌های پوششی سطحی حفره‌های معده ماده مخاطی و بیکربنات ترشح می‌کنند.



**۵** **تذکر مهم:** حفره معده در لایه مخاطی قرار دارند (نه لایه زیرمخاطی!).

**۶** غده‌های معده، چندین نوع یاخته دارند:

۱ یاخته‌های اصلی: آنزیم‌های تسریه معده (پروتئازها و لیپاز) را ترشح می‌کنند. پیش‌ساز پروتئازهای معده را به طور کلی پپسینوژن می‌نامند. پپسینوژن بر اثر کلریدریکا سید به پیسین تبدیل می‌شود.

۲ یاخته‌های کناری: ترشح کلریدریکا سید و عامل داخلی معده را برعهده دارند. عامل داخلی معده، برای ورود ویتامین  $B_{12}$  به یاخته‌های روده باریک ضروری است.

۳ یاخته‌های ترشح کننده ماده مخاطی: ماده مخاطی فراوانی ترشح می‌کنند که در ابعاد لایه ژله‌ای چسبناک و محافظت از مخاط معده نقش دارد.

۴ یاخته‌های درونریز: این یاخته‌ها هورمونی به نام گلسترین ترشح می‌کنند که با اثر بر غده‌های معده، سبب افزایش ترشح اسید معده و پپسینوژن می‌شود. ۵ یاخته‌های ترشح کننده ماده مخاطی در مقایسه با یاخته‌های کناری، به حفرات معده نزدیک‌ترند. به عبارت دیگر یاخته‌های ترشح کننده ماده مخاطی نسبت به یاخته‌های کناری، سطحی‌ترند.

۶ آنزیم‌های تسریه معده تابل چند نوع پروتئاز و یک نوع لیپاز است. پروتئازهای معده به صورت غیرفعال ترشح می‌شوند، اما لیپاز هنگام ترشح فعال است.

۷ تسریه معده، قادر آنزیم‌های مؤثر بر کربوهیدراتها و نوکلئیک‌اسیدهای است.

**۸** قعال شدن پپسینوژن از دو طریق صورت می‌گیرد: ۱ برخورد با کلریدریکا سید ۲ برخورد با پیسین

**۹** **ویژه** اسید معده (کلریدریکا سید) علاوه بر قعال کردن پپسینوژن، نقش دفاعی نیز دارد و میکروب‌های موجود در غذا را نابود می‌کند.

۱۰ لایه ژله‌ای چسبناکی که مخاط معده را می‌پوشاند، تابل ماده مخاطی نولیدنده توسط دو گروه از یاخته‌های معده است: ۱ یاخته‌های پوششی سطحی ۲ برخی از یاخته‌های غده‌های معده (یاخته‌های ترشح کننده ماده مخاطی)

۱۱ یاخته‌های غدد معده برخلاف یاخته‌های پوششی سطحی معده، بیکربنات ترشح نمی‌کنند.

۱۲ در غده‌های معده، یاخته‌های اصلی در مقایسه با یاخته‌های کناری و ترشح کننده ماده مخاطی، در بخش‌های عمیقی قرار گرفته‌اند.

۱۳ بعضی از ترشحات معده، وارد تسریه معده نمی‌شوند اما گاسترین یکی از ترشحات معده است، اما همانند سایر هورمون‌ها وارد خون می‌شود.

۱۴ یاخته‌های درونریز معده که ترشح گاسترین را برعهده دارند، جزء دستگاه درونریز هم محسوب می‌شوند!

**زوم:** یکی از مواد ترشحی غده‌های معده، کلریدریکا سید است. یاخته‌های کناری برای تولید این اسید، یون هیدروژن را از خون می‌گیرند. بنابراین در خون سیاهرگ معده، غلظت یون هیدروژن کمتر از خون سرخ‌گ معده است.

۱۵ بزرگ‌ترین یاخته‌های غده‌های معده، یاخته‌های کناری هستند و برخلاف سایر یاخته‌ها، شکل استوانه‌ای ندارند.

۱۶ غشای یاخته‌های کناری غدد معده دارای چین‌خوردگی‌های عمیقی است که به سمت مجرای این غده‌هاست.

۱۷ حفره‌های معده توسط بافت پوششی استوانه‌ای یک‌لایه‌ای پوشیده شده‌اند.

۱۸ غده‌های معده در لایه مخاطی آن قرار دارند. یاخته‌های احاطه کننده غده‌های معده، از نوع پیوندی هستند که جزء لایه مخاطی است!

۱۹ حفرات معده، در اثر قرورفتن یاخته‌های پوششی مخاط معده در بافت پیوندی زیرین ایجاد می‌شوند و لایه زیرمخاطی ندارند.

۲۰ ترشحات یاخته‌های بروونریز غده‌های معده از طریق مجرای معده به سطح داخلی معده می‌رسند.

۱۰. شکل مقابل، یکی از بندارهای لوله گوارش انسان را نشان می‌دهد. کدام گزینه، فقط در مورد یکی از اندازهای موجود در دو سمعت این بنداره صحیح است؟



- ۱) نوعی گلبکوبروتین ترشح می‌کند که توانایی جذب مقداری زیادی از آب را دارد
- ۲) ماهیچه‌های طولی و حلقوی آن می‌توانند تحت تأثیر شبکه عصبی منقبض شوند
- ۳) غتای پایه آن در اتصال با یاخته‌های سنگفرشی و بافت پیوندی سنت قرار دارد.
- ۴) نوعی پروتئین ترشح می‌کند که توانایی کاهش انرژی فعال‌سازی واکنش را دارد

۱۱. با توجه به ساختار لوله گوارش انسان، بافت در هر چهار لایه سازنده آن مشاهده می‌شود.

- ۱) عصبی، برخلاف - ماهیچه‌ای
- ۲) پیوندی متراکم، همانند - پوششی
- ۳) ماهیچه‌ای، برخلاف - پیوندی سنت داشته باشد.

۱۲. به طور طبیعی، اندامی که با لوله گوارش انسان در ارتباط است، نعمت تواند

- ۱) در تولید و ترشح هورمون و آنزیم غیرفعال نقش
- ۳) با تولید و ترشح موادی، در از بین بردن باکتری‌ها نقش

۱۳. کدام درباره دستگاه گوارش انسان سالم و بالغ درست است؟

- ۱) محل اتصال مجاری لوزالمعده به دوازدهه، در پشت کولون لقی قرار دارد
- ۲) بخت کوچکی از معده همراه با بخت عمده مری بالاتر از دیلفراگم قرار دارد
- ۳) آپاندیس، زائدی متصل به روده بزرگ است و در قسمت میانی حفره شکم قرار دارد.
- ۴) بخت‌های بالایی معده و کبد برخلاف بخت‌های پایینی آن‌ها در یک راستا قرار دارند

۱۴. چند مورد، جمله زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

- در لوله گوارش انسان، هر بندارهای که در تنظیم عبور مواد نقش دارد،
- الف) به دنبال رسیدن محتويات لوله گوارش به آن باز می‌شود.
  - ب) از ماهیچه‌های حلقوی با یاخته‌های دوکی شکل تشکیل شده است.
  - ج) عملکرد آن بدون دخالت مراکز نظارت بر فعالیت‌های بدن تنظیم می‌شود.
  - د) توسط لایه‌ای از لوله گوارش ایجاد می‌شود که تعاس مستقیمی با مخاط ندارد.

۴۴

۳۳

۲۲

۱۱



۱۵. با توجه به شکل مقابل، کدام گزینه درباره بخشی که با علامت سوال مشخص شده، درست است؟

- ۱) علاوه بر رگ‌های خونی، دارای شبکه‌هایی از یاخته‌های عصبی است
- ۲) در آن بافتی یافت می‌شود که دارای ماده زمینه‌ای شفاف و چسبنده است
- ۳) ساختار آن از جنس بافت پیوندی است که معده و روده را به هم متصل می‌کند
- ۴) لایه بیرونی لوله گوارش در تمام طول آن، بختی از این ساختار محسوب می‌شود

۱۶. در شکل مقابل، ساختاری که با علامت سوال مشخص شده، بختی از اندامی است که

- ۱) میزان حفاظت آن در برابر اسید، کمتر از دوازدهه است
- ۲) بر اثر انبار کردن غذا، چین خوردگی‌های آن از بین می‌روند
- ۳) با افزودن شیره گوارشی به غذا، آن را به کیموس تبدیل می‌کند
- ۴) ماهیچه‌های بخت ابتداًی آن توسط اعصاب خودمتختار منقبض می‌شوند

## 📍 حرکات لوله گوارش

۱۷. چند مورد، در ارتباط با حرکات کرمی لوله گوارش انسان نادرست است؟

- شروع آن‌ها با تحریک شبکه یاخته‌های عصبی لوله گوارش آغاز می‌شود
- از دهان آغاز و به صورت یک حلقة انقباضی به سوی مخرج حرکت می‌کند
- فقط هنگام برخورد با یک بنداره، می‌توانند نقش مخلوط کنندگی ایفا کنند
- فقط بر اثر انقباض یاخته‌های ماهیچه‌ای تک هسته‌ای دوکی شکل ایجاد می‌شوند

۴۴

۳۳

۲۲

۱۱

۱۸. به طور معمول در انسان، حرکات قطعه قطعه کننده حرکات کرمی

- ۱) معده - برخلاف - بخت‌هایی از آن را بصورت یک درمیان منقبض می‌کنند
- ۲) روده - همانند - تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمتختار قرار می‌گیرند
- ۳) مری - برخلاف - غذا را با شیرمهای گوارشی مخلوط می‌کنند

(ترکیبیں با دوازدهم)

۱۹. کدام گزینه درباره ساختار لوله گوارشی انسان درست است؟

- ۱) زن‌های سازنده کلازن، در هر یک از یاخته‌های لایمهای لوله‌ای گوارش بیان می‌شوند.
- ۲) حرکات قطعه‌قطعه کتنده همانند حرکت کرمی، با انقباض ماهیچمهای صاف شروع می‌شوند.
- ۳) گستاد شدن لوله گوارشی انسان در پی انقباض ماهیچمهای با یاخته‌های چندهسته‌ای رخ می‌دهد.
- ۴) حرکاتی که با کمک یاخته‌های ماهیچهای تکه‌سته‌ای انجام می‌شوند، همواره غذا را با شیره گوارشی مخلوط می‌کنند.

۲۰. چند مورد، در ارتباط با حرکات لوله گوارشی انسان درست است؟

- الف) گاهی ممکن است حرکات کرمی، فقط نقش مخلوط کنندگی داشته باشند.
- ب) در بخش‌هایی از لوله گوارش، فقط حرکات کرمی نقش مخلوط کنندگی دارند.
- ج) حرکت کرمی برخلاف قطعه‌قطعه کتنده، همواره در جهت حرکت توده غذا انجام می‌شود.
- د) در ایجاد حرکات کرمی، می‌تواند علاوه بر لایمهای طولی و حلقوی، لایه دیگری نیز مؤثر باشد.

۴ (۴)

۲ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۲۱. چند مورد، جمله زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

ادر دستگاه گوارش انسان، حرکات کرمی ...

- الف) به صورت یک حلقه انقباضی، مواد غذایی را در طول لوله به حرکت درمی‌آورد.
- ب) در هر بخشی از لوله گوارش به کمک شبکه‌های یاخته‌های عصبی انجام می‌شوند.
- ج) فقط در نتیجه انقباض ماهیچمهایی انجام می‌شوند که یاخته‌های دوکی شکل دارند.
- د) همانند حرکات قطعه‌قطعه کتنده، در مخلوط شدن مواد غذایی با شیره‌های گوارشی مؤثرند.

۴ (۴)

۲ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

۲۲. کدام یک از گزینه‌های زیر به درستی بیان شده است؟

- ۱) در بدن انسان، حرکات کرمی همواره در جلو راندن مواد غذایی نقش دارند.
- ۲) در نتیجه حرکات کرمی مری، ابتدا آن گستاد و یک حلقه انقباضی ظاهر می‌شود.
- ۳) در لایه ماهیچمهایی همانند لایه زیرمخاط معده، شبکه‌ای از یاخته‌های عصبی وجود دارد.
- ۴) بعضی از غدهای لوله گوارش انسان، آنزیمی ترشح می‌کنند که تجزیه نشانه را آغاز می‌کند.

در لوله گوارش انسان سالم و بالغ، حرکات کرمی ... حرکات قطعه‌قطعه کتنده

۱) همانند - در مری، باعث حرکت توده غذا به سوی معده می‌شوند.

۲) برخلاف - ممکن است بدون دخالت ماهیچمهای صاف انجام شوند.

۳) برخلاف - باعث مخلوط شدن مواد غذایی با شیره‌های گوارشی نمی‌شوند.

۴) همانند - از حلق آغاز می‌شوند و تا انتهای لوله گوارش لادمه پیدا می‌کنند.

۲۴. با توجه به شکل مقابل که بخشی از لوله گوارش انسان را نشان می‌دهد، کدام گزینه درست است؟



۱) حرکات کرمی و قطعه‌قطعه کتنده باعث حرکت (الف) می‌شوند.

۲) ماهیچمهای طولی و حلقوی محل (ب) هر دو در حال استراحت‌اند.

۳) در این زمان، وضعیت یاخته‌های ماهیچمهای در (ب) و (ج) متابه است.

۴) آزاد شدن ناقل عصبی از انتهای عصب خودمحختار موجب باز شدن (ج) می‌شود.

۲۵. کدام گزینه در ارتباط با حرکات لوله گوارش انسان درست است؟


۱) حرکات کرمی در مری، بدون دخالت شبکه‌های عصبی لوله گوارش انجام می‌شوند.

۲) حرکات قطعه‌قطعه کتنده در طول لوله به پیش می‌روند و محتويات آن را مخلوط می‌کنند.

۳) هر بخشی از لوله گوارش که دارای حرکات کرمی است، قادر یاخته‌های ماهیچمهای چندهسته‌ای است.

۴) در حرکات کرمی، گستاد شدن لوله گوارش، حرکتی برای یاخته‌های عصبی دبواره آن محسوب می‌شود.

۲۶. شکل مقابل، یکی از حرکات لوله گوارش انسان را نشان می‌دهد کدام گزینه درباره این حرکت نادرست است؟



۱) در هیچ یک از اندام‌های گوارشی خارج از حفره شکمی انجام نمی‌شود.

۲) یاخته‌های پوششی محل انجام آن، می‌توانند مواد غذایی را جذب کنند.

۳) در روده، علاوه بر کمک به گوارش مکانیکی، نقش مخلوط کنندگی دارد.

۴) رسیدن آن به بنداره انتهای مری، باعث ورود توده‌های غذا به معده می‌شود.

(خارج از کشور ۹۹)

**۲۲۱** گدام عبارت، در ارتباط با کعبود ترشح کلریدریک اسید بدن انسان، صحیح است؟

- ۱) می‌تواند میزان خون بهر (هماتوکربت) فرد تغییر بابد.  
 ۲) نمی‌تواند هضم پروتئین‌های غذایی فرد دستخوش اختلال شود.  
 ۳) می‌تواند منجر به کاهش همه ترشحات برون‌دیز لوله گوارش فرد شود.  
 ۴) نمی‌تواند ناشی از اختلال در عملکرد شبکه‌های باخته‌های عصبی باشد.

(خارج از کشور ۹۹ - با تغییر)

ادر بخشی از لوله گوارش می‌شود، مواد غذایی تحت تأثیر آنزیم یا آنزیمه‌های جانور قرار می‌گیرند.

- ۱) گوسفت که سلولز به طور عمده آب کافت - سلولاز  
 ۲) ملح که غذا به کمک دندانه‌های دیواره آن خرد - گوارشی  
 ۳) گاو که فرایند آبگیری تا حدود زیادی انجام - معده واقعی  
 ۴) پرنده که فرایند آسیاب کردن غذا تسهیل - مترشحه از کبد

(خارج از کشور ۹۹)

**۲۲۲** گدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

- ا قبل از ورود کیموس به بخشی از لوله گوارش انسان که مراحل یابانی گوارش مواد غذایی در آن آغاز می‌شود.  
 ۱) گوارش پروتئین‌ها آغاز شده و تا مرحله تولید کوچک‌ترین واحدهای سازنده آن‌ها پیش رفته است.  
 ۲) باخته‌های پوشتی سطحی، با فرورفتن در بافت زیرین خود، حفره‌هایی را به وجود آورده‌اند.  
 ۳) مولکول‌های دی و پلی‌ساکاریدی، با تبدیل به مولکول‌های مونوساکاریدی جذب گردیده‌اند.  
 ۴) با حضور ترکیبی فلقد آنزیم چربی‌ها گوارش یافته و به محیط داخلی وارد شده‌اند.

(خارج از کشور ۹۹)

**۲۲۴** گدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کند؟

- ابه طور معمول در انسان، ماهیجه‌های حلقوی که بخش‌های مختلف لوله گوارش را از هم جدا می‌کنند، فقط  
 ۱) همه - هنگام عبور مواد از انقباض خارج می‌شوند.  
 ۲) همه - تحت تأثیر بخش خودمختار دستگاه عصبی قرار دارند.  
 ۳) بعضی از - تارهای عضلانی تکه‌سته‌ای و چندسته‌ای دارند.

### آزمون (از تست‌های کانون فرهنگی آموزش)

**۲۲۵** در هر لایه‌ای از لوله گوارش که شبکه‌ای از باخته‌های عصبی وجود دارد،

- ۱) ماهیچه‌ها در خرد و نرم کردن غذا دخالت دارند.  
 ۲) ترکیبی گلیکوپروتئین با جذب آب، در لفزنده کردن توده غذایی مؤثر است.  
 ۳) نوعی بافت پیوندی که به طور معمول بافت پوشتی را پستیبلی می‌کند، حضور دارد.  
 ۴) ترشحات باخته‌های آن در گوارش شیمیابی غذاها و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش نقش دارند.

**۲۲۶** چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می‌کند؟

- ابخش کیسه‌ای نشکل لوله گوارش انسان،  
 الف) همانند قسمتی که بلا فاصله بعد از آن قرار دارد، چین خورده‌گی‌هایی دارد.  
 ب) برخلاف قسمتی که بلا فاصله قبل از آن قرار دارد، محل ذخیره موقتی غذا است.  
 ج) نسبت به قسمتی که بلا فاصله قبل از آن قرار دارد، دارای یک لایه ماهیجه‌ای اضافه‌تر است.  
 د) برخلاف قسمت قبل و همانند قسمت بعد از خود، با تولید آنزیمه‌های گوارشی در گوارش شیعیابی غذا نقش دارد.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

**۲۲۷** گدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

ابه طور معمول، در محل در لوله گوارش انسان،

- ۱) پایان گوارش چربی‌ها - آب و بیکربنات به درون لوله گوارش ترشح می‌شوند.  
 ۲) اصلی جذب مواد غذایی - گوارش پروتئین‌ها تنها تحت تأثیر پروتئازهای لوزالمعده پایان می‌یابد.  
 ۳) آغاز گوارش کربوهيدرات‌ها - بعضی از آنزیمه‌های ترشح شده، فعالیت گوارشی ندارند.  
 ۴) آغاز گوارش پروتئین‌ها - حرکات کرمی، گوارش مکانیکی غذا را تسهیل می‌کنند.

**۲۲۸** در بخشی از لوله گوارش انسان که بروتئازهای فعال، فعالیت دارند، لزوماً

- ۱) وجود صفراء به تأثیر بهتر برخی از آنزیمه‌های گوارشی بر مواد غذایی مؤثر است.  
 ۲) چین خورده‌گی‌های لوله گوارش سطح بیتلزی برای جذب مونومرهای مواد غذایی ایجاد می‌کنند.  
 ۳) حرکت لوله گوارش، علاوه بر گوارش مکانیکی، سبب تعاس بیتلزی برخی مواد غذایی و شبره گوارشی می‌شود.  
 ۴) با ترشح برخی مواد از باخته‌های کناری، جذب و بتامین B<sub>۱۲</sub> در روده باریک ممکن می‌شود.

## ۳۱. گزینه

هنگام بلع، با پایین رفتن برچاکنای (ابی گلوت) و نزدیک شدن آن به حنجره، راه نای بسته می‌شود. **بررسی سایر گزینه‌ها گزینه ۱:** غذا با کمک زبان وارد حلق می‌شود و حرکات کرمی، پس از ورود غذا به حلق آغاز می‌شوند. **گزینه ۲:** هنگام بلع لازم است راه بینی بسته شود؛ برای بسته شدن راه بینی، زبان کوچک به بالا می‌رود. **گزینه ۳:** بلع شامل دو مرحله است: مرحله اول بلع به صورت ارادی است و توسط زبان انجام می‌شود که نتیجه آن ورود غذا به حلق است. مرحله دوم بلع غیرارادی است که پس از ورود غذا به حلق و انقباض ماهیچه‌های دیواره آن آغاز می‌شود.

## ۳۲. گزینه

بارسیدن غذا به حلق، لازم است راه بینی و نای بسته و غذا وارد مری شود البته در این هنگام، حرکت زبان به بالا و عقب نیز راه دهان را می‌بندد و از بازگشت غذا به آن جلوگیری می‌کند پایین رفتن برچاکنای راه نای را می‌بندد و بالا رفتن زبان کوچک نیز موجب بسته شدن راه بینی می‌شود.

نحوه بسته شدن مسیرهای منتهی به حلق

| عامل بسته                  | وضعیت به هنگام |      |      |         |      |      |
|----------------------------|----------------|------|------|---------|------|------|
|                            | نام            | موقع | بلع  | استفراغ | عطسه | سرفه |
| مسیر شدن                   | حادی           | باز  | بسته | باز     | باز  | باز  |
| حرکت زبان<br>به بالا و عقب | راه<br>دهان    | باز  | بسته | باز     | باز  | باز  |
| انقباض بنداره<br>ابتدايی   | راه<br>مری     | باز  | بسته | باز     | بسته | بسته |
| حرکت زبان<br>کوچک به بالا  | راه<br>بینی    | باز  | بسته | باز     | بسته | بسته |
| حرکت<br>ابی گلوت           |                |      |      |         |      |      |
| راه نای<br>به پایین        |                |      |      |         |      |      |
| و حرکت<br>حنجره به بالا    |                |      |      |         |      |      |

## ۳۳. گزینه

هنگام عطسه زبان کوچک به پایین کشیده می‌شود تا بختی از هوا از راه بینی خارج شود؛ در حالی که هنگام بلع باید زبان کوچک به بالا برود و راه بینی را بستد. **بررسی سایر گزینه‌ها گزینه ۱:** هنگام عطسه، ابی گلوت به بالا می‌رود تا هوا از نای خارج شود؛ اما در فرایند بلع، ابی گلوت به پایین می‌رود. **گزینه ۲:** هنگام سرفه هوا از راه دهان خارج می‌شود؛ پس باید زبان کوچک به بالا برود و راه بینی را بینند از طرفی، هنگام بلع نیز زبان کوچک به بالا می‌رود و راه بینی را می‌بندد. **گزینه ۳:** هنگام سرفه هوا از نای و سپس از طریق دهان خارج می‌شود برای خروج هوا از نای، ابی گلوت باید به بالا برود در حالی که هنگام بلع، به پایین حرکت می‌کند.

## ۳۴. گزینه

**بررسی تک تک موارد الف:** تازمانی که غذا در دهان قرار دارد زبان کوچک منعایل به پایین است؛ هنگامی که زبان به بالا و عقب برموی گردد و غذا را به سوی حلق می‌فرستد، زبان کوچک بالا می‌رود. **ب:** تازمانی که غذا درون حلق قرار دارد، زبان کوچک به سمت بالا منعایل است؛ پس از آن که انقباض دیواره آغاز شوند راه بینی می‌شود

**بررسی سایر گزینه‌ها گزینه ۱:** حرکات قطعه قطعه کننده فقط در روده انجام می‌شوند و روده در حفره شکمی قرار دارد. **گزینه ۲:** باختمهای پوششی روده باریک مولد مختلفی را جذب می‌کنند. باختمهای پوششی روده بزرگ نیز می‌توانند آب و بون‌ها را جذب کنند. **گزینه ۳:** حرکات کرمی علاوه بر این که در گوارش مکانیکی غذانهای دارند آن را به شبههای گوارشی مخلوط می‌کنند.

## ۳۵. گزینه

یکی از آنزیم‌های بzac، آمیلاز است که نتاینه را به دی‌ساکلرید مالتوز و مولکولهای درشتتر تبدیل می‌کند بنابراین محصولات این آنزیم مولکولهای متنوعی هستند.

**بررسی سایر گزینه‌ها گزینه ۱:** آنزیم‌های بzac عبارتند از آمیلاز و لبزوزیم آمیلاز گوارش شیمیایی نتاینه را آغاز می‌کند اما لبزوزیم در گوارش غذا نقشی ندارد. **گزینه ۲:** قبل اگفتیم که بzac، علاوه بر ورود غذا به دهان، بر اثر عوامل دیگری مانند دین غذانیز ترشح می‌شود. **گزینه ۳:** بzac توسط سه جفت غده بزرگ و تعدادی غده کوچک ترشح می‌شود که همگی برون‌ریز هستند.

## ۳۶. گزینه

**بررسی تک تک موارد (الف):** آنزیم آمیلاز در گوارش شیمیایی نتاینه و آنزیم لبزوزیم در تخریب باکتری‌های درون دهان نقش دارد. **(ب)** ماده مخاطی از دیواره لوله گوارش در بربر آسبهای شیمیایی و خرائیدگی محافظت می‌کند. **(ج)** لبزوزیم و آمیلاز هر دو آنزیم هستند و همه آنزیم‌ها بختی به نام جایگله فعل دارند که پیش‌ماده در آن قرار می‌گیرد. **امالبزوزیم** نقشی در گوارش مولد غذایی ندارد. **۱۵** موسین نوعی گلکوپروتئین است؛ یعنی از اتصال کربوهیدرات به پروتئین ایجاد می‌شود. این ماده می‌تواند آب زیادی جذب کند و به ماده مخاطی تبدیل شود.

## ۳۷. گزینه

لبزوزیم نوعی آنزیم پروتئینی است و همانند سایر پروتئین‌های از تجزیه آن آمیتوسید حاصل می‌شود همه آمینواسیدها در ساختار خود گروه کربوکسیل دارند. **بررسی سایر گزینه‌ها گزینه ۱:** آنزیم‌ها، کاتالبیورهای زیستی هستند و می‌دانند که لبزوزیم و آمیلاز دو نوع آنزیم هستند. **گزینه ۲:** ترکیب دفاعی موجود در بzac، آنزیم لبزوزیم است که در دفاع غیراختصاصی نقش دارد. **گزینه ۳:** ماهیچه‌هایی که مسئول حرکات آرواره‌ها و جویدن هستند، از ماهیچه‌های اسکلتی‌اند و از باختمهای دراز و بدون انتساب تشکیل شده‌اند.

## ۳۸. گزینه

**بررسی تک تک موارد (الف (غلط)):** گوارش شیمیایی بعضی کربوهیدراتها (نه همه آنها) توسط آنزیم آمیلاز بzac آغاز می‌شود.

**دقت کنید:** گوارش شیمیایی هیچ‌بک از پروتئین‌ها در دهان آغاز نمی‌شود! **ب (غلط):** گوارش مکانیکی نمی‌تواند مواد غذایی را به مولکولهای قبل جذب تبدیل کند، بلکه باعث تسهیل گوارش شیمیایی می‌شود و در نهایت گوارش شیمیایی مولد غذایی را به مولکولهای قبل جذب تبدیل می‌کند. **ج (اصحیح):** ترشحات بخت ابتدايی لوله گوارش شامل ماده مخاطی است که هیچ نقشی در گوارش مولد غذایی ندارد.

**نکته:** در ابتدايی لوله گوارش (دهان) گوارش شیمیایی کربوهیدراتها توسط بzac آغاز می‌شود و بzac شامل ترشحات غدهای بzacی است که از اندام‌های مرتبط با لوله گوارشی هستند و جزء لوله محسوب نمی‌شوند.

**د (اصحیح):** آمیلاز موجود در بzac، پیوند بین بعضی از واحدهای ساختاری نتاینه را شکسته و آن را به مولکولهای کوچک‌تری (مثل دی‌ساکلرید) تبدیل می‌کند.

**بررسی سایر گزینه‌ها گزینه ۱:** شبکه‌های باخته‌های عصبی در دهان وجود ندارند؛ بنابراین فعالیت غدهای برازی بدون دخالت شبکه‌های عصبی لوله گوارش انجام می‌شود. **گزینه ۲:** آنزیم لیزوزیم موجود در برازی، در اینمی‌بدن تقتی درد. **گزینه ۳:** آسیاب شدن غذا به ذرهای بسیار کوچک، برای فعالیت بهتر آنزیم‌های گوارشی و اتر برازی بر آن لازم است.

### ۳۶. گزینه ۳

برازی، تقریباً به طور دائمی ترشح می‌شود. متلاه‌نگلملع، برازی در حال ترشح است.

**نکته:** هنگام بلع، برای مدت کوتاهی تنفس قطع می‌شود و برای این کار، فعالیت دیافراگم و ماهیچه‌های بین‌بندمای متوقف می‌شود.


**بررسی سایر گزینه‌ها گزینه ۱:** در برازی، نوعی از یون‌ها وجود دارد (نه یک نوع یون). **گزینه ۲:** در موقعی متل حوردن غذا، دیدن غذا یا حنی فکر کردن به آن میزان برازی بیشتر می‌شود به عبارت دیگر، افزایش ترشح برازی می‌تواند بدون ورود غذا به لوله گوارش باشد. **گزینه ۴:** فقط یکی از آنزیم‌های موجود در برازی (آمیلاز) بر نشاسته مؤثر است اما آن را به واحدهای ساختاری (گلوكز) تبدیل نمی‌کند.

### ۳۷. گزینه ۴


**بررسی تک تک موارد** **الف (نادرست):** مرحله غیرارادی بلع با رسیدن غذا به حلق آغاز می‌شود (نه با عبور از حلق!). **ب (نادرست):** بالا رفتن زبان کوچک مانع از ورود توده غذا به بینی می‌شود و تأثیری در هدایت آن به سمت حلق ندارد. در واقع فشار زبان به سمت عقب دهان باعث هدایت غذا به حلق می‌شود. **ج (درست):** هنگام بلع و عبور غذا از حلق، مرکز بلع در بصل النخاع، فعالیت مرکز تنفس را که در نزدیک آن قرار دارد، مهار می‌کند و در نتیجه، نای بسته و تنفس برای مدت زمان کوتاهی متوقف می‌شود.

**رووم:** بصل النخاع مراکز تنظیمی مختلفی دارد: از جمله مراکز بلع و تنفس که در نزدیکی هم قرار دارند. بنابراین توقف تنفس هنگام بلع، نتیجه تأثیر یکی از مراکز موجود در بصل النخاع بر روی یکی دیگر از مراکز موجود در آن است. در صفحه ۴۴ کتاب درسی مرکز تنفسی دیگری معرفی می‌شود که در توقف دم نقش دارد. این مرکز در پل مغزی قرار دارد و هبچ ارتباطی به هنگام بلع ندارد. در واقع پل مغزی مدت دم را تعیین می‌کند و پس از مدتی باعث توقف آن می‌شود. مواطن باید این دو را با هم اشتباه نگیریدا

**د (نادرست):** هنگام بلع، توده غذا ابتدا به زبان کوچک و پس از آن به برجاگنای میدند: بنابراین بالا رفتن زبان کوچک زودتر از پایین رفتن برجاگنای رخ می‌دهد.



(ج) موقعی که غذا درون دهان است، تغییری در وضعیت حلق ایجاد نمی‌شود. البته ماهیچه‌های دیواره حلق در حالت عادی در وضعیت استراحت قرار دارند: پس می‌توانیم بگوییم که در این حالت ماهیچه‌های دیواره حلق شل هستند (نه این که شل می‌شوند)! (د) ماهیچه‌های مری نیز در حالت عادی در وضعیت استراحت قرار دارند (معنی شل هستند) و وجود غذا در حلق نیز تأثیری بر آن‌ها ندارد. وقتی ماهیچه‌های دیواره حلق منقبض می‌شوند و غذا را به سوی مری می‌فرستند، حرکات کرمی آغاز می‌شوند که ماهیچه‌ها را بطور منظم منقبض و شل می‌کند.



(۳۸. گزینه ۴) زمانی که غذا از مجاورت اپی‌گلوت عبور می‌کند، قطعاً ماهیچه دیواره حلق در حلال انتباخت است و غذا را به سوی مری می‌راند. **بررسی سایر گزینه‌ها** **گزینه ۱:** وقتی غذا از دهان به سوی حلق می‌رود، زبان کوچک به سمت بالا حرکت می‌کند. **گزینه ۲:** انتباخت ماهیچه دیواره حلق که غذا را به سوی مری می‌راند به صورت غیرارادی است. **گزینه ۳:** شروع حرکات کرمی با رسیدن غذا به حلق است و پس از آن غذا وارد مری می‌شود.

هنگام بلع، با فشار زبان، توده غذا به عقب دهان و درون حلق رانده می‌شود و فشار زبان ناشی از انتباخت ماهیچه اسکلتی آن است. باخته‌های ماهیچه‌ای اسکلتی، استوانه‌ای شکل هستند. **بررسی سایر گزینه‌ها گزینه ۱:** در پوش موجود در حنجره، برجاگنای (ابی گلوت) نام دارد و از ورود توده غذا به نای جلوگیری می‌کند. **گزینه ۲:** هنگام بلع، زبان کوچک به سمت بالا می‌رود و از ورود توده غذا به بینی جلوگیری می‌کند. **گزینه ۳:** ماهیچه دیواره حلق از نوع اسکلتی است (نه صاف).

(۳۹. گزینه ۱) ضمن انتقال توده غذا از دهان به معده، فقط بنداره انتهای مری بمحصورت غیرارادی باز می‌شود. **بررسی سایر گزینه‌ها گزینه ۲:** هنگام بلع، برجاگنای به سمت پایین و زبان کوچک به سمت بالا حرکت می‌کند. **گزینه ۳:** برای ورود غذا به معده، بنداره انتهای مری بمحصورت غیرارادی باز می‌شود.

**دقت کنید:** ابتدای معده بنداره ندارد! **گزینه ۴:** هنگام بلع، رامهای دهان، بینی و نای بسته و غذا وارد مری می‌شود.

**رووم:** در صفحه ۲۰ کتاب درسی می‌خوانیم: «حلق را به چهارراه تشییه می‌کنند». این رامها مربوط به دهان، بینی، نای و مری هستند علاوه بر این‌ها، از هر گوش، مجرایی به نام شیپور استنش به حلق راه دارد: یعنی دو شیپور استنش نیز به حلق راه دارند اما ساختاری برای بستن آنها وجود ندارد.

(۴۰. گزینه ۴) نکل سوال، غده برازی بناگوشی را نشان می‌دهد.

**دقت کنید:** فعالیت غدهای برازی توسط بخش خودمختار دستگاه عصبی محبطی تنظیم می‌شود (نه بخش پیکری!).

## ۱۹۴. گزینه

غذای کامل‌جوینده از مری وارد سیرابی می‌شود و در سیرابی، آنزیم‌های تجزیه‌کننده سلولز توسط میکروب‌ها تولید می‌شوند. **بررسی سایر گزینه‌ها**  
**گزینه (۱)**: اتفاق لایه‌لایه، هزارلا نام دارد و غذا بلافاصله پس از هزارلا وارد شبردان می‌شود، در حالی که آبگیری غذا در خود هزارلا صورت می‌گیرد  
**گزینه (۲)**: غذای نیمه‌جوینده شده آبگیری نمی‌شود. غذا پس از جویندن مجدد با عبور از سیرابی و نگاری به هزارلا می‌رسد و در آن جا تا حدودی آبگیری می‌شود. ضمناً هزارلا آنزیم گوارشی ندارد. **گزینه (۳)**: بزرگ‌ترین بخش معده، سیرابی نام دارد و غذای نیمه‌جوینده شده از آن وارد نگاری می‌شود. در انسان، معدلی برای نگاری وجود ندارد و اندامی که بخت عمده آن بالای دیافراگم قرار دارد، مری است.

## ۱۹۵. گزینه

**بررسی تک‌تک موارد (الف)**: محل آبگیری غذا، خود هزارلا است و قبل از آن آبگیری غذا انجام نمی‌شود. **(ب)**: نگاری در تعاس با غذای نیمه‌جوینده قرار می‌گیرد، اما شبردان در تمدن با غذای نیمه‌جوینده شده قرار نمی‌گیرد. **(ج)**: در نشخوارکنندگان، جذب در روده باریک انجام می‌شود و شیردان محل جذب مواد غذایی نیست. **(د)**: شیردان برخلاف سیرابی آنزیم‌های گوارشی ترشح می‌کند، اما هیچ یک از بخش‌های دستگاه گوارش نشخوارکنندگان آنزیم‌های مؤثر بر سلولز را ترشح نمی‌کند.

## ۱۹۶. گزینه

در نشخوارکنندگان، مولد غذایی بلافاصله پس از عبور از هزارلا وارد شبردان می‌شوند که آنزیم‌های گوارشی ترشح می‌کند. **بررسی سایر گزینه‌ها**  
**گزینه (۱)**: مولد غذایی ممکن است از نگاری به هزارلا بروند که محل آبگیری غذاست و یا این که وارد بخشی از سیرابی شود و به مری بازگردند. **گزینه (۲)**: مولد غذایی به دو شکل از بنداره انتهای مری عبور می‌کنند: ۱- رو به پایین: که در این صورت وارد سیرابی می‌شوند. ۲- رو به بالا که در این صورت وارد مری می‌شوند.  
**گزینه (۳)**: غذا با عبور از سیرابی ممکن است وارد نگاری با مری شود که به هر دوی آنها غذای دوباره جوینده شده وارد می‌شود.

## ۱۹۷. گزینه

مواد غذایی بلافاصله بعد از خروج از شیردان وارد روده باریک می‌شوند.

## ۱۹۸. گزینه

**دقت کنید**: بخت ابتدایی روده باریک به سمت بالا قرار گرفته است  
**بررسی سایر گزینه‌ها**  
**گزینه (۱)**: آخرین بخش معده نشخوارکنندگان، شیردان نام دارد  
**دقت کنید**: هیچ یک از بخش‌های معده نشخوارکنندگان، مواد غذایی حاصل از گوارش را جذب نمی‌کند.  
**گزینه (۲)**: معده واقعی نشخوارکنندگان، شیردان است، اما اتفاق لایه‌لایه هزارلا نام دارد. **گزینه (۳)**: بزرگ‌ترین بخش معده نشخوارکنندگان، سیرابی است که غذای نیمه‌جوینده شده و غذای کامل‌جوینده شده به آن وارد می‌شوند.

## ۱۹۹. گزینه

غدد بزاقی در جانورانی دیده می‌شوند که لوله گوارش دارند در واقع حفره عمومی در فاصله بین دیواره بدن و لوله گوارش ایجاد می‌شود. این جانوران به دلیل داشتن لوله گوارش، مواد غذایی را به صورت برون‌یاختنای گوارش می‌دهند و گوارش دو مرحله‌ای در آن‌ها دیده نمی‌شود. **بررسی سایر گزینه‌ها**

**بررسی سایر گزینه‌ها گزینه‌های (۲) و (۳)**: غذا پس از جویندن مجدد از مری وارد سیرابی و سپس نگاری می‌شود. به عبارت دیگر غذا مستقیماً از مری به نگاری و با از نگاری به مری منتقل نمی‌شود. **گزینه (۴)**: آبگیری غذا در هزارلا انجام می‌شود (نه بخت قبلی آن).

## ۲۰۰. گزینه

در نشخوارکنندگان، هنگام بلع، حرکات کرمی باعث انتقال غذا به معده (به سمت پایین) می‌شوند اما هنگامی که جلوه غذا را برای جویندن مجدد به دهان برمی‌گرداند، حرکت کرمی مری به صورت واپوته انجام می‌شوند.  
**بررسی سایر گزینه‌ها گزینه (۱)**: غذای نیمه‌جوینده و غذای کامل‌جوینده شده هر دو ولد سیرابی می‌شوند. **گزینه (۲)**: شیره معده در شیردان به غذا اضافه می‌شود و پس از آن غذا به دهان برئی گردد. **گزینه (۳)**: شیردان، معده اصلی نشخوارکنندگان است و آنزیم‌های گوارشی ترشح می‌کند.

**نکته**: به طور کلی نشخوارکنندگان و اغلب جانوران دیگر قادر به تولید سلولز (آنژیم تجزیه‌کننده سلولز) نیستند اما همین دلیل گوارش سلولز را به کمک میکروب‌ها انجام می‌دهند.

## ۲۰۱. گزینه

شکل سؤال، معده نشخوارکنندگان را نشان می‌دهد و در آن، مورد (الف) هزارلا، مورد (ب) سیرابی، مورد (ج) شیردان و مورد (د) نگاری است.


## ۲۰۲. گزینه تک‌تک موارد

**مورد اول**: سیرابی، نگاری و هزارلا آنزیم گولوشتی ترشح نمی‌کنند. **مورد دوم**: در تمام طول لوله گوارش (از جمله بخش‌های مختلف معده) نشخوارکنندگان، ماهیچه وجود دارد و باخته‌های ماهیچه‌ای قابلیت تنفس بی‌هوایی را دارند. **مورد سوم**: گوارش مبکری سلولز در سیرابی و نگاری نجات می‌شود.

**دقت کنید**: در سیرابی و نگاری، غذا تا حدی گوارش می‌یابد! بعتری گوارش سلولز در این بخش‌ها کامل نمی‌شود. به عبارت دیگر، سلولز در این بخش‌ها به گلوكز تبدیل نمی‌شود.

**مورد چهارم**: غذای نیمه‌جوینده پس از گوارش مبکری به تدریج به دهان بر می‌گردد و پس از جویندن مجدد، دوباره وارد سیرابی و سپس نگاری می‌شود، اما به طور معمول غذاهای نیمه‌جوینده و دوباره جوینده شده در سیرابی مخلوط نمی‌شوند.

**زیزوم**: اگر با دقت به شکل زیر نگاه کنید، متوجه خواهید شد که در بلع مجدد، غذا وارد بخش کوچکی از سیرابی شده و بلافاصله به نگاری می‌رود. در حالی که ممکن است حجم زیادی از سیرابی توسط غذای نیمه‌جوینده انشغال شده باشد، اما غذای دوباره جوینده شده با آنها مخلوط نمی‌شود (به مسیر فلس آبی رنگ توجه کنید).




## آموزش تصویری ۳۵ | ویدئو شماره ۳۵

## اصل مطلب



- دم فرایندی است که در نتیجه افزایش حجم قفسه سینه رخ می‌دهد.
- هنگام دم معمولی، دو عمل موجب افزایش حجم قفسه سینه می‌شود: ۱) انقباض ماهیچه میان‌بند موجب می‌شود این ماهیچه به سمت پایین رفته و سطح تود. ۲) انقباض ماهیچه‌های بین‌دندمای خارجی سبب حرکت دندنهای بسیار بالا و جلو می‌شود.
- در دم عمیق، انقباض ماهیچه‌های گردن نیز به افزایش حجم قفسه سینه کمک می‌کند. این ماهیچه‌ها در دم معمولی نقشی ندارند.
- هنگام بازدم معمولی، دو عمل موجب کاهش حجم قفسه سینه می‌شود:
  - ۱) ماهیچه میان‌بند به حالت استراحت درمی‌آید و در نتیجه به بالا می‌رود و گنبدی شکل می‌شود.
  - ۲) ماهیچه‌های بین‌دندمای خارجی به حالت استراحت درمی‌آیند و در نتیجه دندنهای بسیار بالا و داخل حرکت می‌کنند.
- در بازدم عمیق، انقباض ماهیچه‌های بین‌دندمای داخلی و ماهیچه‌های شکمی نیز به کاهش حجم قفسه سینه کمک می‌کند.



## ۱۵ هنگام دم، اعمال زیر صورت می‌گیرند:

۱) قفسه سینه و تش‌ها منقبض می‌شوند.

۲) دیافراگم منقبض می‌شود، پایین می‌رود و سطح می‌شود.

۳) با انقباض ماهیچه‌های بین‌دندمای خارجی، دندنهای بسیار بالا و خارج می‌رودند.

۴) استخوان جناغ به سمت جلو (بیرون) می‌رود.

۵) فشار مایع جنب کاهش می‌یابد.

## ۱۶ هنگام بازدم، اعمال زیر صورت می‌گیرند:

۱) قفسه سینه و تش‌ها منقبض می‌شوند.

۲) دیافراگم به حالت استراحت درمی‌آید و گنبدی شکل می‌شود.

۳) ماهیچه‌های بین‌دندمای خارجی به حالت استراحت درمی‌آیند.

۴) فشار مایع جنب افزایش می‌یابد.

## ۱۷ در تنفس آرام و طبیعی، دیافراگم نقش اصلی را بر عهده دارد.

## ۱۸ در دم عمیق، علاوه بر هوای جاری، هوای ذخیره دمی نیز وارد تش‌ها می‌شود.

۱۹ خروج هوای طی بازدم معمولی، بدون نیاز به انقباض ماهیچه‌ها و در اثر ویژگی کشناسی تش‌ها صورت می‌گیرد: بنابراین بازدم معمولی عملی غیرفعال است و دستگاه عصبی دخالتی در آن ندارد.

۲۰ هنگام بازدم، با به استراحت در آمدن ماهیچه دیافراگم و ماهیچه‌های بین‌دندمای خارجی و بر اثر ویژگی کشناسی تش‌ها، حجم قفسه سینه و در نتیجه حجم تش‌ها کاهش می‌یابد و هوای درون آن‌ها به بیرون رانده می‌شود.

۲۱ مهم‌ترین ویژگی تش‌ها که به دم کمک می‌کند، تبعیت از حرکات قفسه سینه است و مهم‌ترین ویژگی تش‌ها که به بازدم کمک می‌کند، خاصیت کشناسی تش‌هاست.

۲۲ **ترکیبی** با افزایش حجم قفسه سینه به هنگام دم، فشار هوای درون تش‌ها کمتر از فشار هوای محیط می‌شود و در نتیجه، هوای جای پر فشار (محیط) به جای کم فشار (درون تش‌ها) مکیده می‌شود.

۲۳ با افزایش حجم قفسه سینه به هنگام دم، فشار از روی سیاهرگ‌های قفسه سینه برداشته می‌شود و با ایجاد مکش در این سیاهرگ‌ها، خون از بخش‌های پایین نر به سوی قلب کشیده می‌شود.

۲۴ **دو** ماهیچه‌های تنفسی (دیافراگم، بین‌دندمای داخلی و بین‌دندمای خارجی) از نوع اسکلتی (مخاط) هستند. بنابراین باخته‌های سازنده آن‌ها استوانه‌ای، بدون انشعاب و چنددهسته‌ای هستند. این ماهیچه‌ها تحت کنترل ارادی ما قرار دارند اما می‌توانند به صورت غیررادی نیز منقبض شوند.

۲۵ بازدم معمولی برخلاف دم معمولی، قرایندی غیرفعال است و برای این کار هیچ ماهیچه‌ای منقبض نمی‌شود: در نتیجه ATP و کلسیم مصرف نمی‌کند.

۲۶ هوای تهویه شده که از دستگاه تنفس خارج می‌شود، در مقایسه با هوای نهاده شده که وارد دستگاه تنفس می‌شود، گرم‌تر است.

## جمع‌بندی نقش ماهیچه‌های دم و بازدم



| مهیجه               | دم             | بازدم   | دم عمیق        | بازدم هادی | بازدم هادی |
|---------------------|----------------|---------|----------------|------------|------------|
| میان‌بند (دیافراگم) | انقباض (منقبض) | استراحت | انقباض (منقبض) | استراحت    | استراحت    |
| بین‌دندمای خارجی    | انقباض         | استراحت | انقباض         | استراحت    | استراحت    |
| بین‌دندمای داخلی    | استراحت        | انقباض  | استراحت        | استراحت    | استراحت    |
| گردنی               | استراحت        | انقباض  | استراحت        | استراحت    | استراحت    |
| شکمی                | استراحت        | انقباض  | استراحت        | استراحت    | استراحت    |

**۵۷** برای تشخیص سمت چپ و راست قلب می‌توان از انعکس آنورت استفاده کرد. آنورت پس از خروج از قلب، به سمت چپ خم می‌شود.  
**۵۸** در بالای قلب، سرخرگ‌ها و سیاهرگ‌ها قابل مشاهده‌اند. این رگ‌ها را می‌توان با نوجه به ویژگی‌های ظاهری آن‌ها از قبیل قطر رگ، ضخامت دیواره رگ، میزان خاصیت ارجاعی و تکل مقطع بریده شده آن‌ها تشخیص داد.

**۱** **ویژگی‌های سرخرگ‌ها:** ۱- دیواره قطعه‌تر و محکم‌تری نسبت به سیاهرگ‌ها دارد. ۲- دهانه آن‌ها در محل بریده شده به شکل گرد با بیضی است.

**۲** **ویژگی‌های سیاهرگ‌ها:** ۱- دیواره نازک‌تر و نسل‌تری نسبت به سرخرگ‌ها دارد. ۲- دهانه آن‌ها در محل بریده شده روی هم افتد و حالت بسته دارد.

**۵۹** با وارد سوند یا مداد به یکی از رگ‌های متصل به قلب و قشار دادن آن به درون حفرات قلب می‌توان نام رگ را تشخیص داد. سرخرگ آنورت به بطن چپ، سرخرگ تشنی به بطن راست، بزرگ سیاهرگ‌های زبرین و زبرین به دهلیز چپ و سیاهرگ‌های تشنی به دهلیز راست راه دارد.

**۶۰** با استفاده از سوند شیاردار و برش دادن دیواره سرخرگ و دیواره قلب می‌توان بخش‌های درونی قلب، دریچه‌های بین دهلیزها و بطنها و سیاهرگ‌های متصل به دهلیزها را مشاهده کرد.

**۶۱** سوند شیاردار را از دهانه سرخرگ تشنی به بطن راست وارد کرده و سپس دیواره سرخرگ و بطن را در امتداد سوند با قیچی برش می‌دهیم. با باز کردن محل برش، می‌توان دریچه سینی آنورت را مشاهده کرد. درون بطن راست را مشاهده کرد. درون بطن راست برآمدگی‌های ماهیچه‌ای و طناب‌های ارجاعی دیده می‌شوند.


**۶۲** سوند شیاردار را از دهانه سرخرگ آنورت به بطن چپ وارد کرده و سپس دیواره سرخرگ و بطن را در امتداد سوند برش می‌دهیم. با باز کردن محل برش، می‌توان دریچه سینی آنورت را مشاهده کرد. در سطح درونی بطن چپ را مشاهده کرد. در سطح درونی بطن چپ نیز برآمدگی‌های ماهیچه‌های و طناب‌های ارجاعی را می‌توان دید. علاوه بر آن، در ابتدای سرخرگ آنورت، در بالای دریچه سینی، دو ورودی سرخرگ‌های اکلیلی قابل مشاهده‌اند.

**۶۳** با عبور دادن سوند از میان دریچمهای دولختی و سه لختی به سمت بالا و بریدن دیواره در میان سوند می‌توان دیواره داخلی دهلیزها و محل اتصال سیاهرگ‌ها به آن‌ها را مشاهده کرد. به دهلیز چپ چهار سیاهرگ تشنی و به دهلیز راست بزرگ سیاهرگ‌های زبرین و زبرین و همچنین سیاهرگ اکلیلی وارد می‌شود.

## ◀ ساختار بافتی قلب

لایه‌های قلب ویدئوی شماره ۴۵

اصل مطلب



قلب، اندامی ماهیچه‌ای است و دیواره آن سه لایه دارد:

**۱** درون‌شامه: داخلی‌ترین لایه قلب و شامل یک لایه نازک بافت پوششی است. درون‌شامه در تشکیل دریچه‌های قلب تیز شرکت می‌کند.

**۲** ماهیچه قلب: لایه میانی و ضخیم‌ترین لایه قلب است. بیشتر از باخته‌های ماهیچه‌ای قلبی تشکیل شده است. بین این باخته‌ها، بافت پیوندی متراکم نیز قرار دارد. بسیاری از باخته‌های ماهیچه‌ای قلب به رشته‌های کلازن موجود در این بافت پیوندی متصل‌اند. بافت پیوندی متراکم باعث استحکام دریچمهای قلبی می‌شود.

**۳** برونشامه: بیرونی‌ترین لایه دیواره قلب است. این لایه روی خود برمی‌گردد و پیراشامه را به وجود می‌آورد. پیراشامه و برونشامه از بافت پوششی سنگفرشی و بافت پیوندی متراکم تشکیل شده‌اند. بین برونشامه و پیراشامه قضایی وجود دارد که با مایع پر شده است. این مایع ضمن محافظت از قلب، به حرکت روان آن کمک می‌کند.

**۶۴** در زیر درون‌شامه قلب، بافت پیوندی وجود دارد که آن را به لایه ماهیچه‌ای می‌چسباند.

**۴** **دقت کنید:** پیراشامه، جزء لایه‌های سازنده دیواره قلب نیست! به عبارت دیگر دیواره قلب انسان از سه لایه درون‌شامه، ماهیچه قلب و برونشامه تشکیل شده است.

**۶۵** سطوح درونی حفرات قلب (دهلیزها و بطن‌ها) را بافت پوششی سنگفرشی می‌پوشاند.

**۶۶** **ویدئو:** برونشامه و پیراشامه از نظر ساختار بافتی یکسان هستند و بافت‌های پوششی و پیوندی تشکیل شده‌اند. با این تفاوت که:

**۱** در برونشامه، بافت پوششی در خارج و بافت پیوندی در داخل قرار دارد.

**۲** در پیراشامه، بافت پوششی در داخل و بافت پیوندی در خارج قرار دارد.

**۶۷** در لایه میانی قلب، علاوه بر باخته‌های ماهیچه‌ای و بافت پیوندی متراکم، رشته‌های عصبی و رگ‌های خونی نیز وجود دارند.

**فلاش نک:** بافت پیوندی متراکم در مقایسه با بافت پیوندی سنت:

**۱** رشته‌های کلازن بیشتر و در نتیجه مقاومت و استحکام بیشتری دارد.

**۲** تعداد باخته‌های کمتری دارد و ماده زمینه‌ای آن نیز اندک است.

**۶۸** در لایه ماهیچه‌ای قلب رگ‌های خونی وجود دارند و در ساختار رگ‌های خونی، بافت پیوندی، بافت ماهیچه‌ای و بافت پوششی وجود دارد: بنابراین در این لایه، بافت پوششی نیز یافتن می‌شود.

۶۹ **۱** انواع یاخته‌هایی که در لایه میانی قلب یافت می‌شوند:

**۱** یاخته‌های ماهیچه‌ای قلبی

**۲** یاخته‌های بافت پیوندی

**۳** یاخته‌های ماهیچه‌ای صاف (مربوط به دیواره رگ‌ها)

**۴** یاخته‌های پوششی (مربوط به دیواره رگ‌ها)

**۵** یاخته‌های عصبی که در تنظیم انقباض ماهیچه قلب نقش دارند.

**۶۰** **ترکیبی** رشته‌های عصبی موجود در ماهیچه قلب، مربوط به یاخته‌های عصبی حرکتی اعصاب خودمنتصار هستند.

**۶۱** رگ‌های خونی موجود در ماهیچه قلب، انشعابات رگ‌های اکلیلی هستند.

**۶۲** در همه حفرات قلبی (دهلیزها و بطن‌ها)، لایه ماهیچه‌ای و برونشاله توسط خون روشن سرخرگ‌های اکلیلی نفذیه می‌شوند.

**۶۳** دریچه‌های قلب از چین خوردن بافت پوششی درون‌شame به وجود می‌آیند.

**۶۴** **پیراشله** در تعاس مستقیم با پرده جنب اطراف نش‌ها قرار می‌گیرد. سطح بیرونی پیراشله و پرده جنب هر دواز جنس بافت پیوندی هستند.

### ۷۰ ساختار ماهیچه قلب

**۶۵** ماهیچه قلب ترکیبی لزویزگی‌های ماهیچه‌های اسکلتی و صاف را دارد و همانند ماهیچه‌های اسکلتی ظاهر مخطط و همانند

ماهیچه‌های صاف انقباض غیرازرادی دارد.



**۶۶ فلش‌نک:** یاخته‌های ماهیچه‌ای قلب، به تکل رشته‌های منشعب هستند. بیشتر این یاخته‌ها تک‌هسته‌ای و بعضی از آن‌ها نیز دو‌هسته‌ای هستند.

یاخته‌های ماهیچه‌ای قلبی



**۶۷** **وینه** یاخته‌های ماهیچه‌ای قلب از طریق صفحات بینابینی (درهم رفته) با هم ارتباط دارند. صفحات بینابینی موجب انتشار سریع پیام انقباض و استراحت بین یاخته‌های ماهیچه‌ای قلب می‌شوند. در نتیجه، یاخته‌های ماهیچه‌ای قلب به عنوان یک توده یاخته‌ای واحد عمل می‌کنند.

**۶۸** یاخته‌های ماهیچه‌ای دهلیزها و بطن‌ها به هم اتصال ندارند: چون بین آن‌ها بافت پیوندی عایقی وجود دارد که مانع از انقباض همزمان دهلیزها و بطن‌ها می‌شود.

**۶۹** **ترکیبی** انقباض ماهیچه‌های قلب، نتیجه لغزیدن اکتین و میوزین در مجاورت یکدیگر است و برای این کار به ATP و یون کلسیم نیاز دارد.

**۷۰** منشعب بودن یاخته‌های ماهیچه‌ای قلب و وجود صفحات بینابینی از ویژگی‌های اختصاصی یاخته‌های ماهیچه‌ای قلبی است و در ماهیچه‌های اسکلتی و صاف دیده نمی‌شود.

**۷۱** به دلیل وجود بافت عایق بین دهلیزها و بطن‌ها، انتقال پیام الکتریکی از دهلیزها به بطن‌ها فقط از طریق شبکه هادی صورت می‌گیرد و صفحات بینابینی نقشی در آن ندارند.

### ۷۲ شبکه هادی قلب

اموزش تصویری ویدئو شماره ۶۶

اصل مطلب



بعضی از یاخته‌های ماهیچه‌ای قلب ویژگی‌هایی دارند که آن‌ها را برای تعریف خودبهخودی قلب اختصاصی کرده است. پراکندگی این یاخته‌ها به صورت شبکه‌ای از رشته‌ها و گره‌ها در بین سایر یاخته‌هایی است که به مجموع آن‌ها شبکه هادی قلب می‌گویند.

یاخته‌هایی این شبکه با دیگر یاخته‌های ماهیچه قلبی ارتباط دارند. در این شبکه، پیام‌های الکتریکی برای شروع انقباض ماهیچه قلبی ایجاد می‌شوند و به سرعت در همه قلب گسترش می‌یابند.



شبکه هادی قلب شامل اجزای زیر است:

**۱** گره اول (گره سینوسی - دهلیزی): در دیواره پشتی دهلیز راست و زیر منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین قرار دارد. این گره بزرگ‌تر و شروع کننده پیام‌های الکتریکی است: به همین دلیل به آن گره پیشانگ یا ضربان‌ساز می‌گویند.

**۲** گره دوم (دهلیزی - بطنی): در دیواره پشتی دهلیز راست و در عقب درجه سلسختی قرار دارد.

**۳** رشته‌های شبکه هادی: وظایف مختلفی دارند: **۱** انتقال جریان الکتریکی از گره اول به گره دوم **۲** انتقال جریان الکتریکی از گره اول به دهلیز چپ **۳** انتقال پیام الکتریکی از گره دوم به دیواره بطن‌ها

## موقعیت‌ها

**۴-۱** کدام گزینه در ارتباط با گروهی از رگ‌های خونی انسان سالم که بین سرخرگ و سیاهرگ کوچک قرار دارند، صحیح است؟

- (۱) ممکن است غستای پایه ناقص و منفذ غشایی فرلوان داشته باشد.
  - (۲) قطعاً فشار خون ورودی، بیشتر از فشار خون خارج شده از آن‌ها است.
  - (۳) در محل اتصال به سرخرگ یا سیاهرگ، بتدارهای از ماهیچه صاف دارند.
  - (۴) بازدیدکشدن به سمت سیاهرگی، به تدریج فشار اسمزی آن کاهش می‌باید.
- (ترکیبی با سایر قصص)

**۴-۲** کدام گزینه در مورد شبکه‌های موقعی انسان درست است؟

- (۱) خون ورودی به هر شبکه موقعی، پس از تغییر رنگ از آن خارج می‌شود.
- (۲) خون ورودی به هر شبکه موقعی انسان، حاوی مقابله‌ی از اکسیژن است.
- (۳) در سمت سیاهرگی هر شبکه موقعی، فشار اسمزی بیشتر از سمت سرخرگی آن است.
- (۴) خون خروجی از هر شبکه موقعی، در مقایسه با خون ورودی به آن، کربن دی‌اکسید بیشتری دارد.

**۴-۳** چند مورد، در ارتباط با تبادل مواد در موقعی‌های انسان سالم، نادرست است؟

- الف) افزایش مقدار مایع بین‌یاخته‌ای می‌تواند ناشی از کعبود یروتنین‌های خون باشد.
- ب) بعضی یروتنین‌ها همراه با بخشی از خوناب، از دیواره موقعی خارج و به بافت وارد می‌شوند.
- ج) جهت ورود و خروج مواد در دو انتهای موقعی، به تفاوت فشار اسمزی و فشار تراوoshi بستگی دارد.
- د) غشای پایه نوعی موقعی در گلیه، به دلیل داشتن غشای پایه ضخیم، مانع از بروز رانی یروتنین‌ها می‌شود.


۱) ۴ (۴) ۲) ۳ (۳) ۳) ۲ (۲) ۴) ۱ (۱)

**۴-۴** کدام گزینه در ارتباط با موقعی‌های انسان، نادرست است؟

- (۱) انداز تولیدکننده اوره، قطعاً دارای موقعی‌هایی است که غستای پایه ناقص دارند.
- (۲) بتداره موقعی ممکن است در محل اتصال موقعی به سیاهرگ قرار داشته باشد.
- (۳) خروج ذرهای بزرگ از بعضی موقعی‌ها می‌تواند بدون مصرف ATP انجام شود.
- (۴) هر موقعی موجود در روده انسان، فقط از یک سمت خود به سرخرگ منصل است.

**۴-۵** کدام گزینه از نظر درستی یا نادرستی با سایر گزینه‌ها متفاوت است؟

- ۱) هر یاخته موجود در بتداره موقعی، قطعاً دارای یک هسته است.
- ۲) موقعی‌های مغز برخلاف موقعی‌های گلیه، غشای پایه پیوسته دارند.
- ۳) انداز تحریب‌کننده گویجه‌های قرمز مرده، موقعی ناپیوسته دارد.



۱) ۴ (۴) ۲) ۳ (۳) ۳) ۲ (۲) ۴) ۱ (۱)

**۴-۶** چند مورد، جمله زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

- اساختناری که در شکل مقابل با علامت سؤال مشخص شده است،
- تحت تأثیر بیام‌های اعصاب خودمعختار منقبض می‌شود.
  - میزان ورود یا خروج خون از شبکه موقعی را تنظیم می‌کند.
  - تنظیم‌کننده اصلی میزان جریان خون در شبکه موقعی است.
  - در هر شبکه موقعی، در سمت سرخرگی هر موقعی وجود دارد.

۱) ۱ (۱) ۲) ۲ (۲) ۳) ۳ (۳) ۴) ۴ (۴)

**۴-۷** چند مورد، جمله زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

ادر موقعی‌های می‌شود.

الف) مرکز متوقف‌کننده فرایند دم، ورود و خروج مواد به شدت تنظیم

ب) نوعی انداز ترشح‌کننده اریتروبیوتین، منفذ زیادی در غشای یاخته‌ها دیده

ج) موجود در کیسول بومن، در غشای یاخته‌هایی به نام یودوسیت، منفذ فراوانی یافت

د) انداز ذخیره‌کننده ماده معدنی موردنیاز برای تولید هموگلوبین، غشای پایه ضخیم دیده

۱) ۱ (۱) ۲) ۲ (۲) ۳) ۳ (۳) ۴) ۴ (۴)

**۴-۸** در فردی که مقدار آلبومین خوناب آن کمتر از افراد سالم است، فشار اسمزی موقعی

- (۱) در طول موقعی تبلت است.
- (۲) بیشتر از حد طبیعی است.
- (۳) به تدریج در طول آن افزایش می‌باید.

**۴-۹** کدام گزینه در ارتباط با تبادل مواد در شبکه موقعی انسان نادرست است؟

- (۱) بیشتر بودن فشار اسمزی نسبت به فشار تراوoshi، سبب بازگشت مواد به موقعی می‌شود.
- (۲) افزایش فشار خون سیاهرگی، منجر به افزایش بازگشت مایعات از بافت به موقعی‌ها می‌شود.
- (۳) مایع ترلوش شده از لبتدای موقعی، ممکن است پس از بازگشت به آن وارد سرخرگ شود.
- (۴) موادی که از ابتدای موقعی خارج و به انتهای آن وارد می‌شوند، حجم و ترکیب متفاوت دارند.

## مهروماه

**بررسی سایر گزینه‌ها گزینه ۱۱:** ضخامت مجرای جمع‌کننده از بالا به پایین افزایش می‌یابد اما دقیق نبود که این مجرای جزء گردیزه نیست! **گزینه ۱۲:** بخت قبضه‌مانند گردیزه، کپسول بومن نام دارد؛ دقیق نبود که در کپسول بومن، باز جذب (بازگشت مواد به مویرگ‌ها) انجام نمی‌شود. **گزینه ۱۳:** قسمت ابتدایی لوله هنله از نظر ضخامت متابه لوله پیچ خورده نزدیک است: همچنین ضخامت قسمت انتهایی بخت بالاروی لوله هنله متابه لوله پیچ خورده دور است.

### ۲۹. گزینه ۱۴

**بررسی تک تک مولود مورد اول (ادرست):** هرچه از سرخرگ کلیه دورتر و به سیاهرگ کلیه نزدیکتر می‌شوند، از میزان اکسیژن کمتر و به میزان کربن دی‌اکسید خون افزوده می‌شود بنابراین غلظت کربن دی‌اکسید در گلومرول کمتر از شبکه دور لوله‌ای است. **مورد دوم (ادرست):** میزان گلوکز خون در سیاهرگ‌های بین‌هرمی کمتر از سرخرگ ولبران است. **مورد سوم (نادرست):** آب علاوه بر نفرون، در مجرای جمع‌کننده نیز باز جذب می‌شود. بنابراین مقدار آب مابعد درون مجرای جمع‌کننده کمتر از لوله پیچ خورده دور است. **مورد چهارم (درست):** غلظت لوره موجود در مجرای جمع‌کننده بیشتر از لوله پیچ خورده دور است. دقیق نبود که در مجرای جمع‌کننده مقدار اوره بیشتر نمی‌شود اما به دلیل باز جذب آب، غلظت این ماده افزایش می‌یابد!

### ۳۰. گزینه ۱۵

هر گردیزه، یک بخت قبضه‌مانند بمنام کپسول بومن و یک لوله هنله دارد اما در کلیه تعداد ساختارهای قبضه‌مانند بیشتر از لوله‌های هنله است: چون در کلیه، علاوه بر کپسول‌های بومن، بخت قبضه‌مانند دیگری به نام لگنچه نیز وجود دارد! **بررسی سایر گزینه‌ها گزینه ۱۶:** در هر هرم کلیوی، تعداد زیادی انسداد سرخرگی وجود دارد. **گزینه ۱۷:** تعداد مجراهای جمع‌کننده از تعداد گردیزه‌ها کمتر است: چون چندین گردیزه به یک مجرای جمع‌کننده متصل‌اند؛ بنابراین تعداد مجراهای جمع‌کننده از تعداد کپسول‌های بومن کمتر است. **گزینه ۱۸:** به هر کپسول بومن فقط یک سرخرگ به نام سرخرگ آوران وارد می‌شود اما هر نفرون دارای دو لوله پیچ خورده (نزدیک و دور) است.

### ۳۱. گزینه ۱۹

در فواصل بین هرم‌های کلیه، سرخرگ‌هایی با خون روشن و سیاهرگ‌هایی با خون تیره وجود دارند خون موجود در این سرخرگ‌های دار نهایت به کلافک می‌رسد و مقدار زیادی از مولاد زائد نیتروژن دار آن به درون کپسول بومن ترکشیده شود. خون خارج شده از کلافک نیز در نهایت به سیاهرگ‌ها می‌رسد خون سیاهرگ کلیه کمترین میزان ماده زائد نیتروژن دارد. **بررسی سایر گزینه‌ها گزینه ۲۰:** قطورترین سرخرگ‌های موجود در بخت قتری کلیه، سرخرگ‌های آوران هستند. این سرخرگ‌ها فقط از یک طرف باشکه مویرگی (کلافک) در ارتباط هستند. در حالی که سرخرگ ولبران بین دو شبکه مویرگی (کلافک و شبکه دور لوله‌ای) قرار دارد. **گزینه ۲۱:** سرخرگ آوران از محل اتصال میزانی به کلیه عبور نمی‌کند بلکه انتسابی از سرخرگ است که در بخت قتری کلیه ابجاد می‌شود. **گزینه ۲۲:** بخت بیرونی آن است: در حالی که رأس هرم‌های کلیه و بخت قطورتر مجراهای جمع‌کننده به سمت مقعر کلیه قرار دارند.

### ۳۲. گزینه ۲۳

شبکه اول مویرگی (کلافک) در یک انتهای گردیزه‌ها متأهد می‌شود اما انتهای دیگر گردیزه (لوله پیچ خورده دور) نیز توسط شبکه دوم مویرگی (دور لوله‌ای) احاطه شده است. **بررسی سایر گزینه‌ها گزینه ۲۴:** بخت قبضه‌مانند خارج از گردیزه لگنچه نام دارد که در تولید ادرار نقشی ندارد اما در پس از تولید در گردیزه‌ها و مجراهای جمع‌کننده به لگنچه می‌ریزد. **گزینه ۲۵:** سیاهرگ‌های درون هرمه همان سیاهرگ‌های کوچکی هستند که از به هم پیوستن سمت سیاهرگی مویرگ‌های اطراف لوله‌های هنله بوجود می‌آیند. **گزینه ۲۶:** آخرین بخت گردیزه لوله پیچ خورده دور قرار دارد و مویرگ‌های اطراف آن فقط خون روشن دارند.

**گزینه ۲۶:** ترکیب شیمیایی ادرار در لگنچه تغییر نمی‌کند. ترکیب شیمیایی ادرار در نفرون و مجرای جمع‌کننده تعیین می‌شود. **گزینه ۲۷:** لگنچه، ساختاری قیف‌مانند است که بخت پهن آن به سمت هرم‌های کلیه و بخت باریک آن به میزانی منصل است.

### ۳۳. گزینه ۲۸

در شکل سؤال، مورد (د) سیاهرگ کلیه را نشان می‌دهد و حلوی خون تیره است. دقیق نبود که اگرچه میزان کربن دی‌اکسید موجود در خون تیره بیشتر از خون روشن است اما با این حال، در خون تیره همانند خون روشن، بخت کربن دی‌اکسید است به همین دلیل، در خون تیره همانند خون روشن، بخت عمده هموگلوبین در اتصال با اکسیژن قرار دارد. **بررسی سایر گزینه‌ها گزینه ۲۹:** مورد (الف) سرخرگ کلیه است و خون روشن را به کلیه وارد می‌کند.

**دقت کنید:** در محل ناف کلیه، سرخرگ بالاتر از سیاهرگ قرار دارد. **گزینه ۳۰:** مورد (ب) کپسول کلیه از بافت پیوندی تشکیل شده است: در حالی که یاخته‌های بلفت چربی تری گلیسرید ذخیره می‌کنند. **گزینه ۳۱:** مورد (ج) یک لپ کلیه را نشان می‌دهد (نه هرم کلیوی)، البته لپ همانند هرم کلبوی، حاوی نفرون‌ها و مجرای جمع‌کننده است.

### ۳۴. گزینه ۳۲

در مویرگ‌های اطراف نفرون، فقط شبکه مویرگی اطراف بخت پایین روزی هنله در تعلق مستقیم با سیاهرگ قرار دارند پس این بخت از نفرون، لوله پیچ خورده نیستند. **بررسی سایر گزینه‌ها گزینه ۳۳:** سیاهرگ‌های موجود در قاصله بین هرم‌های طور مستقیم با مویرگ‌های ارتباط نیستند بلکه سیاهرگ‌های کوچکی که در مجموعت مویرگ‌ها ایجاد می‌شوند بهم می‌پیوندند و سیاهرگ‌های بزرگتری را می‌سازند که از بین هرم‌ها عبور می‌کنند. **گزینه ۳۴:** نزدیکترین بخت نفرون، بخت پایینی لوله هنله استند مویرگ‌های موجود در این بخت، سمت سرخرگی (حاوی خون روشن) و سمت سیاهرگی (حلوی خون تیره) دارند. **گزینه ۳۵:** بعضی مولادز مویرگ‌های درون کپسول بومن (گلومرول) و بعضی مولادنیز از مویرگ‌های اطراف لوله‌های پیچ خورده و هنله (شبکه دوم مویرگی) به درون نفرون می‌رسند و بخته شدن مواد از گلومرول به نفرون از طریق ترکشیده شدن مواد از شبکه دوم به نفرون از طریق ترشح صورت می‌گیرد.

### ۳۵. گزینه ۳۶

خون شبکه مویرگی اطراف لوله هنله در مقایسه با خون موجود در کلافک دارای مقداری کمتری از اوریکا می‌شود. **بررسی سایر گزینه‌ها گزینه ۳۷:** مواد بازگشته از نفرون به درون کپسول را از سرخرگ آوران دریافت می‌کنند. **گزینه ۳۸:** مواد بازگشته از گردیزه از طریق باز جذب وارد شبکه مویرگی دور لوله‌ای می‌شود اما مواد به کلافک باز جذب نمی‌شوند. **گزینه ۳۹:** لوله هنله در مقایسه با کپسول بومن در بخت های عمیقی تر کلیه قرار دارد: بنابراین بمطور معمول کلافک در مقایسه با مویرگ‌های اطراف لوله هنله به قاعدة هرم‌های کلبوی نزدیکتر است.

### ۳۶. گزینه ۴۰

جهت حرکت مایع درون بخت پایین روزی هنله، از بالا به پایین اما جهت حرکت خون در مویرگ‌های اطراف آن از بالا به هنله نیز جهت حرکت مایع از پایین به بالا دارد در بخت بالاروی هنله نیز جهت حرکت مایع از هنله به بالا اما جهت حرکت خون در مویرگ‌های اطراف آن از بالا به هنله دقت کنید: به پایین به بالا اما جهت حرکت خون در مویرگ‌های اطراف آن از بالا به هنله دقت کنید.

## مهرومه

هر ملهمای بازجذب نمی‌شودا بتاباین نمی‌توان گفت که مواد صرفاً بر اساس اندازه بازجذب می‌شوند دوماً خروج مواد از انتهای نفرون و ورود آن‌ها به لوله جمع‌کننده بر مبنای اندازه آن‌ها صورت نمی‌گیرد.

### ۴۰ (گزینه)

بخشی از نفرون که در مجلووت سیاهرگ قرار دارد، قسمت پایین‌رودی لوله هنله استه لوله هنله حلوی موادی است که ممکن است در انتهای نفرون (لوله پیچ خورده دور) و مجرای جمع‌کننده بازجذب شوند و به شبکه دورولوله‌ای بازگردند. **بررسی سایر گزینه‌ها** **گزینه ۱۱**: بخش پایین‌رودی لوله هنله محبویت خود را به سمت رأس هرم هدایت می‌کند. **گزینه ۱۲**: محبویت بخش پایین‌رودی هنله بتدابه بخش بالاروی هنله و پس از آن به لوله پیچ خورده دور منتقل می‌شود. **گزینه ۱۳**: در طول نفرون، بعضی مواد از آن بازجذب و بعضی مواد نیز به درون آن ترشح می‌شوند. بتاباین از بخش پایین‌رودی هنله تامجرای جمع‌کننده غلظت مواد دچار تغییر می‌شود.

### ۴۱ (گزینه)

اختلاف قطر سرخرگ‌های اوران و ولبران موجب افزایش میزان تراوش می‌شود چون میزان تراوش به فشار خون بستگی دارد از طرف دیگر، اگر میزان تراوش مواد به درون نفرون بیشتر بشود، میزان بازجذب بعضی مواد نیز افزایش می‌یابد. بتاباین اختلاف قطراین دو گهای میزان بازجذب نیز تأثیر می‌گذارد. **بررسی سایر گزینه‌ها** **گزینه ۱۴**: مواد خارج‌شده از کپسول بومن، بتدابه وارد لوله پیچ خورده نزدیک می‌شوند که یاخته‌های آن ریزپریز دارند. **گزینه ۱۵**: موادی که از گلومرول خارج و به فضای درون کپسول بومن وارد می‌شوند، دیگر نمی‌شوند. بتدابه مویرگ‌های گلومرول بازگردند. **گزینه ۱۶**: اولین بخش نفرون، کپسول بومن نام دارد و ورود موادی از قبل سوم و داروهای درون نفرون، از کپسول بومن آغاز می‌شود.

**دقت کنید:** ورود سموم، داروها و بعضی مواد دیگر به نفرون از دو طریق است: ۱) تراوش ۲) ترشح.

### ۴۲ (گزینه)

بعضی مواد از یاخته‌های پوششی دیواره نفرون به درون آن ترشح می‌شوند این مواد برای ورود به درون نفرون از غشای پایه عبور نمی‌کنند. **بررسی سایر گزینه‌ها** **گزینه ۱۷**: ترشح فرایندی است که طی آن، بعضی مواد را از مویرگ‌های دورولوله‌ای یا یاخته‌های پوششی دیواره نفرون به درون نفرون می‌برند. بتاباین ترشح نمی‌تواند منجر به افزایش غلظت آن‌ها در شبکه دورولوله‌ای شود. **گزینه ۱۸**: نیروی لازم برای ورود مواد به نفرون در فرایند تراوش (نه ترشح)، از فشار خون تأمین می‌شود.

### ۴۳ (گزینه)

**روoom:** نیروی لازم برای ترشح، در مواردی که جایه‌جایی مواد برخلاف جهت شیب غلظت آن‌هاست با تجزیه ATP و در مواردی که جایه‌جایی در جهت شیب غلظت است، از انرژی جنتی مولکول‌ها تأمین می‌شود.

**گزینه ۱۹**: ترشح در کپسول بومن انجام نمی‌شود؛ پس این فرایند نمی‌تواند یون‌های هیدروژن را به هر بخش از نفرون وارد کند.


### ۴۴ (گزینه)

در لوله پیچ خورده نزدیک موادی از قبل آب، گلوکز و آمینواسیدها بازجذب می‌شوند؛ بتاباین می‌توان گفت که این لوله نسبت به آب، آمینواسیدها و ... نفوذ‌بدیر است. **بررسی سایر گزینه‌ها** **گزینه ۲۰**: بازجذب مواد از لوله پیچ خورده نزدیک آغاز می‌شود. **گزینه ۲۱**: وجود ریزپریز در یاخته‌های پوششی گردیزه، سبب افزایش میزان بازجذب مواد می‌شود.

### ۴۵ (گزینه)

**گزینه ۲۲**: ترکیبات دفعی ممکن است از مویرگ‌های دورولوله‌ای یا خود یاخته‌های گردیزه به درون گردیزه ترشح شوند.

**گزینه ۲۳**: اگر به شکل زیر دقت کنید، متوجه خواهد شد که دیواره بیرونی کپسول بومن به لوله پیچ خورده نزدیک پیوسته است. لوله پیچ خورده نزدیک دارای یاخته‌های ریزپریزدار است و ریزپریزها، چین خوردگی‌های غشای یاخته‌ای بتاباین می‌توان گفت که دیواره بیرونی کپسول بومن در تعاس با بخش دیگری از گردیزه به نام لوله پیچ خورده نزدیک است که یاخته‌های آن غشای چین خورده دارند.



### ۴۶ (گزینه)

بیشتر بون مقدار یک ماده در ادرار نسبت به مقدار تراوش شده به درون کپسول بومن، به معنی این است که این ماده از طریق ترشح نیز وارد نفرون می‌شود. چنین مادهای بازجذب نمی‌شود و به مویرگ‌های دورولوله‌ای بازنمی‌گردد. **بررسی سایر گزینه‌ها** **گزینه ۲۴**: مادهای که مقدار آن در ادرار کمتر از مقدار تراوش شده به درون کپسول بومن ایست، بازجذب دارد. چنین مادهای به درون نفرون ترشح نمی‌شود. **گزینه ۲۵**: وجود ریزپریز‌های در نفرون، سبب افزایش بازجذب مواد می‌شود؛ به عبارت دیگر بازجذب فقط محدود به ریزپریز‌های یاخته‌ای فاقد ریزپریز نیز می‌توانند در بازجذب مولد نقش داشته باشند. **گزینه ۲۶**: ترشح در بیشتر موارد به صورت فعال و با مصرف ATP انجام می‌شود لاما ترشح بعضی مواد تیز به روش غیرفعال انجام می‌شود و به انرژی زیستی نیاز ندارد.

### ۴۷ (گزینه)

بازجذب در کلیه‌های نسان به معنی انتقال مواد از لوله‌های سازنده ادرار به مویرگ‌های اطراف آن‌هاست. بتاباین هنگام بازجذب، مواد از دوردیف یاخته عبور می‌کنند که یکی مربوط به دیواره لوله و دیگری مربوط به دیواره مویرگ است. **بررسی سایر گزینه‌ها** **گزینه ۲۷**: بعضی از موادی که از طریق لبرار دفع می‌شوند، مقدارشان بیشتر از مقدار تراوش شده به درون کپسول بومن است؛ چون از طریق ترشح نیز به گردیزه یا مجرای جمع‌کننده ترشح می‌شوند. **گزینه ۲۸**: بعضی از مواد از مویرگ‌های دورولوله‌ای و بعضی مواد نیز از خود یاخته‌ای پوششی نفرون به درون آن ترشح می‌شوند. **گزینه ۲۹**: موادی که خارج از کپسول بومن به نفرون وارد می‌شوند، از طریق ترشح به آن می‌رسند بعضی از این مواد از یاخته‌ای پوششی نفرون به درون آن ترشح می‌شوند و در نتیجه از مایع بین یاخته‌ای عبور نمی‌کنند؛ در حالی که برای ترشح مواد مویرگ‌های دورولوله‌ای به نفرون، لازم است این مواد از مایع بین یاخته‌ای عبور کنند.

### ۴۸ (گزینه)

**بررسی تک تک موارد** **مورد اول**: ورود مواد به نفرون از طریق تراوش و ترشح صورت می‌گیرد. تراوش از مویرگ‌های کلافک انجام می‌شود که دلایی دو سمعت سرخرگی هستند لاما ترشح از مویرگ‌های دورولوله‌ای انجام می‌شود که یک سمعت آن‌ها به سیاهرگ ختم می‌شود. **مورد دوم**: خروج مولد از نفرون به دو طریق انجام می‌شود: ۱- بازجذب مولد که باعث افزایش غلظت آن‌ها در شبکه دوم مویرگی می‌شود ۲- خروج از لنهای نفرون که تاثیری در غلظت مواد شبکه دوم مویرگی ندارد. **مورد سوم** هنگام تراوش، مولد از دیواره مویرگ‌های متقدار می‌گذرند اما در ترشح او لا ممکن است مواد از مویرگ عبور نکنند دوماً مویرگ‌های شبکه دورولوله‌ای برخلاف کلافک از نوع منفذار نیستند! **مورد چهارم**: لا می‌دانند که در طول نفرون،

۱۰ دیواره یاخته، عملکردهای متفاوتی دارد: از جمله: ۱) حفظ شکل یاخته‌ها و در نتیجه استحکام پیکر گیاه ۲) کنترل تبادل مواد بین یاخته‌ها در گیاه ۳) جلوگیری از ورود عوامل بیماری‌زا.

۱۱ **نرکیس** مراحل تقسیم سیتوپلاسم یاخته‌های گیاهی:

۱) دستگاه گلزاری ریزکیسه‌هایی را می‌سازد که حاوی پیش‌سازه‌های تیغه میانی و دیواره یاخته‌هایی.

۲) این ریزکیسه‌ها در محل تشکیل دیواره جدید به هم می‌پیوندند و ساختاری به نام صفحه یاخته‌ای را به وجود می‌آورند.

۳) صفحه یاخته‌ای از دو طرف به دیواره یاخته مادری متصل می‌شود و در نتیجه، دو یاخته جدید از هم جدا می‌شوند.

۱۲ همزمان با تشکیل تیغه میانی، در دو طرف آن غشای جدید نیز تشکیل می‌شود. این غشاهای، در نتیجه به هم پیوستن ریزکیسه‌های تولید شده توسط دستگاه گلزاری به وجود می‌آیند.


**دقیقت کنید:** صفحه یاخته‌ای با تیغه میانی متفاوت است! صفحه یاخته‌ای ساختاری است که از به هم پیوستن ریزکیسه‌های تولید شده توسط دستگاه گلزاری حاصل می‌شود و علاوه بر ترکیبات سازنده تیغه میانی، غشا نیز دارد: در حالی که تیغه میانی غشاندارد.

۱۳ **نرکیس** ساختارهایی مانند لان و پلاسمودس، در هنگام تشکیل دیواره جدید، پایه‌گذاری می‌شوند.

۱۴ **نرکیس** پس از تقسیم هسته، معمولاً سیتوپلاسم نیز تقسیم می‌شود: به عبارت دیگر، معکن است در مواردی هسته تقسیم شود اما پس از آن تقسیم سیتوپلاسم صورت نگیرد.

۱۵ در تقسیم سیتوپلاسم یاخته‌های گیاهی، معمولاً صفحه یاخته‌ای در وسط یاخته مادر تشکیل می‌شود و در نتیجه، دو یاخته همان‌دازه ایجاد می‌کند. اما در برخی موارد، محل تشکیل صفحه یاخته‌ای وسط یاخته نیست و در نتیجه دو یاخته با اندازه متفاوت حاصل می‌شوند.

۱۶ با توجه به شکل زیر، رستمهای سلولزی در هر لایه از دیواره پسین با هم موازی هستند اما با لایه دیگر زاویه دارند.



**دقیقت کنید:** با توجه به شکل بالا، تیغه میانی ممکن است بیش از دو یاخته گیاهی را در کنار هم نگه دارد

۱۷ **ویدئو** برخی یاخته‌های گیاهی، دیواره ندارند! به عنوان مثال اسپرم (گامت نر)، تخم‌زا و سایر یاخته‌های موجود در گیسه‌های رویانی دیواره ندارند.

۱۸ خارجی‌ترین لایه دیواره در هر یاخته گیاهی دیواره‌دار، دیواره نخستین است. به عبارت دیگر، دیواره پسین در سمت داخلی دیواره نخستین تشکیل می‌شود.

۱۹ تیغه میانی فقط در محل دیواره مشترک بین دو یاخته گیاهی وجود دارد. بنابراین در یاخته‌های گیاهی مجزا، تیغه میانی دیده نمی‌شود: همچنین در سمتی از یاخته گیاهی که در تماس با محیط است (مثلًا سطح خارجی یاخته‌های روپوست) دیواره نخستین قرار دارد و تیغه میانی دیده نمی‌شود.

۲۰ با تشکیل دیواره‌های نخستین و پسین، تیغه میانی از پروتوبلاست دور می‌شود.

۲۱ دیواره یاخته‌های گیاهی توسط پروتوبلاست و به سمت خارج آن ساخته می‌شود.

۲۲ **ویدئو** دیواره پسین، جدیدترین، داخلی‌ترین و ضخیم‌ترین لایه سازنده دیواره یاخته گیاهی است. همچنین در بین لایه‌های تشکیل دهنده دیواره پسین، داخلی‌ترین لایه از بقیه جدیدتر است.

۲۳ دیواره نخستین نسبت به آب نفوذپذیر است اما اگر دیواره بر اثر تولید مولالیبیدی مانند چوب‌پنه تغییر کند، نسبت به آب نفوذناپذیر خواهد شد.

۲۴ در پی ساخته شدن دیواره و افزایش ضخامت آن: ۱) از حجم پروتوبلاست کاسته می‌شود. ۲) فاصله غشای یاخته از تیغه میانی بیشتر می‌شود.

۲۵ آوندهای چوبی (نراکنیدها و عناصر آوندی) و یاخته‌های اسکلرانشیمی (قیبر و اسکلرانشیم) دیواره پسین چوبی شده دارند.


۲۶ رستمهای سلولزی موجود در هر لایه دیواره پسین به مولازات هم قرار دارند اما جهت قرارگیری این رستمهای لایه‌های مختلف دیواره پسین یکسان نیست.

۲۷ اندازه یاخته پس از تشکیل دیواره پسین افزایش پیدا نمی‌کند: چون تشکیل دیواره پسین مانع از رشد یاخته گیاهی می‌شود.

۲۸ ترکیبات سازنده دیواره یاخته گیاهی، پس از تولید توسط پروتوبلاست، از طریق برون‌دانی از غشا خارج و به دیواره افزوده می‌شوند.

۲۹ یاخته‌های گیاهی مرده همانند یاخته‌های گیاهی زنده در دیواره خود لان دارند اما پلاسمودس ندارند. این یاخته‌ها، در لان‌های دیواره خود کانال‌های بدون سیتوپلاسم دارند.

۳۰ سطح بیرونی یاخته‌های سطحی گیاهان، فلقد پلاسمودس است. به عنوان مثال، سطح بیرونی یاخته‌های روپوست برگ فلقد پلاسمودس است: چون این یاخته‌ها از سمت بیرونی خود با یاخته دیگری ارتباط ندارند.



## ◀ انواع سامانه های بافتی

۱ ریشه، ساقه و برگ نهان دانگان، سه بخش دارد که به هر یک سامانه بافتی می گویند. بنابراین پیکر هر گیاه نهان داره (گل دار)، از سه سامانه بافتی به نام های پوششی، زمینه ای و آوندی تشکیل شده است و هر سامانه بافتی عملکرد خاصی دارد.

۲ بدن جانوران از دستگاه های مختلفی مانند دستگاه گوارش، دستگاه گردش خون و دستگاه تنفس تشکیل شده است. کتاب درسی برای گیاهان، به جای دستگاه از واژه سامانه استفاده می کند. مثلًا به جای دستگاه آوندی، از واژه سامانه آوندی استفاده می کنیم. هر سامانه از بافتها و باخته های مختلفی تشکیل شده است.

**دقیق کنید:** گیاهان غیر آوندی (خزمه ها) بافت ندارند. بنابراین در آن ها سامانه های پوششی، زمینه ای و آوندی نیز بافت نمی شود.

۳ شکل مقابل مربوط به نوعی گیاه دولیه است: چون دسته های آوندی ساقه آن بر روی یک دایره قرار گرفته اند و همچنین در داخلی ترین بخش ریشه آن بافت آوندی قرار دارد.

### • سامانه بافت پوششی

#### اصل مطلب



#### آموزش تصویری ۷۲ ویدئوی شماره



- این سامانه، عملکردی شبیه پوست جانوران دارد: سراسر اندام گیاه را می بپوشاند و آن را در برابر عوامل بیماری زا و تخریب گر مدافعت می کند.
- سامانه بافت پوششی در برگ ها، ساقه ها و ریشه های جوان، روپوست نامیده می شود و معمولاً از یک لایه یاخته تشکیل شده است. سامانه پوششی برگ نیز روپوست نام دارد و از یک لایه یاخته تشکیل شده است. یکی از کارهای روپوست، کاهش تبخیر آب از اندام های هوایی گیاه است. یاخته های روپوست در این اندام ها، لایه ای به نام پوستک می سازند که نقش محافظتی دارد.
- سامانه بافت پوششی در اندام های مسن، پیراپوست (پریدرم) نام دارد.

۴ یاخته های روپوست ساقه های جوان و برگ ها، ترکیبات لیپیدی را می سازند، آن ها را به سطحی از روپوست که در مجاورت هوا قرار دارد، ترشح می کنند و لایه ای به نام پوستک را به وجود می آورند.


۵ **ویدئو** یکی از موضوعات مهمی که باید به آن توجه کنید، نوع سامانه پوششی در اندام های مختلف است که آن ها را به صورت زیر دسته بندی کرده ایم:

۱ سامانه پوششی در برگ همه نهان دانگان (تک لپه ای و دولپه ای، جوان و مسن) از نوع روپوست است.

۲ سامانه پوششی در برگ ها، ساقه ها و ریشه های جوان همه نهان دانگان روپوست نام دارد.

۳ سامانه پوششی در ریشه و ساقه نهان دانگان دو لپه ای مسن، از نوع پریدرم (پیراپوست) است.

۶ مهم ترین وظایف پوستک عبارتند از: ۱) کاهش تبخیر آب ۲) جلوگیری از ورود نیش حشرات و عوامل بیماری زا به گیاه ۳) حفظ گیاه در برابر سرما.



باخته های نگهدارنده روزنه

۷ بعضی یاخته های روپوستی در اندام های هوایی تمایز می بینند و به یاخته های نگهدارنده روزنه، گرک و یاخته های ترشحی تبدیل می شوند.

۸ در ریشه های جوان، تار کشته از تمایز بعضی یاخته های روپوستی ایجاد می شود. تارهای کشته ای، جذب آب و مواد معدنی را انجام می دهند.

۹ روپوست ریشه، پوستک از جنس لپید و در برابر آب نفوذ ناپذیر است در حالی که ریشه باید آب و مواد معدنی را جذب کند.

۱۰ **ترکیبی** پوستک موجود در سطح برگ نمی تواند از ورود نیش بعضی حشرات جلوگیری کند. این حشرات می توانند خرطوم خود را وارد برگ کرده و از ترکیبات موجود در آوندهای آبکش تغذیه کنند. از این حشرات برای جمع آوری تیره پروده در تحقیقات استفاده می کنند.

۱۱ ضخامت پوستک برگ در گیاهان مختلف بکسان نیست: بدیهی است که هر چه پوستک ضخیم تر باشد، توانایی آن در جلوگیری از خروج آب نیز بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال برگ های گیاه خرزه هر پوستک ضخیمی دارند.

**۱۲ تذکر مهم:** وجود پوستک در سطح برگ، خروج بخار آب (نعرق) را کاهش می دهد اما به مطرور کامل از خروج آب جلوگیری نمی کند: چون معمولاً مقداری از تبخیر آب (نعرق) از طریق پوستک انجام می شود.

### • همزیستی گیاه با تثبیت‌کننده‌های نیتروژن

۱۲ باکتری‌های تثبیت‌کننده نیتروژن، نیاز گیاه به این عنصر را برطرف می‌کند و گیاه نیز مواد آلی مورد نیاز باکتری را فراهم می‌کند.

#### ▪ ریزوبیوم‌ها:

۱۳ ریزوبیوم‌ها، باکتری‌هایی با توانایی تثبیت نیتروژن هستند که در گرهک‌های ریشه گیاهان تیره پروانه‌واران زندگی می‌کنند.

 ۱۴ در کتاب درسی می‌خوانیم: «سبا، نخود و یونجه از گیاهان مهم زراعی تیره پروانه‌واران هستند» از این جمله کتاب می‌توان نتیجه گرفت

که بعضی از گیاهان تیره پروانه‌واران، زراعی نیستند.



۱۵ تا زمانی که گیاه زنده است، نیتروژن مورد نیاز آن را به صورت آمونیوم تأمین می‌کند. پس از مرگ گیاه با وقتی که بخش‌های هوایی گیاه برداشت می‌شوند، گرهک‌ها در خاک می‌مانند و گیاخاک غنی از نیتروژن ایجاد می‌کنند.

۱۶ در روتی به نام تناوب کشت، گیاهان زراعی مختلف به صورت پی‌درپی کشت می‌شوند. یعنی پس از برداشت یک نوع گیاه زراعی، نوع دیگری از این گیاهان در همان زمین کشاورزی کاشته می‌شود. یکی از انواع گیاهانی که در تناوب کشت استفاده می‌شود، گیاهان تیره پروانه‌واران است دلیل نام‌گذاری این گیاهان، شباهت گل‌های آن‌ها به پروانه است.

#### ▪ سیانوباکتری‌ها:

۱۷ همه سیانوباکتری‌ها توانایی فتوستزرکننده‌اند و سبزیجات دارند اما بعضی سیانوباکتری‌ها علاوه بر فتوستزر، توانایی تثبیت نیتروژن را نیز دارند.

 ۱۸ دقیق کنید: سیانوباکتری‌ها فتوستزرکننده‌اند و سبزیجات دارند اما قادر به سبزیجات ندارند: چون باکتری‌ها اندامک غشادر ندارند.

۱۸ آزو لا نوعی گیاه کوچک و آبزی است که در تالابهای شمال و مزارع برنج کشور به قراونی وجود دارد. آزو لا با سیانوباکتری‌ها همزیستی دارد و نیتروژن تثبیت‌کننده آن‌ها را دریافت می‌کند.



۱۹ گونرا گیاهی است که در نواحی فقیر از نیتروژن، رشد شکفتانگیزی دارد که این رشد به دلیل همزیستی با سیانوباکتری‌ها صورت می‌گیرد. سیانوباکتری‌های همزیست، درون ساقه و دمبرگ این گیاه، تثبیت نیتروژن را انجام می‌دهند و از محصولات فتوستزری گیاه استفاده می‌کنند.



۲۰ گونرا گیاهی بزرگ و فتوستزرکننده است که برگ‌های سیلر بزرگی دارد.

۲۱  گرچه سیانوباکتری‌ها فتوستزرکننده‌اند اما در مواردی که با گیاهان همزیستی برقرار می‌کنند، از ترکیبات آلی نولیدشده توسط گیاه استفاده می‌کنند. چون ممکن است در بخش‌هایی از گیاه جایگزین شوند که به دلیل نرسیدن نور به آن‌ها، امکان فتوستزر وجود نداشته باشد.

### ► روش‌های دیگر به دست آوردن مواد غذایی در گیاهان

#### اموزش تصویری

ویدئوی شماره ۸۳

#### اصل مطلب



• گیاهان از روش‌های مختلفی برای جذب آب و مواد مغذی استفاده می‌کنند. بسیاری از گیاهان برای افزایش جذب مواد مورد نیاز خود، از روابط همزیستی با جانداران دیگر (مانند قارچ‌ها و باکتری‌ها) استفاده می‌کنند.

• بعضی گیاهان نیز مواد مورد نیاز خود را از جانوران و یا گیاهان دیگر بدست می‌آورند. در این جادو گروه از این گیاهان را بررسی می‌کنیم:

۱ گیاهان حشره‌خوار: این گیاهان فتوستزرکننده‌اند اما در مناطقی زندگی می‌کنند که از نظر نیتروژن فقیرند: بنابراین با شکار جانوران کوچک (مانند حشرات)، نیتروژن مورد نیاز خود را به دست می‌آورند (مانند گیاه توبره‌وات).

۲ گیاهان انگل: انواعی از گیاهان انگل وجود دارند که همه با بخشی از آب و مواد غذایی مورد نیاز خود را از گیاهان فتوستزرکننده دریافت می‌کنند. (مانند بس و گل جالیز).

۱۰. چند مورد در ارتباط با پارامسی صادق است؟


- الف) واکونول گوارشی، به مولکول هایی با عمل اختصاصی نیاز دارد.
- ب) نومی واکونول دفعی، در تنظیم قشار اسمرزی جاندار نقش دارد.
- ج) واکونول غذایی، در انتهای حفره گوارشی جاندار تشکیل می شود.
- د) نومی واکونول غیرانتقباضی، محتویات خود را از طریق منفذی به خارج وارد می کند.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)




۱۱. با توجه به شکل زیر کدام گزینه، صحیح است؟

- ۱) یاخته های بخش ۲ برخلاف یاخته های بخش ۳، بفتحهای لازم برای افزایش زیاد قطر ساقه را فراهم می کنند.
- ۲) یاخته های بخش ۴ همانند یاخته های بخش ۲، بر روی سطح خود ترکیبی لبپیدی ترسع می کنند.
- ۳) یاخته های بخش ۳ برخلاف یاخته های بخش ۱، فضاهای بین یاخته های بسیار اندازی دارند.
- ۴) یاخته های بخش ۱ همانند یاخته های بخش ۴، هسته درستی در مرکز دارند.

(یافته های)

۱۲. با توجه به شکل زیر که بخشی از دستگاه های بدن نومی جاندار را نشان می دهد، کدام عبارت صحیح است؟

- ۱) بخش ۲ همانند بخش ۱، آب و یون ها را باز جذب می نمایند.
  - ۲) بخش ۳ همانند بخش ۲، آنزیم های مؤثر در هضم مواد غذایی را ترسع می کند.
  - ۳) بخش ۴ برخلاف بخش ۳، یون های وارد شده از مایع میان بالفتی را دریافت می نمایند.
  - ۴) بخش ۴ برخلاف بخش ۱، نوعی ماده دفعی دارای اتحلال پذیری کم را دریافت می کند.
۱۳. در ارتباط با همه اندام هایی که با تولید پیک شیعیابی دور بود یکسان، تعداد فراوان ترین یاخته های خونی انسان را تنظیم می کنند. کدام مورد نادرست است؟
- ۱) به دفع بعضی مولکول های آلی بدن کمک می نمایند.
  - ۲) قشار اسمرزی خون را در حد مناسبی نگه می دارند.
  - ۳) بر قرایبند انقلاد خون در محل خون ریزی نقش مؤثری دارند.
  - ۴) هر یک می توانند با تغییر در مقادیر چشم گیری از نوعی ماده دفعی نیتروژن دار، از میزان سمعیت آن بگاهند.
۱۴. در ارتباط با یک گیاه حلزی، کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟
- در هر نوع بارگیری
- ۱) آب از نوعی آوند به نوعی دیگر انتقال می یابد.
  - ۲) تبره گیاهی با مصرف انرژی به درون آوند وارد می شود.
  - ۳) ترکیباتی از یاخته های زنده به یاخته های مرده منتقل می شود.
  - ۴) تبره گیاهی به صورت توده ای از مواد به سمت محل مصرف حرکت می نماید.



۱۵. با توجه به شکل زیر، که بخشی از دستگاه گردش خون انسان را نشان می دهد، کدام عبارت درست است؟

- ۱) بخش ۲ همانند بخش ۱، ابتدا خون را به دهلیز راست وارد می نماید.
- ۲) بخش ۲ برخلاف بخش ۱، خون نواحی چپ قلب را دریافت می نماید.
- ۳) بخش ۱ برخلاف بخش ۲، ابتدا خون را به نواحی چپ قلب هدایت می کند.
- ۴) بخش ۱ همانند بخش ۲، در ایجاد صدای قوی و گنگ قلب نقش اصلی را دارد.