



سؤال‌های نسبتاً دشوار ?

انتظار داریم دانشآموزان ترازهای ۴۷۵۰ تا ۵۵۰۰ از هر ۱۰ سوال به ۵ سوال پاسخ دهند.

انتظار داریم دانشآموزان ترازهای ۵۵۰۰ تا ۶۲۵۰ از هر ۱۰ سوال به ۶ (یا ۷) سوال پاسخ دهند.

انتظار داریم دانشآموزان ترازهای ۶۲۵۰ به بالا از هر ۱۰ سوال به بیش از ۸ سوال پاسخ دهند.

- ۱- اتم X دارای ۳ ایزوتوپ X^{24} , X^{23} و X^{21} می‌باشد. در صورتی که درصد فراوانی آن‌ها به ترتیب برابر ۲۰, ۷۰ و ۱۰ و جرم اتمی میانگین اتم X برابر $4amu$ باشد، در ایزوتوپ سنگین‌تر چند نوترون وجود دارد؟

-  ۷۶% ۴۶%  ۹۰/۰۷/۲۲  ۱۶۷۳۴
۱۵ (۴) ۱۴ (۳) ۱۳ (۲) ۱۲ (۱)
۲- با توجه به اطلاعات زیر می‌توان دریافت که گونه‌های ... طیف نشری خطی یکسانی دارند.

P : تعداد پروتون، N : عدد جرمی (N: تعداد نوترون، P: تعداد پروتون و A: عدد جرمی)


$$X: N \approx 18, N < P \approx 25$$

$$X: N \approx 12, N < P \approx 23$$

$$Y: N \approx 12, A \approx 24$$

$$Y: N \approx 20, A \approx 37$$

-  ۷۰% ۵۰%  ۹۰/۰۸/۰۶  ۱۷۶۹۵
۱) Y و X ۲) Y و X ۳) Y و X ۴) امکان ندارد که طیف نشری خطی دو گونه، یکسان باشد.
۳- در شکل زیر که مربوط به طیف نشری خطی اتم هیدروژن است، کدام انتقال الکترونی مربوط به بخش نامرئی، کدام انتقال مربوط به خط قرمز و کدام انتقال الکترونی طول موج کوتاه‌تری دارد؟ (از راست به چپ)

-  ۶۵% ۱۷%  ۹۱/۰۷/۲۱  ۶۷۶۹

D C A (۱)
B D A (۲)
D D B (۳)
B C B (۴)

- ۴- اگر تفاوت تعداد نوترون و الکترون یون X^+ برابر ۹ باشد و عدد جرمی عنصر X برابر ۸۰ باشد، عدد اتمی عنصر X و تعداد الکترون‌های لایه‌ی ظرفیت آن به ترتیب کدامند؟ (گزینه‌ها را از راست به چپ بخوانید).

-  ۶۳% ۱۶%  ۹۱/۰۷/۲۱  ۶۷۶۹
۱) عدد اتمی عنصر A و B به ترتیب برابر ۳۳ و ۲۴ است.
۲) عنصر A یک گاز نجیب بوده و عنصر B از عناصر اصلی دوره پنجم جدول تناوبی است.
۳) عنصر B قطعاً دارای ۱۰ الکترون با عدد کوانتموی $n=1$ است.
۴) عنصر B می‌تواند هم گروه یکی از عناصر X و Y باشد.



۶- جرم 10^{22} آtom از کدام ترکیب تقریباً $2/7$ برابر جرم 10^{22} آtom کلریک آمونیاک است؟

۶۳% ۱۸% ۹۳/۰۸/۲۳ ۲۵۴۱۳



۷- در واکنش زیر، پس از موازن نسبت مجموع ضریب‌های فراورده‌ها به ضریب هیدروکلریک اسید (HCl) کدام است؟



۵۸% ۲۰% ۹۰/۰۹/۰۴ ۱۷۷۲۹

۱ (۴)

$\frac{14}{15}$ (۳)

$\frac{1}{2}$ (۲)

۲ (۱)

۸- شمار اتم‌ها در کدام نمونه ماده بیشتر است؟

۵۸% ۶% ۹۱/۰۷/۲۱ ۶۷۶۹

(۱) $0/5$ مول گاز اکسیژن

(۲) $0/5$ مول گاز کربیتون

(۳) $0/5$ مول گاز جامد

(۴) $0/5$ مول ید جامد

۹- اگر جرم پروتون 1840 برابر جرم الکترون، جرم نوترون 1850 برابر جرم الکترون و جرم الکترون برابر $0/00054$ amu در نظر گرفته شود، جرم تقریبی یک اتم تریتیم برابر چند گرم خواهد بود؟

(۱) $1/66$ آtom (10^{-24} g)

۵۷% ۱۶% ۹۳/۰۷/۲۵ ۱۹۳۹۶

(۱) $4/96$ آtom (10^{-24} g)

(۲) $4/34$ آtom (10^{-24} g)

(۳) $9/112$ آtom (10^{-24} g)

(۴) $9/815$ آtom (10^{-24} g)

۱۰- یون X^- دارای 36 الکترون است. در صورتی که در یکی از ایزوتوپ‌های عنصر X با فراوانی 90% ، رابطه $\frac{16}{A}$ برقرار باشد و در ایزوتوپ دیگر اختلاف پروتون و نوترون 9 باشد، جرم اتمی میانگین عنصر X چند است؟ (A: عدد جرمی، Z: عدد اتمی)

۵۵% ۱۴% ۹۳/۰۹/۲۱ ۳۲۵۲۴

۷۹/۵ (۴)

۷۹/۹ (۳)

۷۹/۲ (۲)

۷۹/۱ (۱)

۱۱- عدد اتمی عنصری که کاتیون سه ظرفیتی آن دارای یک زیرلایه d^3 نیمه پر است، کدام است؟

۵۴% ۶% ۹۱/۱۰/۰۸ ۱۵۱۰۷

۲۵ (۴)

۲۹ (۳)

۲۶ (۲)

۲۴ (۱)

۱۲- $0/02$ گرم از کدام عنصر دارای 10^{20} اتم است؟ ($N_A = 6/022$ آtom)

۵۲% ۱۷% ۹۰/۰۸/۲۰ ۲۱۵۲۷

^{40}Ca (۴)

^{39}K (۳)

^{24}Mg (۲)

^{23}Na (۱)

۱۳- جرم اتمی ایزوتوپی از A، کمتر از نصف جرم اتمی ایزوتوپی از B است. اگر جرم اتمی مجموع دو ایزوتوپ 200 amu باشد، نسبت عدد جرمی ایزوتوپ A به عدد جرمی ایزوتوپ B کدام است؟

۵۱% ۱۸% ۹۳/۰۹/۰۷ ۲۵۲۴۲

$\frac{1}{3}$ (۴)

$\frac{3}{2}$ (۳)

$\frac{1}{2}$ (۲)

۲ (۱)



۱۴- در کدام گزینه، مجموع تعداد الکترون با اعداد کوانتموی $n=3$ و $n=1$ و همچنین $n=2$ با بقیه متفاوت است؟ (تمامی عناصر از دوره‌ی چهارم جدول تناوبی هستند).

۴۷% ۲۰٪ ۹۳/۰۹/۲۱ ۲۲۵۲۴

- (۱) A^{2-} از گروه ۷
- (۲) B^{3-} از گروه ۸
- (۳) C^{2-} از گروه ۶
- (۴) D^{2-} از گروه ۹

۱۵- در کدام ترکیب داده شده، شمار جفت الکترون‌های ناپیوندی، ۱/۵ برابر شمار جفت الکترون‌های پیوندی است؟

۴۶% ۱۸٪ ۹۱/۰۹/۱۰ ۲۱۳۸۸




۱۶- هیدروژن دو ایزوتوپ پایدار H^1 و H^3 و گوگرد چهار ایزوتوپ پایدار S^{2+} , S^{3+} , S^{4+} و S^{5+} دارد. با توجه به این ایزوتوپ‌ها چند نوع مولکول هیدروژن سولفید (H_2S) با جرم‌های متفاوت خواهیم داشت؟

۴۴% ۱۵٪ ۹۱/۰۹/۲۴ ۲۳۴۶۹

- (۱) ۶ (۲)
- (۳) ۸ (۴) ۱۶

۱۷- طبق مدل اتمی بور، برای توجیه طیف نشری خطی اتم هیدروژن، هر انتقال الکترونی از یک تراز انرژی بالاتر به یک تراز انرژی پایین‌تر، یک خط طیفی را در طیف نشری خطی به وجود می‌آورد. اگر انتقال الکترونی A با خط طیفی X_1 در طیف نشری خطی مشخص شده باشد، کدام انتقال الکترونی نشان دهنده‌ی خط طیفی X_2 است؟

۴۳% ۱۵٪ ۹۳/۱۱/۱۰ ۲۶۸۹۵



- (۱) C
- (۲) D
- (۳) E
- (۴) B

۱۸- عنصر X در لایه‌ی سوم انرژی خود ۱۰ الکترون دارد. آرایش الکترونی لایه سوم آن به صورت ... است و این عنصر با عدد اتمی ... جزو عناصر دسته ... محسوب می‌شود.

۴۰% ۱۴٪ ۹۱/۰۸/۲۶ ۲۵۴۸۱

- (۱) $s\ 20\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^2$
- (۲) $s\ 20\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$
- (۳) $d\ 22\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^10$
- (۴) $d\ 22\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^2$

۱۹- در جرم‌های برابر از کدام دو ماده‌ی زیر، تعداد اتم‌ها برابر است؟

(ON_{16} , HN_1 , SN_{32} , CN_{12} , NN_{14} : $g \cdot mol^{-1}$)



۴۹% ۱۹٪ ۹۳/۰۸/۲۳ ۲۵۴۱۳

- (۱) آ و ب
- (۲) پ و ت
- (۳) آ و ت
- (۴) ب و پ



۲۰- ایزوتوپی از عنصر M دارای جرم اتمی 208amu است و $62/5$ درصد از ذرات سازندهٔ هستهٔ آن را نوترون‌ها تشکیل می‌دهند. نسبت تعداد الکترون‌های M^{2+} به تعداد نوترون‌های آن تقریباً کدام است؟



(۱) ۱/۷ (۲) ۰/۶۸ (۳) ۰/۵۸ (۴) ۲۰٪

۲۱- عنصر فرضی A دارای ۳ ایزوتوپ است. اگر درصد فراوانی ایزوتوپ اول ۳ برابر ایزوتوپ دوم و درصد فراوانی ایزوتوپ دوم ۲ برابر ایزوتوپ سوم باشد و جرم‌های اتمی این سه ایزوتوپ بر حسب amu به ترتیب برابر با 108 , 126 و 90 باشند، جرم اتمی میانگین این عنصر بر حسب amu چقدر است؟



(۱) ۱۱۸ (۲) ۱۰۸ (۳) ۹۸ (۴) ۱۱۶

۲۲- یون X^{2+} دارای ۲۷ الکترون است، کدام مطلب درست است؟



(۱) آرایش الکترونی X^{2+} به صورت $[Ar]^{2d}10^{4s}1$ است.

(۲) عدد اتمی X برابر ۲۷ بوده و در شش زیر لایهٔ آن الکترون وجود دارد.

(۳) در X^{2+} هفت زیر لایه از الکترون اشغال شده و عدد اتمی آن برابر ۲۹ است.

(۴) لایهٔ الکترونی سوم X^{2+} ، هفده الکترون دارد.

۲۳- اگر ترکیب A_2O_3 شامل $34/8$ درصد اکسیژن باشد، جرم مولی عنصر A تقریباً چند گرم بر مول است؟



(۱) ۲۷ (۲) ۵۶ (۳) ۴۵ (۴) ۵۲

سؤال‌های دشوار

انتظار داریم دانش‌آموزان ترازهای ۴۷۵۰ تا ۵۵۰۰ از هر ۱۰ سوال به ۲ سوال پاسخ دهند.

انتظار داریم دانش‌آموزان ترازهای ۵۵۰۰ تا ۶۲۵۰ از هر ۱۰ سوال به ۳ (یا ۴) سوال پاسخ دهند.

انتظار داریم دانش‌آموزان ترازهای ۶۲۵۰ به بالا از هر ۱۰ سوال به بیش از ۵ سوال پاسخ دهند.

۲۴- کدام مطلب در مورد ترکیب Cl_2O_7 نادرست است؟^(۱)



۱) در هر مولکول Cl_2O_7 ، ۹ اتم وجود دارد.

۲) در یک مجموعه مولکول از Cl_2O_7 ، به ازای ۸۳ مولکول اسیژن، ۱۸ اتم کلر وجود دارد.

۳) در یک مجموعه مولکول از Cl_2O_7 ، به ازای ۱۷/۷۵ گرم اتم کلر، ۴۲/۲۵ گرم مولکول Cl_2O_7 وجود دارد.

۴) در هر ۶۰۲۱۰ مولکول Cl_2O_7 ، ۷ مول اتم اسیژن وجود دارد.

۲۵- اگر در آرایش الکترونی عنصر اصلی X، تعداد الکترون‌های ظرفیت ۰/۶ برابر شمار بقیه‌ی الکترون‌ها باشد، نماد یون پایدار آن و فرمول ترکیب کلسیم دار آن می‌باشد.



$$\text{CaX} > \text{X}^> \quad (۲)$$

$$\text{CaX}_2 > \text{X}^> \quad (۱)$$

$$\text{CaX} > \text{X}^{2>} \quad (۴)$$

$$\text{CaX}_2 > \text{X}^{2>} \quad (۳)$$

۲۶- عنصر A برای پایدار شدن به یونی با آرایش گازنجیب Ne و عنصر B برای پایدار شدن به یونی با آرایش گازنجیب Kr تبدیل می‌شود. کدام گزینه در مورد دو عنصر یاد شده کاملاً درست است؟



۱) ترکیب حاصل از عناصر A و B، یک ترکیب یونی است.

۲) لایه‌های الکترونی یون‌های پایدار حاصل، کاملاً پُر است.

۳) شمار زیرلایه‌های کاملاً پُر در یون پایدار حاصل از عنصر A، برابر با شمار لایه‌های کاملاً پُر موجود در یون پایدار حاصل از عنصر B است.

۴) در یون پایدار حاصل از عنصر A، شش الکترون با عدددهای کوانتموی $l=1, 2, n=2$ و در یون پایدار حاصل از عنصر B شش الکترون با عدددهای کوانتموی $l=2, n=3$ وجود دارد.

۲۷- برای عنصر A نسبت فراوانی ایزوتوپ سنگین‌تر به ایزوتوپ سبک‌تر برابر $\frac{2}{5}$ است. این عنصر دارای دو ایزوتوپ $\text{A}^{M>1}$ و $\text{A}^{M<1}$ است. جرم اتمی میانگین این عنصر کدام است؟



$$M < \frac{2}{5} \quad (۴)$$

$$M > \frac{5}{2} \quad (۳)$$

$$\frac{2M < 5}{7} \quad (۲)$$

$$M > \frac{3}{7} \quad (۱)$$

۲۸- تعداد اتم‌های هیدروژن در ۸ گرم اتان (C_2H_6) با تعداد الکترون‌ها در چند گرم از یون $^{56}\text{Fe}^{2+}$ برابر است؟



$$8/42 \quad (۴)$$

$$6/73 \quad (۳)$$

$$4/56 \quad (۲)$$

$$3/73 \quad (۱)$$



۲۶% ۱۶% ۹۳/۰۹/۰۷ ۲۵۲۴۲

۲/۷ (۴)

۱/۳ (۳)

۲/۳ (۲)

۱/۷ (۱)

-۳۰- اتم فرضی A دارای دو ایزوتوپ است، اگر به ازای هر ایزوتوپ سنگین، ۴ ایزوتوپ سبک وجود داشته باشد و اختلاف تعداد نوترون دو ایزوتوپ برابر ۲ باشد، اختلاف جرم اتمی میانگین و جرم ایزوتوپ سنگین کدام است؟

۲۵% ۱۵% ۹۱/۰۸/۲۶ ۲۵۴۸۱

 $\frac{8}{7}$ (۴) $\frac{8}{5}$ (۳) $\frac{6}{7}$ (۲) $\frac{6}{5}$ (۱)

-۳۱- کدام گزینه درست است؟

۲۵% ۱۶% ۹۲/۰۹/۰۸ ۲۰۱۷۱

۱) مجموع تعداد نوترون‌ها و الکترون‌های $^{۵۶}\text{Fe}^{۲+}$ برابر ۵۵ می‌باشد.

۲) یون $^{۴۰}\text{X}^{۲+}$ که اختلاف تعداد نوترون‌ها و الکترون‌ها در آن برابر ۱۰ است، دارای ۱۶ پروتون می‌باشد.

۳) اختلاف تعداد پروتون‌های دو یون N^{x+} و M^{y+} که تعداد الکترون‌های آن‌ها یکسان است برابر ^{۴}X می‌باشد.

۴) اگر جرم اتم A، $5/5$ برابر جرم اتم X^{2+} باشد، جرم اتم A برابر 33amu است.

-۳۲- اگر جرم الکترون $\frac{1}{۳۰۰۰}$ جرم هر یک از ذره‌های پروتون و نوترون فرض شود، نسبت جرم اتم ^{۴۰}Ca به جرم الکترون‌های ^{۳۰}Ne به تقریب کدام است؟

۲۵% ۱۷% ۹۲/۰۹/۲۲ ۲۷۱۶۳

۸۰۰۰ (۴)

۲۰۰۰ (۳)

 $\frac{1}{۲۰۰۰}$ (۲) $\frac{1}{۴۰۰۰}$ (۱)

-۳۳- با در نظر گرفتن سه ایزوتوپ هیدروژن (^{1}H , ^{2}H , ^{3}H) و سه ایزوتوپ اکسیژن (^{16}O , ^{17}O , ^{18}O)؛ می‌توان گفت مجموع تعداد آب‌هایی با جرم و با اختلاف جرم سبک‌ترین و سنگین‌ترین آب برابر است.

۲۵% ۱۱% ۹۱/۰۴/۲۴ ۱۰۰۷۹

$24\text{amu} > 18\text{amu}$ (۱)

$22\text{amu} > 19\text{amu}$ (۲)

$21\text{amu} > 20\text{amu}$ (۳)

$23\text{amu} > 18\text{amu}$ (۴)

-۳۴- یون X دارای ۳۶ الکترون و تفاوت تعداد الکترون و نوترون در آن ۹ واحد است. عدد اتمی و عدد جرمی اتم X کدام گزینه است؟

۲۵% ۱۰% ۹۳/۰۸/۲۳ ۲۵۴۱۳

۷۹ و ۳۵ (۴)

۷۹ و ۳۶ (۳)

۸۰ و ۳۵ (۲)

۸۰ و ۳۶ (۱)



۳۵-در یون A^{24} تفاوت شمار الکترون‌ها و نوترون‌ها برابر ۸ و در یون B^{16} این تفاوت برابر ۱۶ است. کدام عبارت نادرست است؟

۲۴% ۹٪ ۹۱/۰۹/۲۴ ۱۰۰۷۹

۱) اتم بعد از اتم B دارای ۱۰ الکترون با N ۱ بوده


۲) عدد اتمی B برابر ۴۱ بوده و این عنصر در گروه ۵ جدول تناوبی قرار دارد.

۳) اتم A، اولین عنصر جدول تناوبی است که دارای ۱۸ الکترون با N ۳ است.

۴) عدد اتمی A برابر ۲۹ بوده و این عنصر در گروه ۱۱ جدول تناوبی قرار دارد.

۳۶-عنصر X، دارای ۳ ایزوتوپ با مشخصات زیر می‌باشد. اگر جرم اتمی میانگین این عنصر برابر $31/95\text{amu}$ باشد، تعداد نوترون‌ها در دومین ایزوتوپ از نظر جرم ایزوتوپ چقدر است؟

۲۳% ۹٪ ۹۳/۰۹/۰۷ ۲۵۴۲۴



۱۵ (۱)

۱۶ (۲)

۱۷ (۳)

۱۸ (۴)

۳۷-اگر تفاوت تعداد الکترون‌ها و نوترون‌های عنصر X⁷⁵ برابر ۹ باشد، عدد اتمی عنصر X و نسبت الکترون‌های با N ۲ به الکترون‌های با N ۱ در آرایش الکترونی این عنصر به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

۲۳% ۹٪ ۹۱/۰۹/۲۴ ۱۰۰۷۹

$$\frac{8}{10} > ۳۳ \quad (۲)$$

$$\frac{8}{10} > ۴۲ \quad (۱)$$

$$\frac{10}{15} > ۴۲ \quad (۴)$$

$$\frac{10}{15} > ۳۳ \quad (۳)$$

۳۸-با توجه به آرایش الکترونی یون‌های $Ar^{3d^1s^2p^5}$, $He^{2s^22p^6}$, A^{3+} : $Ne^{3s^23p^6}$, C^{+} : $Ne^{3s^23p^5}$, D^{3-} : $Ne^{3s^23p^6}$ ، کدام عبارت زیر نادرست است؟

۲۳% ۹٪ ۹۳/۰۱/۲۲ ۲۲۹۱۸

۱) عناصر A و C در جدول تناوبی هم‌گروه هستند.

۲) عنصر D از دسته‌ی عناصر d است.

۳) اتم عنصر C شعاع اتمی بزرگتری نسبت به اتم عنصر A دارد.

۴) عنصر A در تناوب سوم و عنصر B در تناوب دوم قرار دارد.

۳۹-اگر عنصر X تنها دارای دو ایزوتوپ X^{79} و X^{83} باشد و فراوانی ایزوتوپ X^{79} سه برابر فراوانی ایزوتوپ X^{83} باشد، جرم اتمی میانگین عنصر X بر حسب amu چه قدر است؟

۲۳% ۹٪ ۹۱/۰۹/۲۴ ۱۰۰۷۹

۸۱ (۴)

۷۹/۸ (۳)

۸۰/۶ (۲)

۸۰ (۱)



۲۳% ۸٪ ۹۱/۰۹/۲۴ ۱۰۰۷۹

۴۰- کدامیک از عبارت‌های زیر، نادرست است؟

۱) شمار زیرلایه‌های پر در اتم N_7 ، با شمار لایه‌های الکترونی اشغال شده در اتم O_8 برابر است.

۲) اختلاف زیرلایه‌های پر در ساختار الکترونی Fe^{26} و Fe^{24} ، برابر با ۱ است.

۳) آرایش الکترونی $[Ar]^{3d^1} [Ar]^{18}$ ، می‌تواند متعلق به یک کاتیون باشد.

۴) در اتم As_{33} ، هشت زیرلایه از الکترون پر شده است.

۴۱- آرایش یون A^{-3} به $3p^6$ و یون‌های B^{2+} و C^{3-} به $2p^6$ ختم شده است. بر اساس این مطالب، کدام مورد در بین گزینه‌های زیر درست می‌باشد؟

۲۲% ۱۱% ۹۳/۰۸/۰۹ ۲۵۰۸۹

۱) A و C در یک گروه جدول تناوبی قرار دارند.

۲) A عنصری نافلز و B یک فلز است.

۳) عنصری واسطه از گروه ۳ و دوره‌ی پنجم می‌باشد.

۴) اختلاف عدد اتمی B و C ۵ واحد می‌باشد.

۴۲- در طبیعت ۳ ایزوتوب برای عنصر X یافت می‌شود که دارای جرم‌های ۶۱، ۶۲ و ۶۳ می‌باشند. اگر فراوانی سنگین‌ترین ایزوتوب برابر با ۵۵٪ باشد و جرم اتمی میانگین این عنصر برابر ۶۲/۵ باشد، فراوانی سبک‌ترین ایزوتوب کدام است؟

۲۲% ۸٪ ۹۱/۰۹/۲۴ ۱۰۰۷۹

۱۵ (۴)

۴ (۳)

۵ (۲)

۳۵ (۱)

۴۳- با توجه به طیف نشری خطی اتم هیدروژن کدام مطلب صحیح است؟

۲۱% ۱۲% ۹۴/۰۹/۰۶ ۲۶۹۶۲

۱) الکترون به هنگام انتقال از حالت پایه به $n=1$ ، از خود نور نشر می‌کند.

۲) الکترون برانگیخته در $n=4$ نسبت به الکترون برانگیخته در $n=3$ پر انرژی‌تر است.

۳) کوتاه‌ترین طول موج در ناحیه‌ی مرئی مربوط به انتقال الکترون، از $n=6$ به پایدارترین تراز انرژی می‌باشد.

۴) اختلاف انرژی بین لایه‌ها با افزایش n افزایش می‌یابد.

۴۴- در یون تک‌اتمی M^{2-} ، اگر تفاوت الکترون‌ها و نوترون‌ها برابر ۹ باشد، عدد اتمی این عنصر کدام است و چند زیرلایه نیم‌پر در اتم M وجود دارد؟

۲۰% ۱۳% ۹۱/۰۸/۲۶ ۲۵۴۸۱

۳-۵۱ (۴)

۲-۴۲ (۳)

۲-۵۱ (۲)

۳-۴۲ (۱)



۴۵- طیف نشری خطی اتم نئون با طیف نشری خطی اتم هیدروژن است به طوری که، در طیف اتم نئون، برخی از خطوط با فاصله هم هستند. در طیف نشری خطی اتم هیدروژن نور سبز حاصل انتقال الکترون از تراز به تراز است.



۱) متفاوت - دور از -

۲) مشابه - دور از -

۳) متفاوت - نزدیک به -

۴) مشابه - نزدیک به -

۴۶- تعداد اتم‌های هیدروژن موجود در $1\text{ g} / 204\text{ L}$ میلی‌گرم H_2S برابر $n = 0.34 \times 10^{23}$ است، n کدام است؟



۲۰ (۴)

۱۹ (۳)

۱۸ (۲)

۱۷ (۱)



سؤال‌های دشوار‌تر

انتظار داریم دانش‌آموزان ترازهای ۴۷۵۰ تا ۵۵۰۰ از هر ۱۰ سوال به ۱ سوال پاسخ دهند.

انتظار داریم دانش‌آموزان ترازهای ۵۵۰۰ تا ۶۲۵۰ از هر ۱۰ سوال به ۲ (یا ۳) سوال پاسخ دهند.

انتظار داریم دانش‌آموزان ترازهای ۶۲۵۰ به بالا از هر ۱۰ سوال به بیش از ۴ سوال پاسخ دهند.

۴۷- با درنظر گرفتن دو ایزوتوپ بور (B^{10}) و دو ایزوتوپ کلر (Cl^{35}, Cl^{37}) چند نوع مولکول BCl_3 می‌توان یافت و در میان آن‌ها چند مولکول BCl_3 با جرم مولکولی متفاوت و چند مولکول BCl_3 با جرم مولکولی یکسان وجود دارد؟ (عددها را به ترتیب از راست به چپ بخوانید).



۲، ۶، ۸، ۱)

۲، ۴، ۶، صفر

۲، ۴، ۶، ۳

۴، ۶، صفر

۴۸- اتم X، با جرم اتمی میانگین $^{1}g/mol^{>1}$ ، دارای یون‌های A_1X^{2-} ، A_2X^{2-} و A_4X^{3-} است که در هر کدام از آن‌ها، تفاوت شمار نوترون‌ها و پروتون‌ها، دو برابر بار یون می‌باشد. اگر درصد فراوانی این سه ایزوتوپ به ترتیب برابر ۲۵، ۵۰ و ۲۵ درصد باشد، عدد اتمی X کدام است؟ (جرم پروتون و نوترون را یکسان و برابر $1amu$ در نظر بگیرید).



۲۴ (۱)

۲۵ (۲)

۲۲ (۳)

۲۸ (۴)

۴۹- اگر در ترکیب ACl_x ، x عددی صحیح باشد و $^{10}Ar/2044/1mol^{>1}$ مولکول از این ترکیب ۲/۷۵ گرم جرم داشته باشد، فرمول این ترکیب کدام است؟ ($AN^{31}, ClN^{35}/5:g/mol^{>1}$)



۴۸ (۱)

۴۷ (۲)

۴۶ (۳)

۴۵ (۴)

۵۰- کدام مطلب نادرست است؟ ($ON^{16}, HN^{1}, SN^{32}:g/mol^{>1}$)



۱) جرم مولی، جرم یک مول از ذرات ماده بر حسب گرم است.

۲) ۰/۰ مول گاز هیدروژن سولفید شامل ۱۷ گرم از آن است.

۳) ۰/۰ مول گاز SO_2 شامل $^{10}S/8066/1$ اتم اکسیژن است.

۴) جرم $^{10}Ar/5055/1$ مولکول آب برابر $4/5$ گرم است.

۵۱- میانگین جرم اتمی عنصری با دو ایزوتوپ برابر ۱۹۶ است. اگر فراوانی ایزوتوپ سنگین‌تر نسبت به فراوانی ایزوتوپ سبک‌تر ۴ به ۶ باشد و تعداد نوترون ایزوتوپ سنگین‌تر ۵ واحد بیشتر از ایزوتوپ سبک‌تر باشد و نیز در ایزوتوپ سبک‌تر، اختلاف الکترون و نوترون برابر ۳۸ باشد، عدد اتمی این عنصر کدام است؟



۷۹ (۱)

۷۸ (۲)

۷۵ (۳)

۷۶ (۴)

۵۲- طیف نشری اتم هیدروژن به صورت ... است که در انرژی‌های بالا فاصله خطوط رنگی از یکدیگر ... بوده و این طیف نتیجه ...

۱۲% ۴٪ ۹۱/۱۱/۱۳ ۲۱۸۶۱

۱) خطی - بیشتر - بازگشت الکترون برانگیخته به ترازهای انرژی پایین‌تر است.

۲) خطی - کمتر - بازگشت الکترون برانگیخته به ترازهای انرژی پایین‌تر است.

۳) پیوسته - بیشتر - جذب انرژی توسط الکترون و انتقال آن به ترازهای انرژی بالاتر است.

۴) پیوسته - کمتر - بازگشت الکترون برانگیخته به ترازهای انرژی پایین‌تر است.

۵۳- اگر تعداد الکترون‌های زیرلایه‌ی $3d$ در عنصر A نصف شمار الکترون‌های زیرلایه‌ی $3d$ در اتم B باشد کدام گزینه در مورد این دو عنصر صحیح است؟

۱۱% ۸٪ ۹۴/۰۹/۰۶ ۲۶۹۶۲

۱) اختلاف عدد اتمی این دو عنصر می‌تواند ۲ باشد.

۲) این دو عنصر فقط متعلق به عناصر واسطه‌اند.

۳) در این دو عنصر فقط ۸ الکترون با $N = 1$ وجود دارد.

۴) عنصر B ممکن است در دوره‌ی بعدی نسبت به عنصر A در جدول قرار گرفته باشد.

۵۴- در یون تک اتمی و گازی M^{4+} ، اختلاف شمار الکترون‌ها و نوترون‌ها برابر ۱۶ و نسبت شمار نوترون‌های هسته به این اختلاف برابر $25/3$ است. کدام گزینه در مورد آن درست است؟

۱۱% ۶٪ ۹۳/۰۸/۰۹ ۲۵۰۸۹

۱) عدد اتمی عنصر M برابر ۳۶ است و در گروه چهارم جدول جای دارد.

۲) M با عناصرهای وانادیم (V_{23}) و هافنیم (Hf_{77}) هم‌گروه است.

۳) یون M^{4+} دارای آرایش الکترونی گاز نجیب زنون (Xe_{54}) است.

۴) اختلاف شمار عناصرهای موجود در تناوب قبل با تناوب بعد تناوبی که این عنصر در آن قرار دارد، برابر ۱۴ است.

۵۵- چه تعداد از عبارت‌های زیر، نادرست‌اند؟

اگر آرایش الکترونی اتم A به $4s^1$ ختم شود، یون پایدار آن ممکن است فاقد آرایش گاز نجیب باشد.

یون‌های O^{2-} ، N^{3-} و Al^{3+} همگی جزو یون‌های شناخته شده‌اند.

در یک ترکیب یونی که از نظر بار الکتریکی خنثی است، شمار کاتیون‌ها و آنیون‌ها برابر است.

اگر تعداد الکترون‌های ظرفیت اتمی کمتر یا برابر با چهار باشد، آن اتم در شرایط مناسب تمایل دارد به کاتیون تبدیل شود.

۱۰% ۶٪ ۹۲/۰۱/۱۶ ۱۶۷۵۶

۱) (۴)

۲) (۳)

۳) (۲)

۴) (۱)

۵۶- اگر تعداد اتم‌های هیدروژن در یک نمونه آمونیاک برابر $10^{21} / 132 \times 10^{36}$ اتم باشد و تعداد یون‌های Cl^- موجود در یک نمونه از کلسیم کلرید نیز همین تعداد باشد، جرم نمونه کلسیم کلرید تقریباً چند برابر جرم نمونه آمونیاک است؟

۱۰% ۴٪ ۹۳/۱۱/۱۰ ۲۶۸۹۵

۰/۱ (۴)

۶/۵۳ (۳)

۴/۳۵ (۲)

۹/۸ (۱)

۵۷- یون A^{2-} دارای ۴۶ الکترون است، اگر تعداد پروتون‌ها ۷۵٪ تعداد نوترون‌ها باشد، چه تعداد از عبارات زیر درست است؟

(آ) عدد جرمی A، ۱۱۲ و عدد اتمی آن ۴۸ است.

(ب) در آرایش الکترونی یون A^{2-} برخلاف آرایش B، زیر لایه نیمه‌پُر وجود ندارد.

(پ) عنصر A متعلق به گروه ۱۲ بوده و همانند عنصر بالایی خود (در این گروه) ظرفیت ۲+ دارد.

(ت) در عنصر A شمار الکترون‌ها با N_{N} ، دو برابر با تعداد الکترون‌ها با مشخصات N_4 و $N_{\text{N}}1$ است.



۱) (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

۵۸- عنصر M دارای ۲ ایزوتوپ است که به نسبت ۱ به ۳ در طبیعت وجود دارد. اگر ایزوتوپ سنگین‌تر ^{25}Mn باشد و در ایزوتوپ سبک‌تر اختلاف نوترون و پروتون ۱ واحد باشد، این عنصر دارای چند الکترون با N_{N} است؟



۲) (۱) ۴ (۲) ۶ (۳) ۱۱ (۴) ۱۲ (۴)

۵۹- تعداد الکترون‌ها با اعداد کوانتمومی $N_{\text{N}}2$ ، $N_{\text{N}}3$ در اتم Mn^{25} با تعداد الکترون‌ها با اعداد کوانتمومی $N_{\text{N}}2$ و $N_{\text{N}}3$ در کدام گونه زیر برابر است؟



۳) (۱) $^{29}\text{Cu}^{2-}$ (۲) ^{24}Cr (۳) $^{26}\text{Co}^{3-}$ (۴) $^{26}\text{Fe}^{3-}$

۶۰- با توجه به آرایش الکترونی اتم عنصر X X^{24} کدام گزینه نادرست است؟



(۱) هفت زیرلایه‌ی دارای الکترون و ۹ اوربیتال پر از الکترون وجود دارد.

(۲) در آخرین زیرلایه و نیز آخرین لایه‌ی الکترونی آن فقط یک الکترون وجود دارد.

(۳) تعداد الکترون‌های با $N_{\text{N}}1$ دو برابر شمار الکترون‌ها با $N_{\text{N}}2$ است.

(۴) اختلاف تعداد الکترون‌ها در لایه‌ی آخر و لایه‌ی مقابل آخر برابر ۱۱ الکtron است.

۶۱- ترکیب مولکولی X دارای جرم مولی M و ترکیب مولکولی Y دارای جرم مولی M_۲ است. تعداد مولکول‌های موجود در گرم از Y، چند برابر تعداد مولکول‌های موجود در ۲a گرم از X است؟



۱) (۱) $\frac{1}{2}$ (۲) $\frac{1}{3}$ (۳) $\frac{1}{4}$ (۴) $\frac{1}{8}$

۶۲- اگر اختلاف تعداد نوترون‌ها و پروتون‌ها در یون X^{2-} برابر دو باشد، در آرایش الکترونی این یون در حالت پایه چند زیرلایه با عدد کوانتمومی فرعی یک وجود دارد؟



۱) (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

۶۳- اگر تفاوت نوترون‌ها با عدد اتمی در یون M^{2-} برابر ۱۳ باشد، تعداد الکترون‌های M و آرایش الکترونی لایه‌ی ظرفیت M^{2-} کدام می‌باشد؟



۱) (۱) $3d^1 4s^1$ (۲) $3d^2 4s^2$ (۳) $3d^9 4s^1$ (۴) $3d^8 4s^2$