

# آموزش

## سیر تا پیاز

- |     |   |
|-----|---|
| ۸   | فصل اول: مواد و نقش آنها در زندگی       |
| ۲۳  | فصل دوم: رفتار اتم‌ها با یکدیگر         |
| ۳۷  | فصل سوم: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی |
| ۴۹  | فصل چهارم: حرکت چیست                    |
| ۶۷  | فصل پنجم: نیرو                          |
| ۸۳  | فصل ششم: زمین ساخت ورقه‌ای              |
| ۸۹  | فصل هفتم: آثاری از گذشته زمین           |
| ۹۵  | فصل هشتم: فشار و آثار آن                |
| ۱۱۱ | فصل نهم: ماشین‌ها                       |
| ۱۲۹ | فصل دهم: نگاهی به فضا                   |
| ۱۳۷ | فصل یازدهم: گوناگونی جانداران           |
| ۱۴۷ | فصل دوازدهم: دنیای گیاهان               |
| ۱۵۵ | فصل سیزدهم: جانوران بی‌مهره             |
| ۱۶۷ | فصل چهاردهم: جانوران مهره‌دار           |
| ۱۷۹ | فصل پانزدهم: با هم زیستن                |




### طبقه‌بندی عناصرها

تعداد پروتون‌های هر اتم (عدد اتمی) ویژگی‌ها و خواص شیمیایی آن اتم را تعیین می‌کند، به طوری که با تغییر تعداد پروتون‌ها، نوع عنصر و خواص و ویژگی‌های آن نیز تغییر می‌کند.


دانشمندان عنصر را براساس ساختار اتم‌هایشان و چگونگی رفتار آن‌ها، در جدولی به نام **جدول تناوبی** مرتب کرده‌اند.

### تعداد الکترون مدار آخر:

یکی از ویژگی‌هایی که می‌توان براساس آن عنصرها را طبقه‌بندی کرد، تعداد الکترون‌های مدار آخر اتم است. در این طبقه‌بندی عنصرهایی که تعداد الکترون مدار آخر آن‌ها برابر است در یک ستون قرار می‌گیرند.



با توجه به مدل اتمی بور در شکل‌های زیر مشخص است که  $Mg_{12}$  که در مدار آخر خود ۲ الکترون دارد به ستون ۲ جدول،  $Si_{14}$  به ستون ۴ جدول و  $Cl_{17}$  به ستون ۷ جدول تعلق دارد.



جدول زیر جدول تناوبی عناصر نام دارد که ستون‌های ۱، ۲، ۱۳، ۱۴، ۱۳، ...، ۱۸ همان ستون‌های ۱ تا ۸ در جدول قبل است.

۱	۱	H	هیدروژن	۱۰۰٪	۲	۲	He	هليوم	۱۰۰٪
۲	۳	Li	ليتیم	۹۰٪	۴	۵	Be	بریلیم	۹۰٪
۳	۱۱	Na	سنتزیم	۲۲٪۹	۴	۱۲	Mg	مسنتریم	۲۲٪۱
۴	۱۳	K	کالیم	۳۹٪۱	۵	۲۰	Ca	کلسیم	۴۰٪۰۸
۵	۱۷	Rb	روزیم	۸۵٪۷	۶	۲۱	Sc	استرالانیم	۴۰٪۶
۶	۱۸	Sr	سترلیتیم	۸۵٪۲	۷	۲۲	Ti	تیتانیم	۷۸٪۷
۷	۲۰	Y	ایتریم	۱۱٪۲	۸	۲۳	V	وانادیم	۵۰٪۹
۸	۲۱	Zr	زیرونکم	۱۱٪۱	۹	۲۴	Cr	کروم	۵۰٪۰
۹	۲۲	Nb	نوبیتیم	۴۹٪۹	۱۰	۲۵	Mn	منگنز	۵۹٪۴
۱۰	۲۳	Mo	مولیبدن	۴۹٪۴	۱۱	۲۶	Fe	آهن	۵۵٪۸
۱۱	۲۴	Tc	تکسنسیم	۹۸٪۰	۱۲	۲۷	Co	کالات	۵۸٪۹
۱۲	۲۵	Ru	روشنیم	۱۱٪۱	۱۳	۲۸	Ni	نیکل	۵۸٪۹
۱۳	۲۶	Rh	روندیم	۵۰٪۹	۱۴	۲۹	Cu	من	۳۲٪۵
۱۴	۲۷	Pd	پالادیم	۱۶٪۰	۱۵	۳۰	Zn	گارو	۶۰٪۳
۱۵	۲۸	Ag	نقره	۱۷٪۰	۱۶	۳۱	Ga	گالیم	۱۷٪۲
۱۶	۲۹	Cd	کادمیم	۱۱٪۴	۱۷	۳۲	Ge	زرانیم	۷۵٪۶
۱۷	۳۰	In	اندیمی	۱۱٪۰	۱۸	۳۳	As	ارسیک	۷۶٪۹
۱۸	۳۱	Sn	فلان	۱۱٪۷	۱۹	۳۴	Se	سلنیم	۷۸٪۶
۱۹	۳۲	Sb	انیشوان	۱۲٪۸	۲۰	۳۵	Te	تلوریم	۷۷٪۰
۲۰	۳۳	I	ید	۱۲٪۹	۲۱	۳۶	Xe	زئون	۱۳٪۱
۲۱	۳۷	Kr	کربیتون	۸٪۰	۲۲	۳۸	He	هلیوم	۱۰۰٪
۲۲	۳۹	Br	برم	۷۹٪۰	۲۳	۴۰	Ne	نوتون	۲۰٪۸
۲۳	۴۱	Ar	آرگون	۳۹٪۵	۲۴	۴۲	F	فلوئور	۱۹٪۰
۲۴	۴۳	Cl	کلر	۳۵٪۵	۲۵	۴۴	O	اکسیژن	۱۶٪۰
۲۵	۴۵	Si	سیلیسیم	۲۸٪۹	۲۶	۴۶	P	فسفر	۲۰٪۷
۲۶	۴۷	Al	آلومینیم	۲۶٪۸	۲۷	۴۸	B	بور	۱۵٪۰
۲۷	۴۹	Zn	زنک	۲۰٪۰	۲۸	۵۰	C	کربن	۱۱٪۱
۲۸	۵۱	Ga	گالیم	۱۷٪۲	۲۹	۵۲	N	نیتروژن	۱۱٪۰
۲۹	۵۲	In	اندیمی	۱۱٪۰	۳۰	۵۳	O	اکسیژن	۱۶٪۰
۳۰	۵۳	Sn	فلان	۱۱٪۷	۳۱	۵۴	F	فلوئور	۱۹٪۰
۳۱	۵۴	Sb	انیشوان	۱۲٪۸	۳۲	۵۵	Ar	آرگون	۳۹٪۵
۳۲	۵۵	Te	تلوریم	۱۲٪۹	۳۳	۵۶	He	هلیوم	۱۰۰٪
۳۳	۵۶	I	ید	۱۲٪۹	۳۴	۵۷	Xe	زئون	۱۳٪۱
۳۴	۵۷	Kr	کربیتون	۸٪۰	۳۵	۵۸	Ne	نوتون	۲۰٪۸
۳۵	۵۹	Br	برم	۷۹٪۰	۳۶	۶۰	F	فلوئور	۱۹٪۰
۳۶	۶۱	Ar	آرگون	۳۹٪۵	۳۷	۶۲	O	اکسیژن	۱۶٪۰
۳۷	۶۳	Cl	کلر	۳۵٪۵	۳۸	۶۴	P	فسفر	۲۰٪۷
۳۸	۶۴	Si	سیلیسیم	۲۸٪۹	۳۹	۶۵	B	بور	۱۵٪۰
۳۹	۶۵	Al	آلومینیم	۲۶٪۸	۴۰	۶۶	C	کربن	۱۱٪۱
۴۰	۶۶	Zn	زنک	۲۰٪۰	۴۱	۶۷	N	نیتروژن	۱۱٪۰
۴۱	۶۷	Ga	گالیم	۱۷٪۲	۴۲	۶۸	O	اکسیژن	۱۶٪۰
۴۲	۶۸	In	اندیمی	۱۱٪۰	۴۳	۶۹	F	فلوئور	۱۹٪۰
۴۳	۶۹	Sn	فلان	۱۱٪۷	۴۴	۷۰	Ar	آرگون	۳۹٪۵
۴۴	۷۰	Sb	انیشوان	۱۲٪۸	۴۵	۷۱	He	هلیوم	۱۰۰٪
۴۵	۷۱	Te	تلوریم	۱۲٪۹	۴۶	۷۲	Xe	زئون	۱۳٪۱
۴۶	۷۲	I	ید	۱۲٪۹	۴۷	۷۳	Ne	نوتون	۲۰٪۸
۴۷	۷۳	Kr	کربیتون	۸٪۰	۴۸	۷۴	F	فلوئور	۱۹٪۰
۴۸	۷۴	Br	برم	۷۹٪۰	۴۹	۷۵	O	اکسیژن	۱۶٪۰
۴۹	۷۵	Ar	آرگون	۳۹٪۵	۵۰	۷۶	P	فسفر	۲۰٪۷
۵۰	۷۶	Cl	کلر	۳۵٪۵	۵۱	۷۷	B	بور	۱۵٪۰
۵۱	۷۷	Si	سیلیسیم	۲۸٪۹	۵۲	۷۸	C	کربن	۱۱٪۱
۵۲	۷۸	Al	آلومینیم	۲۶٪۸	۵۳	۷۹	N	نیتروژن	۱۱٪۰
۵۳	۷۹	Zn	زنک	۲۰٪۰	۵۴	۸۰	O	اکسیژن	۱۶٪۰
۵۴	۸۰	Ga	گالیم	۱۷٪۲	۵۵	۸۱	F	فلوئور	۱۹٪۰
۵۵	۸۱	In	اندیمی	۱۱٪۰	۵۶	۸۲	Ar	آرگون	۳۹٪۵
۵۶	۸۲	Sn	فلان	۱۱٪۷	۵۷	۸۳	He	هلیوم	۱۰۰٪
۵۷	۸۳	Sb	انیشوان	۱۲٪۸	۵۸	۸۴	Xe	زئون	۱۳٪۱
۵۸	۸۴	Te	تلوریم	۱۲٪۹	۵۹	۸۵	Ne	نوتون	۲۰٪۸
۵۹	۸۵	I	ید	۱۲٪۹	۶۰	۸۶	F	فلوئور	۱۹٪۰
۶۰	۸۶	Kr	کربیتون	۸٪۰	۶۱	۸۷	O	اکسیژن	۱۶٪۰
۶۱	۸۷	Br	برم	۷۹٪۰	۶۲	۸۸	P	فسفر	۲۰٪۷
۶۲	۸۸	Ar	آرگون	۳۹٪۵	۶۳	۸۹	B	بور	۱۵٪۰
۶۳	۸۹	Cl	کلر	۳۵٪۵	۶۴	۹۰	C	کربن	۱۱٪۱
۶۴	۹۰	Si	سیلیسیم	۲۸٪۹	۶۵	۹۱	N	نیتروژن	۱۱٪۰
۶۵	۹۱	Al	آلومینیم	۲۶٪۸	۶۶	۹۲	O	اکسیژن	۱۶٪۰
۶۶	۹۲	Zn	زنک	۲۰٪۰	۶۷	۹۳	F	فلوئور	۱۹٪۰
۶۷	۹۳	Ga	گالیم	۱۷٪۲	۶۸	۹۴	Ar	آرگون	۳۹٪۵
۶۸	۹۴	In	اندیمی	۱۱٪۰	۶۹	۹۵	He	هلیوم	۱۰۰٪
۶۹	۹۵	Sn	فلان	۱۱٪۷	۷۰	۹۶	Xe	زئون	۱۳٪۱
۷۰	۹۶	Sb	انیشوان	۱۲٪۸	۷۱	۹۷	Ne	نوتون	۲۰٪۸
۷۱	۹۷	Te	تلوریم	۱۲٪۹	۷۲	۹۸	F	فلوئور	۱۹٪۰
۷۲	۹۸	I	ید	۱۲٪۹	۷۳	۹۹	O	اکسیژن	۱۶٪۰
۷۳	۹۹	Kr	کربیتون	۸٪۰	۷۴	۱۰۰	P	فسفر	۲۰٪۷

جدول تناوبی عناصر






**مثال:**

با توجه به شکل داده شده مشخص کنید:

الف) کدام هیدروکربن آسان‌تر جاری می‌شود؟ چرا؟

ب) هر یک از فرمول‌های زیر به کدام روغن نشان داده شده در شکل روابه‌رو تعلق دارد؟




**پاسخ:**

الف) شکل ۱ زیرا کربن کمتری دارد.

ب) فرمول ۱ مربوط به شکل ۱ - فرمول ۲ مربوط به شکل ۳


فرمول ۳ مربوط به شکل ۲ - فرمول ۴ مربوط به شکل ۴



### جداسازی اجزای تشکیل‌دهنده نفت خام

در شکل زیر دستگاه تقطیر ساده‌ای نشان داده است که برای جداسازی مخلوط دو مایع که نقطه جوش متغیری دارند، مثل آب و الک استفاده می‌شود (نقطه جوش آب  $10^{\circ}C$  و الک  $78^{\circ}C$  درجه سانتی‌گراد است).


در این دستگاه مایع‌ها براساس تفاوت در نقطه جوش از هم جدا می‌شوند یعنی با گرما دادن، مایعی که نقطه جوش پایین‌تری دارد زودتر بخار شده و از مخلوط جدا می‌شود سپس مولکول بخار شده با عبور از یک لوله سرد به مایع تبدیل می‌شود.



قطیر ساده برای جداسازی دو مایعی که اختلاف نقطه جوش آنها زیاد است به کار می‌رود.

### نکته

اگر مخلوطی از دو هیدروکربن مایع با فرمول  $C_6H_{14}$  (با نقطه جوش برابر  $68^{\circ}C$ ) و  $C_9H_{20}$  (با نقطه جوش برابر با  $151^{\circ}C$ ) در اختیار داشته باشیم می‌توانیم آن‌ها را با دستگاه تقطیر ساده جداسازی کنیم زیرا نقطه جوش آن‌ها به هم نزدیک نیست.



### نکته

اجزای تشکیل‌دهنده نفت خام نقطه جوش نزدیک به هم دارند. آن را با روش تقطیر جزء به جزء باید جداسازی کنند. این کار در دستگاهی پیچیده و بزرگ به نام برج تقطیر انجام می‌شود. در برج تقطیر نفت خام را گرما می‌دهند، در اثر گرما هیدروکربین‌ها تبخیر می‌شوند و در برج تقطیر بالا می‌روند و در قسته‌های مختلف از هم جدا می‌شوند.

**برشن نفتی:** از آنجاکه نقطه جوش برخی از اجزای سازنده نفت خام به یکدیگر بسیار نزدیک است نمی‌توان همه آن‌ها را به طور کامل از هم جدا کرد بلکه آن‌ها را به صورت مخلوطی از چند هیدروکربن که نقطه جوش نزدیک به هم دارند و برشن نفتی نامیده می‌شود از هم جدا می‌کنند.




**پاسخ:** در این حالت، مسافت طی شده نصف محیط دایره می‌باشد و لی جابه‌جایی برابر قطر دایره است، پس خواهیم داشت:

$$\text{مسافت طی شده} = \frac{\pi R}{2} = \frac{2 \times 3 \times 2}{2} = 6\text{m}$$

$$\text{جابه‌جایی } X = 2 + 2 = 4\text{m}$$

**مثال:** متحرکی مطابق شکل از نقطه A، ۳متر به سمت شرق و ۴ متر به طرف جنوب حرکت می‌کند. مسافت طی شده و جابه‌جایی این متحرک را حساب کنید.




$$\text{مسافت طی شده} = d = 3 + 4 = 7\text{m}$$

$$X = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5\text{m}$$

**پاسخ:**

### نکته


در مثلث قائم‌الزاویه داریم:



$$\begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 \\ b^2 &= a^2 - c^2 \\ c^2 &= a^2 - b^2 \end{aligned}$$

از این قاعده در مسائل مسافت طی شده و جابه‌جایی زیاد استفاده می‌شود.

منظور از حرکت دایره‌ای عمودی، یعنی فرض کنید یک چرخ بزرگ روی زمین ایستاده باشد و متحرکی داخل آن از نقطه A حرکت کند و به نقطه B برسد.




### نکته

در حرکت‌های قائم و یا دایره‌ای عمودی، جابه‌جایی، ارتفاع عمود می‌باشد و به شکل مسیر بستگی ندارد.

مثلاً وقتی از پله‌های اضطراری ساختمانی چند طبقه بالا می‌رویم و یا پیاده، پله‌های ساختمانی را طی می‌کنیم، مسافتی را طی کردہ‌ایم ولی جابه‌جایی آن زمانی است که با آسانسور (عمود) جابه‌جا می‌شویم.

**مثال:** متحرکی روی خط راست ۴ متر به طرف شرق حرکت می‌کند، سپس از آن جا ۳ متر روی خط راست به طرف جنوب حرکت می‌کند و از آن نقطه نیز ۴ متر روی خط راست به طرف غرب حرکت می‌کند. مسافت طی شده و جابه‌جایی متحرک را به دست آورید.



**پاسخ:**

$$\text{مسافت طی شده} = 4 + 3 + 4 = 11\text{m}$$

Jabeh-e-jaii برداری است که مبدأ را به مقصد وصل می‌کند، یعنی «AD»، پس متحرک ۳متر روی خط راست به طرف جنوب جابه‌جا شده است.



## نکته

۱) یکای شتاب  $\frac{N}{kg}$  یا  $\frac{m}{s^2}$  می‌باشد.



۲) با استفاده از قانون دوم نیوتون می‌توان فهمید یکای نیرو  $\frac{kg \cdot m}{s^2}$  نیز می‌باشد.



۳) جهت نیروی خالص وارد بر یک جسم همواره هم‌جهت با شتاب جسم است.



۴) جهت نیروی خالص وارد بر یک جسم لزوماً هم‌جهت با حرکت جسم نیست.




۵) اگر جسمی از حال سکون تحت تأثیر نیروی خالصی قرار گیرد جهت حرکتش در آغاز هم‌جهت با نیروی خالصی است که به آن وارد شده است.

### مثال:

الف) در شکل زیر شتاب را به دست آورید.


### پاسخ:



اطلاعات	راه حل
$F = 60\text{ N}$	$a = \frac{F}{m} \Rightarrow a = \frac{60}{20} = 3 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
$m = 20\text{ kg}$	
$a = ?$	

ب) در شکل زیر اگر شتاب  $3 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$  باشد جرم وزنه بار شده چه‌قدر است؟


### پاسخ:



اطلاعات	راه حل
$F = 60\text{ N}$	$a = \frac{F}{m} \Rightarrow 3 = \frac{60}{m} \Rightarrow m = 20\text{ kg}$
$m = ?$	
$a = 3 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$	

ج) در شکل زیر اگر شتاب  $4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$  باشد مقدار نیروی فرد را به دست آورید.

### پاسخ:



اطلاعات	راه حل
$F = x$	$a = \frac{F}{m} \Rightarrow 4 = \frac{F}{40} \Rightarrow F = 160\text{ N}$
$m = 40\text{ kg}$	
$a = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$	

### مثال:

جرم اتومبیلی ۲ تن است و در مدت  $7/5$  ثانیه سرعت خود را از صفر به  $15 \frac{\text{m}}{\text{s}}$  می‌رساند، بزرگی نیروی برآیند متوسط (نیروی خالص) وارد بر این اتومبیل چند نیوتون است؟





### مثال:

- نمونه‌هایی از فسیل نوعی خزنده قدیمی در قسمت‌هایی از دو قاره آفریقا و آمریکای جنوبی یافت شده است.
- فسیل‌هایی از سرخس‌های قدیمی (گانگاموبتریس) در این مناطق دیده شده است.

### ۳ اقسام سنگ‌ها و شباهت‌های ساختاری:

- با توجه به این فرض که قاره‌ها در گذشته همگی به هم متصل بوده‌اند، باید سنگ‌هایی که از گذشته در آن‌ها یافت شده است نیز از لحاظ سن و جنس مشابه باشند.

**مثال:** سنگ‌های شمال غرب آفریقا و شرق برزیل در آمریکای جنوبی دارای شباهت‌اند.

### ۴ شباهت آب و هوای:



- قسمت‌هایی از قاره‌های واقع در نیمکره جنوبی، امروزه در محدوده منطقه استوا قرار دارند و در آن جا آثار یخچالی مشاهده می‌شود. وگنر از این موضوع نتیجه گرفت که همه آن مناطق در گذشته در محل قطب و کنار هم قرار داشته‌اند.

### نظریه زمین‌ساخت ورقه‌ای


- این نظریه، بیان کامل‌تر و جامع‌تر از نظریه جابجایی قاره‌ها و نظریه گسترش بستر اقیانوس‌ها است.
- بر اساس نظریه زمین‌ساخت ورقه‌ای، سنگ‌کره (لیتوسفر) خارجی و جامد از ۷ ورقه کوچک‌تر تشکیل شده است.
- از بین ۷ ورقه، ورقه اقیانوس آرام بزرگ‌ترین ورقه است.
- روان بودن نسبی سستکره (استنوسفر) امکان حرکت ورقه‌های سنگ‌کره جامد (لیتوسفر) را فراهم می‌کند.

### ضخامت ورقه‌ها در نقاط مختلف متفاوت است:

- ۱ ضخامت ورقه‌های اقیانوسی اندک است. ۸-۱۲ کیلومتر در محل حوضه‌های اقیانوسی
- ۲ ضخامت ورقه‌های قاره‌ای بسیار بیش‌تر از اقیانوسی است. ۵۰-۱۰۰ کیلومتر و حتی بیش‌تر در زیر قاره‌ها

### جریان‌های همرفتی

دانشمندان علت حرکت ورقه‌های سنگ‌کره را در جریان‌های همرفتی سستکره می‌دانند. پدیده همرفتی داخل سستکره مانند ظرف آب در حال گرم شدن است. در این حالت آب گرم از وسط ظرف بالا می‌آید و در سطح ظرف پخش می‌شود و پس از خنک شدن و سنگین شدن از کناره‌ها پایین می‌رود. در قسمت پایین سستکره دما زیادتر است. بنابراین چگالی مواد نسبت به قسمت‌های بالایی کمتر است. به دلیل اختلاف دما و چگالی بین قسمت‌های بالا و پایین سستکره پدیده همرفتی ایجاد می‌شود. در اثر این پدیده مواد خمیری به سمت بالا حرکت می‌کنند و از محل شکاف بین ورقه‌ها به سطح زمین می‌رسند و سبب جابه‌جایی و حرکت ورقه‌ها می‌شوند سرعت و جهت حرکت ورقه‌ها متفاوت است. ورقه‌های قاره‌ای مانند ورقه آمریکای شمالی با سرعت کمتر و ورقه‌های اقیانوسی مانند ورقه اقیانوس آرام با سرعت بیشتر حرکت می‌کنند.



# فصل هفتم

## آثاری از گذشته زمین

همان طور که از سال‌های قبل می‌دانید، از انباسته شدن رسوباتی که با آب، باد یا یخچال‌های طبیعی به محیط‌های رسوی برده و به صورت لایه‌لایه تنهشین می‌شوند، سنگ‌های رسوی به وجود می‌آیند. هم‌چنین می‌دانید این سنگ‌ها در سطح زمین لایه نازکی را تشکیل می‌دهند؛ اما فراوان‌تر از سنگ‌های دیگرند. این سنگ‌های لایه‌لایه، حاوی بقایای قدیمی موجودات زنده (فسیل‌ها) هستند.

### سنگ‌های رسوی


- سنگ‌های رسوی از تنهشین شدن رسوبات به صورت لایه‌لایه در دریاها و اقیانوس‌ها تشکیل می‌شوند، این سنگ‌ها ممکن است فسیل داشته باشند.
- در سنگ‌های رسوی، لایه‌های زیرین قدیمی‌تر از لایه‌های بالایی هستند؛ اما اگر سنگ‌ها چین خورده باشند، نمی‌توانیم لایه‌های بالا را جدیدتر و لایه‌های پایین را قدیمی‌تر در نظر بگیریم؛ بنابراین برای تعیین وضعیت گذشته آن‌ها، باید به دنبال شواهد دیگری باشیم.
- سنگ‌های رسوی منابعی برای نفت، زغال‌سنگ، گاز طبیعی، معادن آهن، آلومینیوم و مصالح ساختمانی‌اند؛ بنابراین در زندگی ما تأثیر زیادی دارند. این سنگ‌ها شواهد مربوط به تاریخچه گذشته زمین (فسیل‌ها) را نیز دربردارند و نشان می‌دهند که وضع دریاها، خشکی‌ها، رشته‌کوه‌ها و ... در گذشته چگونه بوده است.

### نکته

مهم‌ترین ویژگی سنگ‌های رسوی، لایه‌لایه بودن و داشتن فسیل در آن‌ها است. همه سنگ‌های رسوی حتماً لایه‌لایه هستند، اما همه آن‌ها فسیل ندارند!



زغال‌سنگ نوعی سنگ رسوی است که بقایای گیاهان فراوانی دارد. مواد گیاهی معمولاً روی زمین به سرعت تجزیه می‌شوند اما در محیطی که اکسیژن کم است، آن مواد تا زمان مدفون شدن باقی می‌مانند و با فشار لایه‌های بالایی و از دست دادن آب و افزوده شدن کربن به فسیل (زغال‌سنگ) گیاهی تبدیل می‌شوند.





## ۴ هاگ‌داران مثل پلاسمودیوم



### فواید اقتصادی جلبک‌ها:

۱ تثبیت کننده کربن در زمین (به وسیله جلبک‌های سطح اقیانوس‌ها)

#### نکته

این جلبک‌ها نیمی از اکسیژن آزاد شده توسط گیاهان را ایجاد می‌کنند که تولید اولیه پایه همه زنجیره‌های غذایی دریایی است.

۲ منبع غذایی مستقیم برای انسان

۳ استفاده به عنوان کود در زمین‌های ساحلی

### بیشتر بدانیم

جلبک‌های سبز تکسلولی، مانند «کلرلا» به آسانی کاشته می‌شوند از آن‌ها به عنوان منبع پروتئین تکسلولی برای مصرف انسان و حیوانات استفاده می‌شود.



۴ جلبک‌های سبز، اکسیژن لازم را برای باکتری‌هایی غیر هوایی که مواد زاید را در لجن‌ها می‌شکنند فراهم می‌کنند.

#### نکته

مشتقات اسیدآلزینیک که در دیواره سلولی بسیاری از جلبک‌های قهوه‌ای یافت می‌شود، موادی غیرسمی هستند که به آسانی می‌توان از آن‌ها در تهیه ژل‌ها و سفت شدن محصولات نام برده شده استفاده کرد.

۴ تهیه براق‌کننده‌ها

۳ تهیه کرم دست

۲ تهیه ژل

۱ تهیه ژل

۷ تهیه شیرینی‌ها

۶ تهیه لعاب سرامیکی

۵ تهیه رنگ

### ضررهاي جلبك‌ها:

تعدادی از جلبک‌های اضافی نیز ممکن است بر اثر آلودگی آب، کودها و سایر مواد شیمیایی در آب رشد کنند. رشد این جلبک‌ها بر سطح آب موجب ایجاد بو و مزء ناخوشایند در آن می‌شود. همچنین با تمام شدن اکسیژن موجود در آب در اثر رشد این جلبک‌ها، ماهی‌ها نیز از بین می‌روند.

#### قارچ‌ها

لکه‌های زرد روی برگ و سیاه شدن خوش‌های گندم نشان‌دهنده وجود قارچ در این گیاهان است. این قارچ‌ها آفت‌گیاه هستند (مضر می‌باشند).




# فصل سیزدهم

## جانوران پیش از

### گوناگونی جانوران

جانوران نسبت به دیگر موجودات زنده گوناگونی بیشتری دارند. دانشمندان، سلسله جانوران را در دو گروه اصلی بی‌مهره‌ها و مهره‌داران رده‌بندی می‌کنند.



دانشمندان تا به حال نزدیک به دو میلیون گونه جانوری را شناسایی کرده‌اند که حدود ۹۸٪ آن‌ها بی‌مهره و حدود ۲٪ آن‌ها مهره دارند. همه ساله انواع جدیدی از جانوران نیز کشف می‌شوند. جدول زیر تنوع گونه‌های مختلف جانوران را نشان می‌دهد.

مهره‌داران	بی‌مهره‌ها						
	خارپوستان	بندپایان	نرم‌تنان	کرم‌ها	مرجان‌ها	اسفنج‌ها	گروه
۵۰۰۰۰	۶۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰	۱۱۵۰۰	۹۵۰۰	۱۰۰۰۰	تعداد گونه‌ها

همه جانوران پر سلولی هستند و از سلول‌های یوکاریوت (دارای پوسته (غشاء)، هسته، سیتوپلاسم و اندامک‌ها) تشکیل شده‌اند و همچنین می‌دانیم سلول‌های جانوری دیواره سلولی ندارند. در اکثر جانوران سازمان‌بندی سلولی تا حد تشکیل اندام و دستگاه‌های مختلف وجود دارد. هر دستگاه در بدن با اهداف خاصی به وجود آمده است. در بیشتر جانوران اسکلت خارجی یا داخلی وجود دارد که ضمن اتصال ماهیچه‌ها به آن از بافت‌های بدن حفاظت می‌کنند.




بندپایان بزرگترین گروه جانوران را در روی زمین تشکیل می‌دهند که تقریباً در همه زیستگاه‌های روی زمین یافت می‌شوند.

**تذکر:** بندپایان را براساس زائدات بدن، به ویژه تعداد پاهای حرکتی در چهار گروه طبقه‌بندی می‌کنند:

مثال	تعداد پای حرکتی	نام گروه
ملخ، پروانه، زنبور، پشه	۶	حشرات
عنکبوت، رتیل، عقرب، کنه	۸	عنکبوتیان
خرچنگ، میگو، خرخاکی	۱۰	سختپوستان
هزارپا، صدپا	بیشتر از ۱۰ جفت	هزارپایان

قسمت‌های مختلف بدن ملخ:



### حشرات

حشرات گروهی از بندپایان هستند که از بقیه فراوان‌تر می‌باشند.

زیان‌های حشرات عبارتند از:

۱ از بین بردن محصولات کشاورزی توسط ملخ و کرم‌ها (آفت)

۲ خوردیدن چوب و کاغذ توسط موریانه‌ها

۳ مزاحمت‌های مگس و پشه برای انسان‌ها و حیوانات

۴ انتشار عوامل بیماری‌زا (مگس تسه تسه و پشه آنوفل)

اما فواید حشرات بیش‌تر از زیان‌های آن‌ها است. مثل:

۱ در تولید میوه، سبزی‌ها، محصولات کشاورزی (گردافشانی کردن)

۲ تولید ابریشم، موم، عسل (عنکبوت و زنبور عسل)

۳ غذای ماهی‌های آب شیرین هستند (تجذیه ماهی از حشرات و لارو آن‌ها)

۴ استفاده از آن‌ها در تحقیقات علمی و آزمایشگاهی به خصوص زنتیک

۵ تخریب لاشه جانوران مرده

۶ بندپایان جانوران روی زمین را تشکیل می‌دهند. شما با بسیاری از گروه‌های آن‌ها از قبیل حشرات، عنکبوت‌ها، عقرب‌ها، سختپوستان، کنه‌ها و هزارپایان آشنا هستید. به علاوه فسیل گروه‌های بسیاری از آن‌ها از دوره‌های قبل باقی‌مانده است.

کوچک‌ترین بندپایان کنه مولد جَرَب (با حدود یک دهم میلی‌متر) و بزرگ‌ترین آن‌ها خرچنگ ژاپنی (با حدود ۴ متر طول) است. به طور کلی بندپایان

جانوران کوچکی هستند و جز محدودی از آن‌ها طول بدن بیشترشان کمتر از شصت سانتی‌متر است.

بندپایان جانورانی پر متحرک و پرانرژی هستند. تنوع چشم‌گیری دارند و در همه نقاط کره زمین از استوا تا قطبین در اعماق زمین در ارتفاعات در آب در هوا یافت می‌شوند.

بندپایان جانوران موققی هستند زیرا برای زیستن در هر اقلیم و مکان سازگاری لازم را پیدا کرده‌اند.



این گروه برای ما انسان‌ها بسیار مفید هستند. برای مثال با شرکت در گردافشانی گیاهان و نیز به عنوان غذا در زندگی ما مفیدند اما بسیاری از آن‌ها

هم آفات گیاهان، ناقل بیماری‌ها و یا عامل بیماری‌ها هستند.

# سوالات تشریحی

## سیر تا پیاز

- ۱۹۰ فصل اول: مواد و نقش آنها در زندگی
- ۱۹۴ فصل دوم: رفتار اتم‌ها با یکدیگر
- ۱۹۹ فصل سوم: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
- ۲۰۵ فصل چهارم: حرکت چیست
- ۲۰۹ فصل پنجم: نیرو
- ۲۱۴ فصل ششم: زمین ساخت ورقه‌ای
- ۲۱۹ فصل هفتم: آثاری از گذشته زمین
- ۲۲۳ فصل هشتم: فشار و آثار آن
- ۲۲۸ فصل نهم: ماشین‌ها
- ۲۳۴ فصل دهم: نگاهی به فضا
- ۲۳۸ فصل یازدهم: گوناگونی جانداران
- ۲۴۳ فصل دوازدهم: دنیای گیاهان
- ۲۴۷ فصل سیزدهم: جانوران بی‌مهره
- ۲۵۲ فصل چهاردهم: جانوران مهره‌دار
- ۲۵۷ فصل پانزدهم: با هم زیستن



Modelo atómico para el nitrógeno ( ${}_7N$ ) y el azufre ( ${}_16S$ ) en forma de óxido de azufre ( $O_2$ ).

Modelo atómico para el nitrógeno ( ${}_7N$ ).

Modelo atómico para el azufre ( ${}_16S$ ).

Modelo atómico para el oxígeno ( ${}_8O$ ).

7 مدل اتمی بور (لایه‌ای) را برای اتم‌های زیر رسم کنید.

8 مدل اتمی بور برای دو اتم اکسیژن ( $O_2$ ) و ( $S_8$ ) به صورت رو به رو آورده شده است.

تفاوت و شباهت این دو مدل اتمی را بنویسید.

9 در هر یک از تصاویر زیر، چه عنصری کاربرد دارد؟



(ب)



(الف)

10 کدام یک از اتم‌های زیر، خواص مشابهی دارند؟ چرا؟

${}_{12}Mg$  (د)

${}^4Be$  (ج)

${}_{17}Cl$  (ب)

${}^9F$  (الف)

11 نئون ( ${}^1Ne$ ) گازی است که میل به واکنش با هیچ اتم دیگری را ندارد و ترکیب آن در طبیعت یافت نمی‌شود. کدام یک از عنصرهای زیر ویژگی‌هایی شبیه عنصر نئون دارند؟ چرا؟

${}_{17}Cl$  (ب)

${}^{18}Ar$  (الف)

12 با توجه به شکل رو به رو، به سوالات زیر پاسخ دهید.

(الف) شکل، چه ماده‌ای را نشان می‌دهد؟

(ب) کاربرد این ماده چیست؟

13 دو پلیمر طبیعی و دو کاربرد پلیمر مصنوعی را نام ببرید.

14 گزینه درست را انتخاب کنید.

14 کدام یک از موارد زیر نافلز است؟

(۱) مس (۲)

(۳) گوگرد (۴)

15 کدام یک از موارد زیر فلز است؟

(۱) طلا (۲)

(۳) برم (۴)

16 کدام یک اولین فلز استخراج شده از سنگ معدن است؟

(۱) آهن (۲)

(۳) آلمینیوم (۴)

17 مفرغ از چه عناصری تشکیل شده است؟

(۱) قلع + مس (۲)

(۳) کربن + قلع (۴)

18 کدام یک از موارد زیر سریع‌تر با اکسیژن ترکیب می‌شود؟

(۱) آهن (۲)

(۳) مس (۴)

19 کدام یک از موارد زیر، مولکول ۲ اتمی است؟

(۱) گوگرد (۲)

(۳) اکسیژن (۴)


20 برای مدل اتمی رو به رو، کدام مورد صحیح است؟

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)



15. Ne (۱)

11. Na (۳)

12. Mg (۲)

13. Al (۱)




۱۸ این موشک می‌تواند سرعت خود را در مدت ۵ ثانیه از  $10 \frac{m}{s}$  به  $20 \frac{m}{s}$  برساند.

(الف) شتاب آن را به دست آورید.

(ب) نوع شتاب آن چیست؟

(ج) تندی این موشک چه قدر است؟ مسافت طی شده ۵ km است.

۱۹ شکل زیر هواپیمایی را روی عرشه یک ناو هواپیمابر نشان می‌دهد که با شتاب  $4 \frac{m}{s^2}$  به حرکت درمی‌آید تا پس از مدت کوتاهی به سرعت برخاستن از روی عرشه کشته برسد.



(الف) مدت زمانی که طول می‌کشد تا سرعت هواپیما از صفر به  $70 \frac{m}{s}$  برسد چه قدر است؟

(ب) با توجه به تعریف سرعت متوسط، جابه جایی هواپیما را روی عرشه ناو به دست آورید.

۲۰ موتورسواری در مسیر مستقیم از حال سکون شروع به حرکت می‌کند و پس از ۶ ثانیه، سرعت آن به  $54 \text{ کیلومتر بر ساعت}$  می‌رسد.

(الف) شتاب موتورسوار را به دست آورید.

(ب) نوع شتاب را مشخص کنید.

(ج) موتورسوار در این مدت چند کیلومتر جابه جا شده است؟



### گزینه درست را انتخاب کنید.

۲۱ در کدام یک از حرکت‌های زیر اندازه تندی متوسط با سرعت متوسط برابر است؟ (همانگ استان کرمان)

۱) وقتی رضا به طور یکنواخت دور یک میدان را یک دور راه می‌رود.

۲) وقتی حسین از روی قطر میدان از یک طرف به طرف دیگر راه می‌رود.

۳) وقتی سجاد نصف میدان را یکنواخت دور آن راه می‌رود.

۴) وقتی مهدی با ماشین با سرعت ثابت، یک دور، دور میدان می‌چرخد.

۲۲ اگر عقربه تندی سنج خودرویی در حرکت مستقیم (شرق به غرب) با گذشت زمان عدد ثابتی را نشان دهد به این معنی است که (همانگ استان فارس)

۱) شتاب آن خودرو صفر است.

۳) شتاب آن در حال تغییر است.

۴) سرعت لحظه‌ای آن صفر است.

۲۳ متحرکی با تندی  $72 \text{ کیلومتر بر ساعت}$  چه مسافتی را در مدت زمان یک ثانیه طی می‌کند؟ (همانگ استان قزوین)

۱)  $72 \text{ متر}$       ۲)  $259 \text{ متر}$       ۳)  $20 \text{ متر}$       ۴)  $2 \text{ متر}$

۲۴ راننده‌ای در مسیر مستقیم سرعت خودرویی را در مدت ۵ ثانیه از  $40 \text{ m/s}$  به  $70 \text{ m/s}$  (به سمت شمال) می‌رساند شتاب متوسط این خودرو  $\text{چند } \text{s}^2$  به سمت شمال است؟ (همانگ استان بوشهر)

۱)  $150 \text{ m/s}^2$       ۲)  $22 \text{ m/s}^2$       ۳)  $8 \text{ m/s}^2$       ۴)  $6 \text{ m/s}^2$

۲۵ کدام یک از حرکت‌های زیر از نوع شتابدار با شتاب ثابت می‌باشد؟

۱) مورچه‌ای با سرعت ثابت طول یک اتاق را طی می‌کند.

۲) اتومبیلی با سرعت ثابت  $20 \text{ m/s}$  یک میدان را دور می‌زند.

۳) دوچرخه‌سواری با تندی لحظه‌ای یکسانی مسیر  $20 \text{ متری}$  مستقیمی را طی می‌کند.

۴) هیچ کدام



## فصل هفتم: آثاری از گذشته زمین

به سؤالات زیر پاسخ کامل دهید.

۱ امکان فسیل شدن کدام یک از جانداران زیر بیشتر است؟ علت را بنویسید.

(الف) ماهی که در دریا زندگی می‌کند.

(ب) پرندۀای که در ساحل دریا زندگی می‌کند.

۲ بهترین مکان برای تشکیل فسیل کجاست؟ دلیل خود را بیان کنید.

۳ در کدام سنگ‌های زیر، احتمال وجود فسیل وجود دارد؟ چرا؟




(ب)



(الف)

۴ به نظر شما شرایط برای تشکیل فسیل در دریاها مناسب‌تر است یا بیابان‌ها؟ چرا؟

۵ بدن حشرات قسمت‌های سخت ندارد. آیا می‌توان از آن‌ها فسیل یافت؟ فسیل شدن احتمالی بدن یک حشره چگونه خواهد بود؟




۶ در قسمت‌های سبیری واقع در روسیه، اجسام ماموت‌هایی پیدا شده که نسل آن‌ها سال‌ها است که منقرض شده است. جالب این است که گوشت و استخوان‌ها و حتی موهای آن‌ها نیز سالم مانده است. با توجه به شکل به سؤالات پاسخ دهید.

(الف) آیا می‌توان به این اجسام نام فسیل داد؟

(ب) این اجسام چگونه سالم مانده‌اند؟

۷ چگونگی تشکیل فسیل‌هایی مانند شکل رویه‌رو را شرح دهید:



۸ یک گروه از زمین‌شناسان در اکتشافات خود رُد پای نوعی جاندار بسیار قدیمی که الان وجود ندارد را در لابه لای سنگ‌های رسوبی مطابق شکل پیدا کرده‌اند. به نظر شما به این رُد پاهای می‌توان فسیل گفت؟ چرا؟

۹ «یکی از راه‌های تشکیل فسیل، ایجاد قالب خارجی جسم است.» با توجه به شکل زیر، چگونگی این نوع فسیل شدن را شرح دهید.

۱۰ همانطور که می‌دانید، سنگ گچ و سنگ نمک را جزو سنگ‌های تبخیری می‌گویند. این سنگ‌ها در چه نوع آب و هوایی تشکیل می‌شوند؟


۱۱ معادن سنگ نمک و سنگ گچ موجود در استان سمنان که در گذشته تشکیل شده‌اند، بیانگر چه نوع آب و هوایی می‌باشند؟

۱۲ (الف) فسیل راهنمای چیست؟

(ب) فسیل راهنمای باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

(ج) از فسیل راهنمای چه استفاده‌هایی می‌توان کرد؟ (۴ مورد)





(همانگ استان گلستان)

۲۵ کدام سطح شیب دار برای جایه جایی جعبه ۴۰۰ نیوتنی بهتر عمل می کند؟ (نیروی کمتری لازم است).

- ۱) (۲) ۲  
۲) (۴) ۴  
۳) (۳)  
۴) (۱)

۲۶ اگر مزیت مکانیکی قرقه ای ۳ باشد مفهوم این است که

- ۱) جایه جایی نیروی مقاوم ۳ برابر است.  
۲) نیروی محرك ۳ برابر است.  
۳) نیروی مقاوم  $\frac{1}{3}$  برابر است.

۲۷ به کمک یک قرقه متحرک جسمی به وزن ۱۲۰ نیوتن را با چه نیروی محركی می توان جایه جا کرد؟ (همانگ استان سیستان و بلوچستان)

- ۱) (۴) ۱۲۰  
۲) (۲) ۶۰  
۳) (۳)  
۴) (۱) ۲۴۰

**جاهای خالی را با استفاده از کلمه های مناسب پر کنید.**

۲۸ همه آن چیزهایی که انجام می دهیم تا ماشین کار کند را می گویند.

۲۹ کار نیروی ماهیچه ای در دوچرخه به انرژی تبدیل می شود.

۳۰ اثر چرخانندگی یک نیرو را می گویند.

۳۱ مزیت مکانیکی در حالت تعادل نسبت اندازه نیروی مقاوم به تعريف می شود.

۳۲ اگر بازوی مقاوم بزرگ تر از بازوی محرك باشد، ماشین با افزایش به ما کمک می کند.

۳۳ در خودروها چرخ دندها با تغییر سرعت چرخشی سبب تغییر خودرو می شوند.

۳۴ برای باز کردن مهره محکم یک پیچ هر چه طول دسته آچار باشد گشتاور نیرو بیش تر می شود.

(همانگ شهرستان های استان تهران)

۳۵ مزیت مکانیک فرغون از یک است و با افزایش نیرو به ما کمک می کند.

۳۶ سطح شیب دار به ما کمک می کند تا با نیروی کمتر اما در طولانی تر جسم سنگین را به سمت بالا حرکت دهیم. (همانگ استان بوشهر)

**درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت های زیر را مشخص کنید.**

۳۷ فک پایین انسان (متحرک) اهرم نوع دوم است.

۳۸ در گشتاور نیرو فقط فاصله نیرو تا محور چرخش مهم است.

۳۹ مزیت مکانیکی اهرم نوع دوم همیشه بیش تر از یک است.

۴۰ مزیت مکانیکی قرقه ثابت همیشه برابر یک است.

۴۱ طبق اصل کار، کار داده شده برابر کارگرفته شده است.

۴۲ پیچ نوعی سطح شیب دار مارپیچ است.

۴۳ مزیت مکانیکی قرقه متحرک برابر یک است.

۴۴ اگر شعاع یک قرقه متحرک ۳ برابر شود با افزایش نیروی بیشتری به ما کمک خواهد کرد.

۴۵ وقتی از سطح شیب دار استفاده می کنیم نیروی محرك افزایش می یابد.

**سؤالات تكميلي**

۴۶ یک پیچ گوشی برای دو منظور استفاده شده است.



(۲)

محکم کردن پیچ



(۱)

باز کردن در قوطی رنگ

(الف) در هر مورد چگونه به ما کمک می کند؟

(ب) در هر مورد پیچ گوشی نقش کدامیک از ماشین های ساده را ایفا می کند؟



۱۶ اگر جانداران زیر را طبق نظر ارسسطو طبقه‌بندی کنیم، کدام طبقه‌بندی درست است؟

**خرگوش - مورچه - ماهی - دلفین - مگس - خفاش**

۲) خرگوش - دلفین - خفاش و ماهی - مورچه و مگس

۴) دلفین - خفاش و خرگوش - مگس و مورچه - ماهی

۱) خرگوش - خفاش و مورچه - مگس و ماهی - دلفین

۳) خرگوش - مورچه و ماهی - دلفین و مگس - خفاش

۱۷ کفش‌دوزک جزء کدام گروه‌بندی جانوران قرار می‌گیرد؟

۴) باکتری‌ها

۳) جانوران

۲) آغازیان

۱) فارج‌ها

۱۸ هنگام طبقه‌بندی اشیاء یا موجودات زنده:

۱) بایستی حداقل یک ویژگی مشترک داشته باشند.

۲) لازم است یک ویژگی مشترک داشته باشند اما ضروری نیست.

۳) بایستی چند ویژگی مشترک داشته باشند.

۴) اشیاء یا موجودات نباید تفاوتی باهم داشته باشند.

۱۹ کلیدهای دو راهی (بله و خیر) بر چه اساسی طراحی می‌شوند؟

۲) ویژگی‌های ظاهری

۴) براساس نوع جایگاه جاندار

۱) ویژگی‌های مشترک

۳) ویژگی متقابل مثل داشتن یا نداشتن یک صفت

۲۰ تفاوت مخمرها و باکتری‌ها در چیست؟

۱) تعداد سلول‌ها

۲۱ کدام جاندار زیر شرایط سخت را بهتر تحمل می‌کند؟

۱) آغازیان

۲۲ زخم لای انگشتان معمولاً به چه علت ایجاد می‌شود؟

۱) فارج‌ها

۴) تنفس کردن

۳) نوع سیتوپلاسم

۲) نوع هسته

۴) فارج‌ها

۳) باکتری‌ها

۲) ویروس‌ها

۴) آمیبها

۳) آغازیان

۲) مخمرها

۴) جلبک‌های سبز

۳) مخمر

۲) ویروس

۱) فارج

جاهای خالی را با استفاده از کلمه‌های مناسب پر کنید.

۲۴ به اجتماع میکروب‌ها ..... می‌گویند.

۲۵ وقتی ماده وراثتی در پوشش قرار داده نشده باشد و هسته نیز نداشته باشد آن را ..... می‌گویند.

۲۶ باکتری‌های میله‌ای شکل را ..... می‌نامند.

۲۷ بعضی از آغازیان پوسته‌هایی از جنس ..... دارند.

۲۸ جلبک‌ها در سلسله ..... قرار دارند.

۲۹ در طبقه‌بندی جانداران از بالا به پایین شbahat‌ها ..... می‌شود.

۳۰ باکتری‌ها به دلیل داشتن ..... به گیاهان شبیه هستند.

۳۱ در طبقه‌بندی جانداران به ۵ سلسله گروه، ..... دارای تنوع بیشتری است.


درست یا نادرست بودن هر یک از عبارت‌های زیر را مشخص کنید.

۳۲ از گروه‌های بزرگ‌تر به کوچک‌تر شbahat افراد کم‌تر می‌شود.

۳۳ گیاهان از گروه پروکاریوت‌ها (پیش‌هسته‌ای) هستند.

۳۴ باکتری‌ها را براساس شکل به ۳ گروه عمده تقسیم می‌کنند.

۳۵ مخمرها به روش جوانهدزدن زیاد می‌شوند.




الف) شماره‌های مشخص شده در شکل روبه‌رو را نام‌گذاری کنید. (۱۱)

ب) از تولیدکننده به آخرین مصرف‌کننده تعداد جانوران و جنده آن‌ها چه تغییری می‌کند؟

۱۲) نقش تجزیه‌کنندگان در بوم سازگان چیست؟

۱۳) نقشه مفهومی زیر را کامل کنید.



۱۴) هریک از شکل‌های زیر چه نوع همزیستی را نشان می‌دهد؟



(ج)



(ب)




(الف)

۱۵) الف) تنوع زیستی چیست؟


ب) تنوع زیستی چه اهمیتی دارد؟

۱۶) نمودار زیر رابطه بین جمعیت یک شکار و شکارچی را در یک منطقه نشان می‌دهد آن را تفسیر کنید. (هماهنگ استان خراسان رضوی)



۱۷) امروزه در بعضی از خوراکی‌ها مثل ماست و پنیر باکتری‌های مفید اضافه شده با توجه به نمودارهای زیر این خوراکی‌ها چه نقشی

در سلامتی انسان دارند؟ (هماهنگ استان خراسان رضوی)





- ۲۱** کدام ویژگی مربوط به وزغ است؟
- (۱) بدنی کشیده دارد.  
 (۲) پوستی خشک و زبر دارد.  
 (۳) پوستی صاف و لغزنه دارد.  
 (۴) بیشتر در آب زندگی می‌کند.
- ۲۲** کدام یک جزء گروه خزندگان نیست؟
- (۱) کرمها  
 (۲) مارها  
 (۳) سوسмарها  
 (۴) لاکپشتها
- ۲۳** کدام یک از جانداران زیر با تعذیه از حشرات جمعیت آنها را کنترل می‌کنند؟
- (۱) مارها  
 (۲) سوسмарها  
 (۳) لاکپشتها  
 (۴) گزینه‌های (۱) و (۲)
- ۲۴** کدام نوع از پرهای پرندگان استحکام بیشتری دارد؟
- (۱) کرکپر  
 (۲) شاهپر  
 (۳) پوشپر
- ۲۵** کدام پستاندار تخم‌گذار است؟
- (۱) پلاتی پوس  
 (۲) اکیدنه  
 (۳) کانگورو  
 (۴) گزینه‌های (۱) و (۲)
- ۲۶** اندامی که مواد غذایی و اکسیژن را از خون مادر می‌گیرد و به جنین می‌رساند نام دارد.
- ۲۷** وجود در پرندگان موجب شده تا کارایی شش‌ها در جذب اکسیژن بیشتر شود.
- ۲۸** غذای قورباغه بالغ بیشتر از است.
- ۲۹** بزرگ‌ترین (از نظر جثه) گروه مهره‌داران روی زمین هستند.
- ۳۰** در ماهی‌های دهان در سطح شکم قرار دارد.
- ۳۱** سمندرها در گروه دوزیستان قرار می‌گیرند.
- ۳۲** لاکپشت جانوری در خزندگان است.
- ۳۳** در پستانداران کیسه‌دار نوزاد به صورت نارس متولد می‌شود.
- ۳۴** به رگ‌های خونی بین جفت و جنین در پستانداران ناف می‌گویند.
- ۳۵** تمام پرندگان برای انسان‌ها مفید می‌باشند.
- ۳۶** لاکپشت‌ها دارای اسکلت خارجی هستند.
- ۳۷** پرندگان بر حسب شکل پاها و پرهایشان طبقه‌بندی می‌شوند.
- ۳۸** قورباغه که بالغ شد گوشتش خوار شده آبیش به شش تبدیل می‌شود.
- ۳۹** پلاتی پوس یک جاندار کیسه‌دار می‌باشد.

### جاهاي خالي را كامل.

- ۳۴** در پستانداران کیسه‌دار نوزاد به صورت نارس متولد می‌شود.
- ۳۵** به رگ‌های خونی بین جفت و جنین در پستانداران ناف می‌گویند.
- ۳۶** تمام پرندگان برای انسان‌ها مفید می‌باشند.
- ۳۷** لاکپشت‌ها دارای اسکلت خارجی هستند.
- ۳۸** پرندگان بر حسب شکل پاها و پرهایشان طبقه‌بندی می‌شوند.
- ۳۹** قورباغه که بالغ شد گوشتش خوار شده آبیش به شش تبدیل می‌شود.
- ۴۰** جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید.
- | پرندگان | خزندگان | دوزیستان | ماهی‌ها | ویژگی         |
|---------|---------|----------|---------|---------------|
|         |         |          |         | پوست پولکدار  |
|         |         |          |         | تنفس پوستی    |
|         | دارد    |          |         | شش            |
|         |         |          |         | آب‌شش         |
|         |         |          |         | اسکلت غضروفی  |
|         |         |          | ندارد   | تخم‌پوسته‌دار |

### سوالات تكميلي

پرندگان	خزندگان	دوزیستان	ماهی‌ها	ویژگی
				پوست پولکدار
				تنفس پوستی
	دارد			شش
				آب‌شش
				اسکلت غضروفی
			ندارد	تخم‌پوسته‌دار




۳ جانوران را در سه گروه طبقه‌بندی می‌کرد:

- (۱) آن‌هایی که در خشکی راه می‌روند.
- (۲) جانورانی که در آب شنا می‌کنند.
- (۳) آن‌هایی که در هوای پرواز می‌کنند.

۴ جانوران گل آفتابگردان گیاهان کفسدوزک آغازیان قارچ‌ها جلبک سبز باکتری‌ها باسیل

انسان	سطح رو به بندی
جانوران	فرمانرو
مهره‌داران	شاخه
پستانداران	رده
خستیان	راسته
انسان نمایها	تیره
انسان‌ها	سرده
بخرد	گونه

۵ در همه زبان‌های دنیا نام علمی اسب «اکوئوس کابالوس» است. بسیاری از موجودات زنده نام دیگری به جز نام لاتین ندارند. نام لاتین هر موجود زنده شامل دو قسمت است: ۱- نام سرده- ۲- نام گونه. نام سرده باید با حروف بزرگ نوشته شود اثنا نام گونه با حرف کوچک آغاز می‌شود. این روش نام‌گذاری هر موجود زنده روش دونامی نامیده می‌شود. روش دونامی یعنی که نام موجود زنده از دو قسمت تشکیل شده است.



۶ باکتری‌های داخل دهان با غذاهای باقی‌مانده لای دندان‌ها اسیدی ترشح می‌کنند که به مرور زمان مینای دندان را حل کرده و موجب پوسیدگی دندان می‌شود.

۷- تولید اکسیژن ۲- غذای جانوران آبزی مانند ماهی‌ها ۳- ساختن مواد بهداشتی ۴- ساختن مکمل‌های غذایی به ویژه ویتامین‌ها

۸ هرچه سرعت حرکت سیاره کمتر می‌شود، طول سال آن سیاره بیش‌تر می‌شود.

۹ زحل، زیرا چگالی آن ( $\frac{\text{gr}}{\text{cm}^3}$ ) از چگالی آب ( $\frac{\text{gr}}{\text{cm}^3}$ ) کمتر است.

۱۰ عطارد، دمای شب آن  $18^{\circ}\text{C}$  - و دمای روز آن  $45^{\circ}\text{C}$  می‌رسد.


۱۱ گرمای خورشید به راحتی به سطح آن وارد می‌شود گرمای سطح آن نیز به راحتی از آن خارج می‌شود.

۱۲ خیر، به علت ۱- دمای بسیار بالای آن - ۲- اتمسفر آن بسیار غلیظ است. ۳- فاصله آن نسبت به زمین از خورشید بیش‌تر است.

۱۳ زمین به خورشید نزدیک‌تر است، زیرا سیارات داخلی که به خورشید نزدیک‌تر هستند، اتمسفر رقیق دارند، به جز عطارد که اتمسفر ندارد و سیارات خارجی که چون از خورشید دورتر هستند، اتمسفر غلیظ دارند.

۱۴ وجود اتمسفر غلیظ از گاز  $\text{CO}_2$ ، این گاز در سطح این سیاره اثر گلخانه‌ای داشته و مثل پتو عمل می‌کند. گرمای خورشید به سطح آن وارد می‌شود، اما نمی‌تواند از آن خارج شود و در سطح آن محبوس می‌ماند.


۱۵ رمز جدول: قنطورس



## فصل یازدهم: گوناگونی جانداران

۱ (الف) مجموعه‌ای از پرسش‌ها که براساس ویژگی‌های جانداران تهیه شده و به کمک آن‌ها می‌توان نام جانداران را پیدا کرد.

۲ (ب) یکی از راههایی که زیست‌شناسان برای شناسایی جانداران استفاده می‌کنند استفاده از کلیدهای شناسایی است.



۸ باکتری‌های داخل دهان با غذاهای باقی‌مانده لای دندان‌ها اسیدی ترشح می‌کنند که به مرور زمان مینای دندان را حل کرده و موجب پوسیدگی دندان می‌شود.

۹- تولید اکسیژن ۲- غذای جانوران آبزی مانند ماهی‌ها ۳- ساختن مواد بهداشتی ۴- ساختن مکمل‌های غذایی به ویژه ویتامین‌ها

۱۰ عطارد، دمای شب آن  $18^{\circ}\text{C}$  - و دمای روز آن  $45^{\circ}\text{C}$  می‌رسد.

۱۱ گرمای خورشید به راحتی به سطح آن وارد می‌شود گرمای سطح آن نیز به راحتی از آن خارج می‌شود.

۱۲ خیر، به علت ۱- دمای بسیار بالای آن - ۲- اتمسفر آن بسیار غلیظ است. ۳- فاصله آن نسبت به زمین از خورشید بیش‌تر است.

۱۳ زمین به خورشید نزدیک‌تر است، زیرا سیارات داخلی که به خورشید نزدیک‌تر هستند، اتمسفر رقیق دارند، به جز عطارد که اتمسفر ندارد و سیارات خارجی که چون از خورشید دورتر هستند، اتمسفر غلیظ دارند.

۱۴ وجود اتمسفر غلیظ از گاز  $\text{CO}_2$ ، این گاز در سطح این سیاره اثر گلخانه‌ای داشته و مثل پتو عمل می‌کند. گرمای خورشید به سطح آن وارد می‌شود، اما نمی‌تواند از آن خارج شود و در سطح آن محبوس می‌ماند.

۱۵ رمز جدول: قنطورس

نیرو	تغییر جهت	افزایش مسافت و سرعت اثر نیرو	افزایش نیرو	نوع اهرم	
✓	✓			نوع اول حالت سوم	
		✓		نوع دوم	
	✓			نوع سوم	
✓		✓		نوع اول حالت دوم	
	✓			نوع سوم	
		✓		نوع دوم	

۶

(۵۲) استحکام سد باید طوری باشد که بتواند فشار آب پشت آن را تحمل کند. فشار آب پشت سد فقط به عمق آب بستگی دارد نه به حجم آن، پس هرچه عمق آب بیشتر باشد فشاری که به سد وارد می‌کند بیشتر است. پس سد دز باید محکم‌تر ساخته شده باشد.

(۵۳) هوای داخل دو کره خالی شده و فشار هوای بیرون مانع جدا شدن کره‌ها از یکدیگر می‌شود.

(۵۴) درست است، زیرا در ارتفاع بالا فشار هوای کم است (هرچه به طرف بالا برویم فشار هوای کمتر می‌شود) فشار داخل هواییما بیشتر از بیرون است پس افراد و وسایل به طرف بیرون کشیده می‌شوند. می‌توانیم این موضوع را براساس اصل برنولی بررسی کنیم وقتی هواییما با سرعت در حال حرکت است سرعت حرکت باد از طرف آن زیاد شده پس فشار هوای کم می‌شود و فشار داخل نسبت به بیرون بیشتر شده و پنجره‌ها به طرف بیرون می‌شکند.

### فصل نهم: مашین‌ها

(۷) (الف) قرقره ثابت

ب) تغییر جهت نیرو - انتقال نیرو

ج) مرکز قرقره

د) ۱- قرقره سر پرچم ۲- قرقره‌های ساختمانی

ه) بازوی محرک = شاعع قرقره

بازوی مقاوم = شاعع قرقره

(۸) (الف) قرقره مرکب

ب) هر قرقره ثابت با انتقال نیرو و تغییر جهت نیرو و هر قرقره متحرک با انتقال نیرو و افزایش نیرو به ما کمک می‌کند.

ج) نیروی فیل روی طناب‌های متصل به قرقره متحرک تقسیم می‌شود. تعداد طناب متصل به قرقره متحرک ۴ است که برابر مزیت مکانیکی است:

$$A = \frac{R}{E} \Rightarrow 4 = \frac{70 \times 1}{E} \Rightarrow E = 175 \text{ N}$$

$$A = \frac{L_E}{L_R} = \frac{8+2}{2} = 5 \quad (\text{الف}) \quad (9)$$

$$A = \frac{L_E}{L_R} = \frac{10-8}{10} = 0.2 \quad (\text{ب})$$

$$A = \frac{L_E}{L_R} = \frac{10}{2} = 5 \quad (\text{ج})$$

$$A = \frac{L_E}{L_R} = \frac{2}{10} = 0.2 \quad (\text{د})$$

$$A = \frac{R}{E} = \frac{200}{50} = 4 \quad (\text{ه})$$

$$50 \text{ N} \quad (\text{الف}) \quad 100 \text{ N} \quad (\text{ب})$$

$$(11) \text{ (الف)} \quad \text{جابه‌جایی محرک} \times \text{نیروی محرک} = \text{کار نیروی محرک} = 50 \times 0.4 = 20 \text{ J}$$

$$\text{کار نیروی مقاوم} = \text{کار نیروی محرک} \quad (\text{ب})$$


$$\text{جابه‌جایی مقاوم} \times \text{نیروی مقاوم} = \text{کار نیروی مقاوم} \quad (\text{ج})$$

$$20 = 100 \times x \Rightarrow x = 0.2 \text{ m}$$

۱) کار ورودی ← ماهیچه‌های پای انسان

کار خروجی ← حرکت دوچرخه به طرف جلو

۲





(۳) (الف) اثر چرخانندگی یک نیرو را گشتاور نیرو می‌گوییم.

ب) ۱- اندازه نیرو ۲- فاصله نقطه اثر نیرو تا محور چرخش

(۴) گشتاور ساعت‌گرد = گشتاور پاد ساعت‌گرد

$$F_1 \times d_1 = d_2 \times F_2$$



# سوالات تستی

## سیر تا پیاز

- ۲۹۲ فصل اول: مواد و نقش آنها در زندگی
- ۲۹۸ فصل دوم: رفتار اتم‌ها با یکدیگر
- ۳۰۶ فصل سوم: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
- ۳۱۳ فصل چهارم: حرکت چیست
- ۳۲۲ فصل پنجم: نیرو
- ۳۳۰ فصل ششم: زمین ساخت ورقه‌ای
- ۳۳۶ فصل هفتم: آثاری از گذشته زمین
- ۳۴۱ فصل هشتم: فشار و آثار آن
- ۳۵۴ فصل نهم: ماشین‌ها
- ۳۶۴ فصل دهم: نگاهی به فضا
- ۳۷۱ فصل یازدهم: گوناگونی جانداران
- ۳۷۶ فصل دوازدهم: دنیای گیاهان
- ۳۸۲ فصل سیزدهم: جانوران بی‌مهره
- ۳۸۷ فصل چهاردهم: جانوران مهره‌دار
- ۳۹۳ فصل پانزدهم: با هم زیستن



## فصل اول: مواد و نقش آنها در زندگی

Br, O, F (۴)

N, Cl, H (۳)

K, H, Xe (۲)

He, Kr, Ar (۱)

۱ کدام دسته از موارد زیر همگی گاز نجیب هستند؟

$\frac{3}{7}$  (۴)

$\frac{7}{3}$  (۳)

$\frac{15}{3}$  (۲)

$\frac{7}{3}$  (۱)

۲ نسبت تعداد عناصر به تعداد اتم‌ها در ۱۰ مولکول سولفوریک اسید کدام است؟

۴) ملامین، سلولز

۳) ملامین، ابریشم

۳ در کدام گزینه زیر فقط ماده طبیعی دیده می‌شود؟

۴) C (۴)

۱۶ S (۳)

۱۱ Na (۲)

۱۵ P (۱)

۴ در ترکیب جوش شیرین (سدیم‌بی‌کربنات)  $\text{NaHCO}_3$  چند عنصر نافلزی وجود دارد؟

۴ (۴)

۲ (۳)

۳ (۲)

۱ (۱)

۵ اگر اتمی با از دادن سه الکترون آرایش الکترون گاز بی‌اثر پیدا کند، آن عنصر در کدام گروه اصلی قرار دارد؟

۴) ششم

۳) سوم

۲) هشتم

۱) چهارم

در بخشی از جدول تناوبی عناصر فرضی مشخص شده است. با توجه به این جدول به سوالات پاسخ دهید:

A													
B	C			D					F	G	K	L	M
				E									
								R					

۷ کدام یک میل واکنشی ندارد؟

M (۴)

G (۳)

D (۲)

A (۱)

۸ میل واکنشی کدام یک با A از بقیه بیشتر است؟

D (۴)

R (۳)

K (۲)

L (۱)

۹ کدام یک شعاع اتمی بزرگ‌تری دارد؟

L (۴)

D (۳)

C (۲)

B (۱)

۱۰ کدام یک شعاع اتمی کوچک‌تری دارد؟

E (۴)

R (۳)

A (۲)

B (۱)

۱۱ کدام یک خاصیت فلزی دارد؟

M (۴)

K (۳)

F (۲)

C (۱)

۱۲ کدام یک از بقیه واکنش‌پذیرتر است؟

B (۴)

A (۳)

C (۲)

L (۱)

۱۳ ترتیب واکنش‌پذیری با اکسیژن در کدام مورد درست نشان داده شده است؟

Mg > Cu > Fe (۴)

Fe > Mg > Au (۳)

Mg > Fe > Cu (۲)

Cu > Mg > Au (۱)

۱۴ ترتیب واکنش‌پذیری با آب در کدام مورد درست بیان شده است؟

K > Mg > Na (۴)

K > Na > Mg (۳)

Mg > Na > K (۲)

Na > Mg > K (۱)


۱۵ در کدام یک ترتیب بهترین رسانایی الکتریکی درست نشان داده شده است؟

Ag > Cu > Au (۴)

Au > Ag > Cu (۳)

Ag > Au > Cu (۲)

Cu > Ag > Au (۱)






### گزینه «۲» (۵۰)

تذکر ۱: وزن میله به وسط میله وارد می‌شود پس:

$$a^2 = b^2 + c^2 \quad : \quad a^2 = 3^2 + 4^2 \Rightarrow a = 5$$

$$d_E = 5$$

$$d_R = 3$$



تذکر ۲: چون جرم میله بر حسب گرم خواسته شده است وزنه را نیز بر حسب گرم محاسبه می کنیم:

$$400 \times 20 = (W \times 10) + (150 \times 40)$$

$$8000 = 10W + 6000$$

$$10W = 2000$$

$$W = \frac{2000}{10} = 200 \text{ gr}$$

### گزینه «۴» (۵۴)

با هر دور گردش چرخ A، چرخ B، ۲ دور می چرخد:


$$\frac{N_A}{N_B} = \frac{20}{10} = 2$$

چون چرخ B به چرخ C متصل شده است با هر دور چرخش چرخ A چرخ C نیز یک دور می چرخد یعنی با چرخش ۵ دور چرخ A چرخش چرخ C ۱۰ دور است و در نهایت چرخ D، ۲۵ دور به طور ساعتگرد می چرخد.

تذکر: چون چرخدنده C بزرگتر از چرخدنده D است پس چرخش چرخ D سریع تر است.

### گزینه «۱» (۵۵)

### گزینه «۴» (۵۶)




$$A = r^2 = 2^2 = 8$$

$$A = \frac{R}{E} = \frac{8E}{E} = 8$$

### گزینه «۴» (۵۷)

طول میله = ۱۰۰ cm



$$m \times 20 = (240 \times 50) + (100 \times 80)$$


$$20m = 12000 + 8000$$

$$m = \frac{20000}{20} = 1000 \text{ gr}$$

تذکر: چون مقدار m بر حسب گرم خواسته شده است پس می توان مقادیر دیگر را نیز بر حسب گرم قرار داد!

### گزینه «۳» (۵۳)

تذکر ۱: وزن میله به وسط میله وارد می شود پس:



تذکر ۲: چون جرم میله بر حسب گرم خواسته شده است وزنه را نیز بر حسب گرم محاسبه می کنیم:

$$400 \times 20 = (W \times 10) + (150 \times 40)$$

$$8000 = 10W + 6000$$

$$10W = 2000$$

$$W = \frac{2000}{10} = 200 \text{ gr}$$

### گزینه «۴» (۵۴)

تذکر ۲: چون نیروی مقاوم ( $R_1$ ) از سطح شیبدار در حال پایین آمدن است پس مزیت مکانیکی آن  $\frac{3}{5}$  می شود!!

$$A = A_1 \times A_2 \times A_3 \times \dots$$


$$A = 5 \times 1 \times \frac{3}{5} = 3 \text{ کل}$$

### گزینه «۱» (۵۱)

فرمول کلی چرخدنده ها:

پس خواهیم داشت:

$$N = \frac{V_{\text{خروجی}}}{V_{\text{ورودی}}} = \frac{N_{\text{خروجی}}}{N_{\text{ورودی}}} = \frac{N_{\text{خروجی}}}{N_{\text{ورودی}}} = M_{\text{مزیت مکانیکی}}$$



راهمنا:

تعداد دندانه ها = N

شعاع چرخدنده = r

سرعت حرکت چرخدنده = v

تعداد دور چرخدندهها = n

### نکته

۱- اگر  $A > 1 \Leftrightarrow$  افزایش نیرو (ماشین قدرتی)

۲- اگر  $A < 1 \Leftrightarrow$  افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو (ماشین سرعتی)

۳- اگر  $A = 1 \Leftrightarrow$  فقط تغییر جهت نیرو

۴- اگر چرخدنده کوچک ورودی باشد ماشین افزایش نیرو می دهد و اگر چرخدنده بزرگ ورودی باشد ماشین افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو می دهد.

### گزینه «۴» (۵۸)

$$A = 3$$

$$A = \frac{R}{E} \Rightarrow 3 = \frac{6}{E}$$

$$E = 2N$$

