

ساختار کتاب

کتاب شب امتحان **زیست‌شناسی (۲) یازدهم** از ۴ قسمت اصلی تشکیل شده است که به صورت زیر است:

۱- آزمون‌های نوبت اول: آزمون‌های شماره ۱ تا ۴ این کتاب مربوط به مباحث نوبت اول است که خودش به دو قسمت تقسیم می‌شود:

الف) آزمون‌های طبقه‌بندی شده: آزمون‌های شماره ۱ و ۲ را فصل به فصل طبقه‌بندی کرده‌ایم؛ بنابراین شما به راحتی می‌توانید پس از خواندن هر فصل از درس‌نامه تعدادی سؤال را بررسی کنید. حواستان باشد این آزمون‌ها هم، ۲۰ نمره‌ای و مثل یک آزمون کامل هستند. در کنار سؤال‌های این آزمون‌ها نکات مشاوره‌ای نوشته‌ایم. این نکات به شما در درس‌خواندن قبل از امتحان و پاسخگویی به آزمون در زمان امتحان کمک می‌کند.

ب) آزمون‌های طبقه‌بندی نشده: آزمون‌های شماره ۳ و ۴ را طبقه‌بندی نکرده‌ایم تا دو آزمون نوبت اول مشابه آزمونی را که معلمتان از شما خواهد گرفت، ببینید.

۲- آزمون‌های نوبت دوم: آزمون‌های شماره ۵ تا ۱۲ از کل کتاب و مطابق امتحان پایان سال طرح شده‌اند. این قسمت هم، خودش به ۲ بخش تقسیم می‌شود:


الف) آزمون‌های طبقه‌بندی شده: آزمون‌های شماره ۵ تا ۸ را که برای نوبت دوم طرح شده‌اند هم طبقه‌بندی کرده‌ایم. با این کار باز هم می‌توانید پس از خواندن هر فصل تعدادی سؤال مرتبط را پاسخ دهید. هر کدام از این آزمون‌ها هم، ۲۰ نمره دارند؛ در واقع در این بخش، شما ۴ آزمون کامل را می‌بینید. این آزمون‌ها هم نکات مشاوره‌ای دارند.

ب) آزمون‌های طبقه‌بندی نشده: آزمون‌های شماره ۹ تا ۱۲ را طبقه‌بندی نکرده‌ایم؛ پس، در این بخش با ۴ آزمون نوبت دوم، مشابه آزمون پایان سال معلمتان مواجه خواهید شد.

۳- پاسخنامه تشریحی آزمون‌ها: در پاسخ تشریحی آزمون‌ها، همه آن‌چه را که شما باید در امتحان بنویسید تا نمره کامل کسب کنید، برایتان نوشته‌ایم.

۴- درس‌نامه کامل شب امتحانی: این قسمت، برگ برنده شما نسبت به کسانی است که این کتاب را نمی‌خوانند! در این قسمت، همه آن‌چه را که شما برای گرفتن نمره عالی در امتحان زیست‌شناسی (۲) نیاز دارید، در ۲۶ صفحه آورده‌ایم، بخوانید و لذتش را ببرید!

یک راهکار: موقع امتحان‌های نوبت اول می‌توانید از سؤال‌های فصل‌های ۱ تا ۵ آزمون‌های ۵ تا ۸ هم استفاده کنید.



فهرست

بلندی درس زیست‌شناسی (۲)

نوبت دوم	نوبت اول	شماره فصل
۱	۴	فصل اول
۱	۴	فصل دوم
۱	۳/۵	فصل سوم
۱	۲/۵	فصل چهارم
۱	۴	فصل پنجم
-	۲	فعالیت‌ها
۳	-	فصل ششم
۴	-	فصل هفتم
۳	-	فصل هشتم
۳	-	فصل نهم
۲	-	فعالیت‌ها
۲۰	۲۰	جمع

نوبت	نوبت	صفحه آزمون	صفحه پاسخنامه
آزمون شماره ۱ (طبقه‌بندی شده)	اول	۳	۳۰
آزمون شماره ۲ (طبقه‌بندی شده)	اول	۵	۳۰
آزمون شماره ۳ (طبقه‌بندی نشده)	اول	۷	۳۱
آزمون شماره ۴ (طبقه‌بندی نشده)	اول	۹	۳۱
آزمون شماره ۵ (طبقه‌بندی شده)	دوم	۱۱	۳۲
آزمون شماره ۶ (طبقه‌بندی شده)	دوم	۱۳	۳۲
آزمون شماره ۷ (طبقه‌بندی شده)	دوم	۱۶	۳۳
آزمون شماره ۸ (طبقه‌بندی شده)	دوم	۱۹	۳۴
آزمون شماره ۹ (طبقه‌بندی نشده)	دوم	۲۲	۳۴
آزمون شماره ۱۰ (طبقه‌بندی نشده)	دوم	۲۴	۳۵
آزمون شماره ۱۱ (طبقه‌بندی نشده)	دوم	۲۶	۳۵
آزمون شماره ۱۲ (طبقه‌بندی نشده)	دوم	۲۸	۳۶
درس‌نامه توب برای شب امتحان		۳۷	

ردیف	زیست‌شناسی (۲)	رشته: علوم تجربی	مدت آزمون: ۹۰ دقیقه	kheilisabz.com		
۱۰	آزمون شماره ۱		نوبت اول پایه یازدهم دوره متوسطه دوم	نمره		
۱۱	در جدول زیر انواع یاخته‌های بافت ماهیچه‌ای آورده شده است. جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید.		مقایسه ساقه‌تر و عملکرد انواع یاخته‌های بافت ماهیچه‌ای را به خلاصه شریتون بسپارین.	۱/۵		
۱۲	انواع یاخته‌های بافت ماهیچه‌ای		نحوه تنفس	تعداد میتوکندری	کاربرد	نوع
۱۳	به پرسش‌های زیر در ارتباط با تراکم استخوان، پاسخ کوتاه دهید:		کند
۱۴	الف) در کدام جنس از مردان یا زنان، تراکم استخوان بالاتر است؟		تند
۱۵	ب) بین سنین ۲۰ تا ۵۰ سالگی، شدت تغییرات تراکم استخوان در مردان کمتر است یا زنان؟					
۱۶	فصل چهارم					
۱	در جمله‌های زیر با انتخاب یک واژه مناسب از درون پرانتز و خط‌کشیدن روی واژه دیگر، عبارت درستی را بسازید.		هر چیز گام از اهمیت دانستن نام و هایگاه غده‌های درون ریز			
۱۷	الف) گاهی یاخته‌ای (پیوندی/عصبي)، پیک شیمیایی را به خون ترشح می‌کند که به آن پیک، یک (ناقل عصبی/هورمون) می‌گویند.		ونوع هورمون‌های متراشه و نیز نقش اونا در عملکرد صحیح یاخته‌های بدن، بازم گفته‌ام! پس دیگه ... !!!			
۱۸	ب) یاخته‌های درون‌ریز موجود در دوازدهه، هورمون (سکرتین/گاسترین) را ترشح می‌کنند.					
۱۹	پ) هورمون (پرولاکتین/ضداداری)، در دستگاه ایمنی و حفظ تعادل آب بدن نقش دارد.					
۲۰	ت) هورمون پاراتیروئیدی در پاسخ به (کاهش/افزایش) کلسیم خوناب ترشح می‌شود.					
۲۱	ث) هورمون‌های بخش (قشری/مرکزی) غده فوق کلیه، ضربان قلب و گلوکز خوناب را (افزایش/کاهش) می‌دهند.					
۲۲	ج) در دیابت نوع یک (همانند/برخلاف) دیابت نوع دو، انسولین به مقدار کافی وجود ندارد.					
۲۳	درباره ارتباط‌های شیمیایی در جانوران به پرسش‌های زیر پاسخ کوتاه دهید:					
۲۴	الف) فرومون در زنبورها چه کاربردی دارد؟					
۲۵	فصل پنجم					
۲۶	خروج خوناب بیشتر از رگ در محل التهاب چه اهمیتی دارد؟					
۲۷	با توجه به شکل به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.					
۲۸	الف) اجزای شماره‌گذاری شده را نام‌گذاری کنید.					
۲۹	۱- -۲ -۳ -۴					
۳۰	ب) یاخته‌های بیگانه‌خوار موجود در این نوع پاسخ ایمنی، در چه بخش‌هایی از بدن یافت می‌شوند؟ (دو مورد)					
۳۱	خرج خوناب بیشتر از رگ در محل التهاب چه اهمیتی دارد؟					
۳۲	با توجه به شکل به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.					
۳۳	الف) اجزای شماره‌گذاری شده را نام‌گذاری کنید.					
۳۴	۱- -۲ -۳ -۴					
۳۵	ب) یاخته‌های بیگانه‌خوار موجود در این نوع پاسخ ایمنی، در چه بخش‌هایی از بدن یافت می‌شوند؟ (دو مورد)					
۳۶	در مورد خط دوم دفاع غیراختصاصی بدن به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.					
۳۷	الف) با ذکر دلیل بگویید که به کدامیک از یاخته‌های سفید خون «نیروهای واکنش سریع» می‌گویند؟					
۳۸	ب) پروتئین‌های مکمل در کجا قرار دارند و در چه زمانی فعال می‌شوند؟					
۳۹	در مورد پادتن‌ها به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.					
۴۰	الف) از چه جنسی هستند و به چه شکلی دیده می‌شوند؟					
۴۱	ب) دارای چند جایگاه برای اتصال پادگن هستند؟					
۴۲	در ارتباط با بیماری ایدز به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.					
۴۳	الف) عامل آن چه نام دارد؟					
۴۴	ب) در کدام دستگاه بدن، اختلال ایجاد می‌کند؟					
۴۵	پ) دوره نهفتگی آن چه مدت‌زمانی است؟					
۴۶	جمع نمرات	موفق باشید				



نمره

نوبت دوم پایهٔ یازدهم دورهٔ متوسطه دوم

آزمون شماره ۱۵

ردیف

۱

در جمله‌های زیر جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

- (الف) پس از مثبت شدن ناگهانی اختلاف پتانسیل درون یاخته‌ای عصبی، پتانسیمی، باز شده و بون‌های پتانسیم می‌شوند.
 (ب) در فرد، گرده چشم از اندازه طبیعی کوچک‌تر است و پرتوهای نور اجسام نزدیک، در شبکیه متتمرکز می‌شوند.
 (پ) ماده، رگ‌ها را گشاد و نفوذپذیری آن‌ها را زیاد می‌کند.
 (ت) التهاب، پاسخی موضعی است که به دنبال بروز می‌کند.
 (ث) اکسین از طریق افزایش طول یاخته‌ها، سبب افزایش می‌شود.
 (ج) هورمون سبب بسته شدن روزنده‌ها و مانع رویش دانه می‌شود.

۲

درستی یا نادرستی هر یک از عبارت‌های زیر را بدون ذکر دلیل بنویسید.

- (الف) استخوان‌ها در محل مفصل انگشتان، توسط کپسولی از جنس بافت پیوندی سست احاطه شده‌اند.
 (ب) تعداد میتوکندری، همانند مقدار میوگلوبین، در تارهای ماهیچه‌ای کند بیشتر از تارهای ماهیچه‌ای تند است.
 (پ) مولکول پیک شیمیایی، فقط بر یاخته‌ای می‌تواند اثر کند که گیرنده آن را دارد.
 (ت) غده اپی‌فیز از غده‌های درون مغز است که در پایین برجستگی‌های چهارگانه قرار دارد.
 (ث) در کوتاه‌ترین مرحله اینترفاز، کروموزوم‌های مضاعف حضور دارند.
 (ج) در مرحلهٔ تلوفار، رشته‌های دوک تخریب شده و کروموزوم‌ها شروع به کوتاه شدن می‌کنند.
 (چ) ساقه رونده در گیاه زنبق به طور افقی روی خاک رشد می‌کند.
 (ح) بعد از تشکیل روبان در گیاه، رشد آن تا مدتی متوقف می‌شود.

۱/۵

در جمله‌های زیر با انتخاب یک واژه مناسب از درون پرانتز و خط‌کشیدن روی واژه دیگر، عبارت درستی را بسازید.

- (الف) مراحل تخمکزایی در دوران (جنینی / بلوغ) آغاز و پس از شروع در (پروفاز ۱ / پروفاز ۲) متوقف می‌شود.
 (ب) زمین‌ساقه (برخلاف / همانند) ساقه هوایی، دارای جوانه‌های انتهایی و جانبی است.
 (پ) میوه سبب حاصل رشد (تخمدان / نهنج) است.
 (ت) گیاه آکاسیا در دورهٔ (رویشی / گل‌دهی) ترکیبات شیمیایی تولید و منتشر می‌کند که باعث فرار (زنبورها / مورچه‌ها) می‌شود.

۱/۵

به پرسش‌های زیر پاسخ کوتاه دهید:


- (الف) در کدام جانور، دو گرده عصبی، مغز آن را تشکیل می‌دهند؟
 (ب) در کدام گروه از جانوران، هر گرده عصبی، فعالیت ماهیچه‌های یک بند از بدن را تنظیم می‌کند؟
 (پ) خارجی ترین لایه کره چشم از چه بخش‌هایی تشکیل می‌شود؟
 (ت) خط Z موجود در تارچه ماهیچه‌ای را تعریف کنید.

۱/۵

در جدول زیر هر یک از گزاره‌ها با یکی از واژه‌ها ارتباط منطقی دارد. شماره واژه مناسب با هر گزاره را درون مربع (□) آن بنویسید. (توجه: یک واژه اضافی است!)

گزاره	واژه
(الف) مواد دفاعی زیادی حمل نمی‌کنند و چابک‌اند.	۱- هورمون آلدوسترون
(ب) پس از خروج از خون به یاخته‌های دندربیتی تبدیل می‌شوند.	۲- هورمون پاراتیروئیدی
(پ) کروموزوم‌های همتا از هم جدا می‌شوند و به دو سوی قطبین یاخته حرکت می‌کنند.	۳- تلوفار ۱
(ت) باعث افزایش فشار خون می‌شود.	۴- نوتروفیل‌ها
(ث) کروموزوم‌ها به دو سوی یاخته می‌روند و رویدادهای عکس پروفاز ۱ رخ می‌دهند.	۵- هورمون کورتیزول
(ج) باعث افزایش بازجذب کلسیم از کلیه می‌شود.	۶- مونوکیت‌ها
	۷- آنافار ۱

۲




با توجه به شکل مراحل مختلف چرخه یاخته‌ای به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

(الف) بخش‌های شماره‌گذاری شده را نام‌گذاری کنید.

- ۳ ۲ ۱
 ۶ ۵ ۴

(ب) در کدامیک از این مراحل، همانندسازی DNA رخ می‌دهد؟

(پ) در مرحلهٔ شماره (۷) چه رویدادی انجام می‌شود؟



با توجه به شکل رو به رو به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
الف) بخش‌های شماره‌گذاری شده را نام‌گذاری کنید.

- ۳ -۲
..... -۵ -۴

ب) کدام شماره‌های موجود در شکل، دارای یاخته‌های هاپلوفئید هستند؟ (فقط دو مورد نام ببرید).

در جدول زیر عملکرد تنظیم‌کننده‌های گیاهی بر اندام‌ها یا فرایندهای مختلف با هم مقایسه شده است. جاهای خالی را با عبارت‌های مناسب کامل کنید.

نام هورمون	نوع اثر بر اندام‌ها یا فرایندها	ساقه	طول یاخته	تقسیم یاخته	میوه
اکسین	افزايش
سیتوکینین
آبسیزیک اسید	افزايش طول	افزايش
ریزش میوه و رسیدگی میوه

فعالیت‌ها

تقسیم میوز ۲ را با تقسیم میتوز مقایسه کنید. چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی بین این دو فرایند وجود دارد؟

با توجه به مراحل اسپرم‌زایی در انسان، به چه دلیل ابتدا تقسیم میتوز و سپس تقسیم میوز رخ می‌دهد؟

با پاسخ کوتاه نقش هر کدام از غده‌های زیر را در دستگاه تولیدمثلی مردان بنویسید:

الف) غدد وزیکول سمینال (کیسهٔ منی):

پ) غدد پیازی - میزراهی:

بخش‌های مختلف دستگاه تولیدمثلی زنان را نام ببرید. (چهار مورد)

در مورد زمین ساقه که یکی از انواع ساقه‌های تخصصی بافته است، یک مثال بزنید.

در مورد چرخهٔ تولیدمثل زنان به پرسش‌های زیر پاسخ کوتاه دهید:

الف) هورمون‌هایی را که در زمان تخمک‌گذاری به مقدار زیاد ترشح می‌شوند، نام ببرید.

ب) کدام هورمون جنسی بعد از تخمک‌گذاری باعث ضخیم و پُرخون شدن دیواره رحم می‌شود؟

چگونگی مراقبت از تخم‌ها را در جانوران زیر بیان کنید:

الف) لاک پشت:

پاسخنامهٔ تشریحی

از مون شماره ۱ (نوبت اول)

- ۱۴- باعث خروج بیشتر پروتئین‌های محلول در خوناب می‌شود که این پروتئین‌ها با عامل خارجی یا میکروبی که به بدن وارد شده‌اند، مبارزه می‌کنند و بهبودی سریع تر رخ می‌دهد.
- ۱۵- الف) ۱- لایهٔ بیرونی ۲- یاختهٔ دندربتی (دارینه‌ای) ۳- رگ لغفی ۴- یاختهٔ اینمی غیرفعال ب) پوست و لولهٔ گوارش
- ۱۶- الف) نوتروفیل‌ها؛ زیرا دانه‌های (مواد دفاعی) زیادی حمل نمی‌کنند و چاکاند.
- ب) این پروتئین‌ها محلول در خوناب هستند و هنگامی که میکروبی به بدن نفوذ کند، فعال می‌شوند.
- ۱۷- الف) از جنس پروتئین و به صورت Y-شکل است.
- ب) دو جایگاه اتصال دارند.
- ۱۸- الف) ویروس HIV
ب) بین ۶ ماه تا ۱۵ سال

- ۱- الف) نادرست (یاخته‌های پشتیبان این نقش را دارند).
- ب) نادرست (در پایان پتانسیل عمل و نه در هستگام!)
- پ) درست
- ت) نادرست (سانتی‌متر ← میلی‌متر)
- ث) درست
- ج) نادرست (متراکم کز ← پراکنده)
- ۲- الف) مولکول پروتئینی پمپ سدیم - پتانسیم
- ب) ۱- یون‌های سدیم (Na^+) ۲- مولکول ADP ۳- یون‌های پتانسیم (K^+)
- ۴- مولکول ATP
- ۳- الف) به ارتباط ویژه‌ای که یاخته‌های عصبی با هم‌دیگر و نیز با یاخته‌های دیگر برقرار می‌کنند، سیناپس می‌گویند.

- ب) ۱- به پروتئینی غشایی به نام گیرنده متصل می‌شود. ۲- سپس این پروتئین کانالی باز می‌شود. ۳- در نتیجهٔ تغییر نفوذپذیری غشا به یون‌ها پتانسیل الکتریکی یاختهٔ پس‌سیناپسی تغییر می‌کند.
- ۴- الف) در داخل فضای بطن‌های ۱ و ۲ مغز
ب) در عقب اپی‌فیز
- پ) نواری سفیدرنگ بین دو نیمکرهٔ مخ و بالای رابط سه‌گوش
- ت) بین دو نیمکرهٔ مخچه
- ۵- الف) دندربتی (دارینه) - چندلايه
ب) سیاهرگ‌های بزرگ - پوست
ت) رکابی
پ) جلوی - زلایه
ث) سقف
- ۶- الف) نوک انگشتان و لب‌ها
ب) گیرندهٔ حس وضعیت
پ) لاکتیک اسید
- ۷- این گیرنده‌ها شبیهٔ گیرنده‌های تعادلی مژک‌دار موجود در بخش دهیزی گوش داخلی (مجاری نیم‌دایره) هستند؛ چون مژک‌های هر دو گیرنده، درون مادهٔ ژلاتینی قرار دارند. به طوری که حرکت مادهٔ ژلاتینی می‌تواند مژک‌های آن‌ها را خم کند و باعث تولید پیام عصبی گردد.

- ۸- الف) ۱- واژهٔ اضافی: مفصل ثابت
پ) ۲- (واژهٔ اضافی: مفصل ثابت)
- ۹- استخوان‌های کوتاه - استخوان‌های دراز - استخوان‌های پهن - استخوان‌های نامنظم

نحوهٔ تنفس	تعداد میتوکندری	کاربرد	نوع
بیشتر هوایی	بیشتر	حرکات استقامتی مانند شناکردن	گُند
بیشتر بی‌هوایی	کم‌تر	حرکات سریع مانند دوی سرعت و بلندکردن وزنه	قُند

- ۱۱- الف) مردان
ب) زنان
- ۱۲- الف) عصبی - هورمون
ب) سکرتین
پ) پرولاکتین
- ت) کاهش
ث) مرکزی - افزایش
- ۱۳- الف) برای هشدار خطر حضور شکارچی به دیگران
ب) برای جفت‌یابی



۱۰- هدف از انجام تقسیم میتوz، ثبات و حفظ تعداد یاخته‌های لایه زاینده دیواره لوله‌های اسپرم‌ساز است، زیرا یاخته‌های این لایه مرتبأ به اسپرم تبدیل می‌شوند. اما در ادامه فرایند اسپرم‌زایی، یکی از دو یاخته حاصل از میتوz یاخته اسپرم‌اتوگونی در لایه زاینده دیواره باقی می‌ماند و یاخته دیگر تقسیم میوز را انجام می‌دهد.

۱۱- (الف) اضافه کردن مایع غنی از فروکتوز به اسپرم‌ها

(ب) ترشح کردن مایعی شیری‌رنگ و قلیابی

(پ) اضافه کردن ترشحات قلیابی و روان‌کننده به میزراه

(ت) ترشح هورمون تستوسترون و تولید اسپرم

۱۲- تخمدان، رحم، لوله‌های رحمی (فالوپ)، گردن رحم و واژن

۱۳- گیاه زنبق

۱۴- (الف) LH و استروژن (ب) پروژسترون

۱۵- (الف) لاکپشت تخم‌های خود را با ماسه و خاک می‌پوشاند.

(ب) پرنده‌گان روی تخم‌های خود می‌خوابند.

ازمون شماره ۱۰ (نوبت دوم)

۱- (الف) کاتال‌های دریچه‌دار - خارج

(پ) هیستامین

(ث) طول ساقه

۲- (الف) نادرست (سست ← رشتادی) (ب) درست

(پ) درست

(ث) درست

(ج) نادرست (زنبق ← توت‌فرنگی)

(ح) درست

(ب) همانند

(ت) گل‌دهی - مورچه‌ها

(پ) نهنج

(۴- الف) کرم پلاتاریا

(ب) حشرات

(پ) صلبیه - قربنیه

ت) در دو انتهای هر سارکومر، خطی به نام خط Z دیده می‌شود.

۶- (الف) ۴

۷- (پ) ۷

۸- (ج) ۳

۹- (الف) ۱) پروفاز ۲) آنافاز ۳) تلفاز ۴) تقسیم سیتوپلاسم ۵) G_۱ ۶) M ۷) G_۰ ۸) یا نقطه

وارسی متافازی

(ب) شماره ۸ یا مرحله S (همانندسازی)

(پ) مرحله G_۰ است که در آن یاخته رشد می‌کند.

۱۰- (الف) ۱) کلاله ۲) لوله گرده ۳) یاخته دوهسته‌ای ۴) تخمزا ۵) اسپرم‌ها (زمده‌ها)

(ب) شماره (۲): لوله گرده و شماره (۴): تخمزا و شماره (۵): اسپرم‌ها

-۸

نام هورمون	نوع اثر بر اندامها یا فرایندها	ساقه	طول یاخته	تقسیم یاخته	میوه
اکسین	افزایش طول	افزایش طول	درشت‌کردن و تولید میوه بدون دانه		
سیتوکینین	افزایش طول	افزایش		تولید میوه بدون دانه و درشت‌کردن میوه	
جیبرلین	افزایش طول	افزایش			
آبسیزیک اسید	مانع رشد				ریزش میوه و رسیدگی میوه
انیلن					

۹- دو فرایند تقسیم میتوz و میوز ۲ از نظر چگونگی آرایش کروموزوم‌ها در مراحل مختلف تقسیم، با همدیگر مشابه‌اند، ولی عدد کروموزومی یاخته‌های حاصل از تقسیم میوز ۲ فقط نصف تعداد کروموزوم‌های یاخته‌های مادری دارند، در حالی که یاخته‌های حاصل از تقسیم میتوz، دارای همان تعداد کروموزوم‌های یاخته‌های مادری هستند.

درس نامهٔ توب برای شب امتحان


۱) اثای خاکه‌های عصبی

- خاکه عصبی حسی:** فرستادن پیام عصبی به بخش مرکزی دستگاه عصبی (مغز و نخاع)
- خاکه عصبی حرکتی:** بردن پیام عصبی از بخش مرکزی به سوی اندامها (ماهیچه‌ها و یا غده‌ها)
- خاکه عصبی رابط:** در مغز و نخاع هستند و خاکه‌های عصبی را به هم مرتبط می‌کنند.

۲) پیام عصبی

- چگونگی تولید:** ناشی از ایجاد اختلاف پتانسیل الکتریکی در اثر تغییر مقدار یون‌ها در دو سوی غشاء خاکه عصبی
- پتانسیل آرامش:**

تعریف: در حالتی برقرار می‌شود که خاکه عصبی فعالیتی ندارد و اختلاف پتانسیل دو سوی غشای آن، -70 میلیولت است. در این وضعیت، همواره غلظت یون سدیم در بیرون خاکه عصبی زنده بیشتر از درون آن و غلظت یون پتانسیم در درون، بیشتر از بیرون است \leftarrow غلظت یون‌ها و مقدار بار الکتریکی دو سوی غشا متفاوت است.



- پروتئین‌های غشایی مؤثر در ایجاد اختلاف پتانسیل:** پمپ سدیم - پتانسیم: باعث خارج کردن ۳ یون سدیم از خاکه عصبی و وارد کردن ۲ یون پتانسیم به درون آن (در جهت خلاف شیب غلظت) به روش انتقال فعال می‌شود.


- کانال‌های نشتی سدیمی و پتانسیمی:** هر کدام به طور اختصاصی باعث خروج یون‌های پتانسیم و ورود یون‌های سدیم به داخل نورون به روش انتشار تسهیل شده می‌شوند.

پتانسیل عمل:

تعریف: به تغییر ناگهانی اختلاف پتانسیل دو سوی غشای خاکه عصبی (ابتدا مثبت شدن و پس از زمان کوتاهی، منفی شدن درون خاکه نسبت به بیرون آن) می‌گویند.

- پروتئین‌های غشایی مؤثر در پتانسیل عمل:** کانال‌های دریچه‌دار سدیمی
- کانال‌های دریچه‌دار پتانسیمی**

- مراحل ایجاد:** با تحریک یاخته عصبی، کانال‌های دریچه‌دار سدیمی باز می‌شوند. ورود سدیم فراوان به درون یاخته \leftarrow اختلاف پتانسیل دو سوی غشای نورون مثبت شود و به $+30$ mV می‌رسد.



فصل ۱: تنظیم عصبی

نوار مغزی: جریان الکتریکی ثبت شده نورون‌های مغز است که متخصصان با استفاده از آن، فعالیت‌های مغز را بررسی می‌کنند.

گفتار ۱: خاکه‌های بافت عصبی

بافت عصبی دو نوع خاکه دارد: ۱) خاکه‌های عصبی (نورون‌ها) ۲) خاکه‌های پشتیبان (نورون‌گلیاهای).

خاکه‌های عصبی، سه عملکرد دارند: ۱) تحریک‌پذیری و تولید پیام عصبی ۲) هدایت پیام ۳) انتقال پیام به خاکه‌های دیگر.

(الف) ساختار یک نورون


دندربیت‌ها: دریافت پیام‌های عصبی و هدایت آن‌ها به جسم خاکه ای.

آکسون: هدایت پیام عصبی از جسم خاکه تا انتهای خود (پایانه آکسون).

جسم خاکه‌ای: محل قرارگیری هسته و انجام سوت و ساز نورون‌ها.

(ب) غلاف میلین

نقش: پوشاندن رشته‌های آکسون و دندربیت بسیاری از خاکه‌های عصبی و عایق‌بندی کردن آن‌ها.



گره رانویه: به بخش‌هایی از رشته‌های آکسون و دندربیت می‌گویند که فقد غلاف میلین اند.


(پ) خاکه‌های پشتیبان

تعریف: نوع خاصی از خاکه‌های پشتیبان، به دور خاکه عصبی (نورون) می‌پیچد و غلاف میلین را ایجاد می‌کند.

ویژگی: تعداد خاکه‌های پشتیبان چند برابر نورون‌ها است و انواع گوناگونی نیز دارند.

- ۱) ساخت غلاف میلین
- ۲) دفاع از خاکه عصبی

نقش: حفظ هم‌ایستایی مابع اطراف نورون‌ها
ایجاد داریستهای برای استقرار نورون‌ها



گفتار ۲: ساختار دستگاه عصبی

سیمای دستگاه عصبی انسان را به طور خلاصه می‌توان این‌گونه ارائه کرد:


دستگاه عصبی انسان



الف) دستگاه عصبی مرکزی

نقش: ساختارهای مغز و نخاع بر فعالیتهای بدن نظارت می‌کنند. این دستگاه، اطلاعات دریافتی از محیط و درون بدن را تفسیر می‌کند و به آن‌ها پاسخ می‌دهد.

ساختار: ۱) ماده خاکستری: شامل جسم باختهای نورون‌ها و رشته‌های عصبی بدون میلین ۲) ماده سفید: شامل اجتماع رشته‌های میلین دار



۱) استخوان‌های جمجمه و ستون مهره: حفاظت از مغز و نخاع
۲) پرده‌های منتر: سه پرده از جنس بافت پیوندی
۳) مایع مغزی - نخاعی: فضای بین پرده‌های منتر را پر کرده و نقش ضربه‌گیر دارد.


۴) سد خونی - مغزی و نخاعی: ناشی از وجود مویرگ‌های پیوسته در دستگاه عصبی مرکزی که بین ياخته‌های دیواره آن، منفذی وجود ندارد؛ برای جلوگیری از ورود بیماری از مواد و میکروب‌ها.

شامل: الف) مغز ← مغز بیشترین حجم مغز مربوط به نیمکرهای مخ است که بخش خارجی (قشر مخ) آن، خاکستری و چین خورده و دارای شیارهای متعدد است و به ۴ لوب پس‌سری، گیگاکاهی، آهیانه و پیشانی تقسیم می‌شوند. و شامل بخش‌های حسی، حرکتی و ارتباطی می‌شود. دو نیمکره مخ توسط رشته‌های عصبی به نام رابط پینه‌ای و سه‌گوش به هم متصل می‌شوند. قشر مخ جایگاه پردازش نهایی اطلاعات ورودی به مغز است که نتیجه آن، یادگیری، تفکر و عملکرد هوشمندانه است.


مخچه: مرکز تنظیم وضعیت و تعادل بدن که در پشت ساقه مغز است و به طور دائم از بخش‌های دیگر مغز، نخاع و اندام‌های حسی بدن (گوش) پیام عصبی دریافت و بررسی می‌کند. دو نیمکره آن توسط کرمینه به هم متصل است.

ساقه مغز: الف) مغز میانی ← بالای پل مغزی قرار دارد و در فعالیت‌های شنوایی، بینایی و حرکت مؤثر است. بر جستگی‌های چهارگانه از اجزای آن است.
ب) پل مغزی ← تنظیم فعالیت‌های تنفس، ترشح بزاق و اشک

با بسته شدن کانال‌های سدیمی ← بازشدن کانال‌های دریچه‌دار پتانسیمی و خروج پتانسیم از نورون ← اختلاف پتانسیل دو سوی غشای نورون منفی‌تر می‌شود و در پایان به -7° mV می‌رسد.



(ب)



(ت)

رویدادهای بعد از پایان: با فعالیت بیشتر پمپ سدیم - پتانسیم غلظت بیون‌های Na^+ و K^+ در دو سوی نورون، دوباره به حالت آرامش بازمی‌گردند.

تعریف: به حریان یافتن نقطه به نقطه پتانسیل عمل ایجاد شده در طول رشته عصبی تا زمانی که به انتهای آن برسد، پیام عصبی می‌گویند.

ج) هدایت پیام عصبی

تعریف: جابه‌جایی نقطه‌به‌نقطه پیام عصبی از محل تحریک تا انتهای رشته عصبی
نقش گره رانویه: ۱) ایجاد هدایت جهشی پیام عصبی از گره‌ای به گره دیگر
۲) افزایش سرعت هدایت پیام در رشته‌های عصبی میلین دار نسبت به رشته‌های فاقد میلین هم قطر

اختلال در هدایت پیام (مثال: بیماری ام. اس) ← علت: از بین رفتن ياخته‌های پشتیبانی سازنده میلین در نورون‌های دستگاه عصبی مرکزی
عوارض: ۱) اختلاف در ارسال پیام‌های عصبی ۲) اختلال در بینایی و حرکت ۳) مبتلاشدن به بی‌حسی و لرزش

ج) انتقال پیام عصبی

تعریف: هرگاه پیام عصبی از یک نورون به ياخته‌ای دیگر فرستاده می‌شود به آن انتقال پیام عصبی می‌گویند.

سیناپس (همایه) ← تعریف: به ارتباط ویژه ياخته‌های عصبی با یکدیگر و یا با ياخته‌ای دیگر (ماهیچه‌ای و غذه) می‌گویند.

ناقل عصبی: ماده‌ای شبیه‌ای که در نورون ساخته و درون ریزکیسه‌ها ذخیره و در فضای سیناپسی آزاد می‌شود.




چگونگی انتقال: پروتئین‌های کانال‌گیرنده، در غشای نورون یا ياخته پس‌سیناپسی قرار دارند که با اتصال ناقل عصبی به آن، باز می‌شوند ← تغییر نفوذپذیری غشای ياخته پس‌سیناپسی به یون‌ها
۱) ایجاد و انتقال پیام عصبی در نورون یا ياخته پس‌سیناپسی

آزادشدن ناقل عصبی و اثر آن بر ياخته پس‌سیناپسی

چگونگی تأثیر: عبور از بخش‌های مختلف مغز و مختل کردن فعالیت آنها
کوتاه‌مدت: کاهش فعالیت بدنی، ناهمانگی در حرکات بدن
اثرات و اختلال در گفتار
بلندمدت: مشکلات کبدی، سکته قلبی و انواع سرطان

پ) بصل النخاع ← بالای نخاع و پایین ترین قسمت مغز است. فشار خون و ضربان قلب را تنظیم می‌کند و مرکز انعکاس‌های مانند عطسه، بلع و سرفه و مرکز اصلی تنفس است.




سه بخش اصلی مغز

دیگر ساختارهای مغز: (الف) تalamus (تalamus) ← محل گردنهای اولیه و تقویت اغلب پیام‌های حسی اند تا برای پردازش نهایی به بخش مربوطه در قشر مغز فرستاده شوند.

(ب) هیپوپاتالاموس ← تنظیم دمای بدن، تعداد ضربان قلب، فشار خون، تشنجی، گرسنگی و خواب

(پ) سامانه لیمبیک ← با قشر مغز، تalamus و هیپوپاتالاموس ارتباط دارد و در احساساتی مانند ترس، خشم، لذت و حافظه مؤثر است.


(ت) هیپوکامپ ← بخشی از لیمبیک که در یادگیری و ایجاد حافظه کوتاه‌مدت و تبدیل آن به بلندمدت نقش دارد.



سامانه لیمبیک (بخش‌های بنفش رنگ)

ب) نخاع ← تعریف و نقش: درون ستون مهره‌ها از بصل النخاع تا دومین مهره کمر کشیده می‌شود که مغز را به دستگاه عصبی محیطی متصل می‌کند. علاوه بر مسیر عبور پیام‌های حسی از اندام‌ها به مغز و بالعکس، مرکز برخی انعکاس‌های بدن است.

ساختار: هر عصب نخاعی دو ریشه دارد: یک ریشه پشتی (حامل پیام حسی) و یک ریشه شکمی (حامل پیام حرکتی) است.



(ب) اعیاند

تعریف: واستگی فرد به مصرف یک ماده یا انجام یک رفتار که ترک آن، مشکلات جسمی و روانی ایجاد می‌کند.

مواد اعتیادآور و مغز ← چگونگی تأثیر: ایجاد تغییرات در مغز که ممکن است دائمی باشند.

سامانه لیمبیک: باعث آزادشدن ناقل عصبی دوپامین ← ایجاد لذت و سرخوشی در فرد ← میل به مصرف دوباره و آزادشدن مقدار کمتری دوپامین ← سالت و بی‌حوالگی ← اجبار به افزایش مصرف مواد قسر مغز: باعث کاهش توانایی در تصمیم‌گیری، قضاوت و خودکنترلی



ب) بخش خودمختار: با رساندن پیام‌های عصبی به ماهیچه‌های صاف و قلبی و نیز غدد، فعالیت آن‌ها را به صورت **ناآگاهانه** (غیرارادی) تنظیم می‌کند و شامل دو قسم است:

- اعصاب پاراسمپاتیک** (پادآسیمیک): که در حالت آرامش، فعال است و باعث کاهش فشار خون، ضربان قلب و تعداد تنفس می‌شود.

۲) **اعصاب سیمپاتیک** (آسیمیک): در هیجانات بر پاراسمپاتیک غلبه می‌کند و بدن را در حالت آماده‌باش قرار می‌دهد ← باعث افزایش فشار خون، ضربان قلب و تعداد تنفس و نیز افزایش خون‌رسانی به قلب و ماهیچه‌های اسکلتی می‌شود.

دستگاه عصبی سایر حشرات


هیدر ← دارای شبکه عصبی
تعريف: مجموعه‌ای از یاخته‌های عصبی پراکنده در دیواره بدن هیدر




دستگاه عصبی مرکزی: شامل **مغز** (دو گره عصبی در سر) و دو طناب عصبی متصل به مغز که با رشته‌هایی به هم متصل‌اند و ساختار نرdban مانندی را ایجاد می‌کنند.

دستگاه عصبی محیطی: رشته‌های جانبی متصل به بیرون طناب‌های عصبی

پلاتاریا



حشرات مغز: شامل چند گره به هم جوش خورده طناب عصبی شکمی: در طول بدن جانور کشیده شده و در هر بند از بدن، یک گره عصبی وجود دارد که فعالیت ماهیچه‌های آن بند را تنظیم می‌کند.



دستگاه عصبی مرکزی: شامل **مغز** (بخش جلویی طناب عصبی درون جمجمه) و طناب عصبی پشتی (درون سوراخ مهره‌ها) دستگاه عصبی محیطی: رشته‌های جانبی که به طناب عصبی پشتی و بعضی به مغز متصل‌اند.

مهره‌داران